ENTOMOLOGIA PARISIENSIS;

SIVE

CATALOGUS Inſectorum quæ in Agro Pariſienſi reperiuntur;

SECUNDUM methodum Geoffræanam in ſectiones, genera & ſpecies diſtributus:

CUI addita ſunt nomina trivalia & fere trecentæ novæ Species.

Edente A. F. DE FOURCROY, Doct. Med. Pariſ.; è Reg. Scientiar. Academ.; è Reg. Soc. Medic. &c.

PARS PRIMA.

PARISIIS,

VIA ET ÆDIBUS SERPENTINEIS.

M. DCC. LXXXV.

SUB PRIVILEGIO ACADEMIÆ.

LECTORI ENTOMOPHYLO

MONITUM EDITORIS.

JAM à viginti annis prodiit celeb. Geoffroy de insectis opus eximium, quod multo favore prosecuti sunt historiæ naturalis cultores. Dudum à plurimis expectabatur manuale Compendium quod nomenclaturam & methodum complectens, omissâ scilicet historicâ parte, rus deferri posset. Non ergo ingratum entomophylis fore arbitratus est illustr. autor, si catalogus insectorum quæ circà Parisios reperiuntur typis parvâ formâ mandaretur, Botanicon Parisiensis ad instar. Felicissimæ apud cives suos praxeos medicæ curis distractus, hoc quod susceperat opus omnino absolvere non potuit. Entomologiæ olim deditus & autoris auxilio fretus, hunc catalogum

publici juris facere non timui. Methodum ill. Geoffroy, genera, ſpecies, deſcriptivas ſententias, religioſè ſervavi. Trivialia, ſæpius Linneana, ipſe autor addidit, quæ in magno opere (1) neglexerat. Hâc ſimul datâ occaſione quædam in methodo ſuâ emendavit; adjecit plurima. Sic genus Eulophi poſt Tenthredines omnino omiſſum eſt, cum ſedulâ attentione factâ, Eulophus nihil alind ſit quàm verus Cynips antennis ramoſis. Hinc inſectum illud inter cynipes nunc incedit. Præterea multæ à viginti annis novæ in agro Pariſienſi detectæ ſunt inſectorum ſpecies, quæ ad ſua quæque genera revocatæ ſunt; ſed ut novæ illæ ſpecies quæ ducentum & quinquaginta ſuperant à cæteris in hiſtoriâ Inſectorum in-4°. deſcriptis

(1) Hiſt. abreg. des Inſectes, par M. Geoffroy, 2 vol. in-4°. Paris, 1764.

distinguantur, singulas asterico notandas curavi. Specierum dimensiones, & habitationum loca adjeci; sic ergo quoad numerum specierum & nomenclaturam hic catalogus multò auctior & emendatior magno opere in-4°. prodit, & hanc illustrationem celeb. Geoffroy omninò deberi fateor. Levia quædam vel addidi, vel mutavi tantum; quæ hic commemorare supervacuum duco; simplicis igitur editoris munus suscepi, utilitatis potiùs quàm gloriæ spe ductus.

Dabam Lutetiæ, mense apr. 1785.

Insectorum Divisio generalis.

Inſecta dividuntur in ſex ſectiones.

Sectio I. *Coleoptera*, quorum alæ coleoptris ſeu elytris teguntur & quibus eſt os maxilloſum.

Sectio II. *Hemiptera*, quorum alæ ſuperiores elytris accedunt, & quorum os ſub thorace eſt inflexum.

Sectio III. *Tetraptera alis farinaceis*, quibus ſunt quatuor alæ ſquamulis tectæ.

Sectio IV. *Tetraptera alis nudis*, quibus alæ quatuor ſunt membranaceæ.

Sectio V. *Diptera*, quibus ſunt alæ duæ & halteres ſub alarum origine.

Sectio VI. *Aptera*, quæ carent alis.

Prima autem ſectio, coleopterorum ſcilicet, cum maxime numeroſa ſit, in articulos & ordines diſpertitur.

Articulus primus inſecta coleoptera comprehendit quæ coleoptra gerunt integra & dura.

Articulus ſecundus ex iis componitur quorum coleoptra dura ſunt, ſed dimidiata, ſeu ſemiſecta ita ut abdomen non omnino tegant.

Articulus tertius ea exhibet inſecta, quorum coleoptra mollia ſunt & membranacea.

Ex iis articulis quiſque in varios ordines dividitur, prout tarſi inſectorum varium referunt articulorum numerum, duos nempe, tres, quatuor aut quinque articulos, vel quinque in primo & ſecundo pedum pari, quatuor verò in poſteriore.

ERRATUM.

Pag. 82, *lin.* 8, tribus *lege* tibiis.

Extrait des registres de l'Académie des Sciences.

Du 13 Juillet 1785.

LES Commissaires nommés par l'Académie, lui ayant rendu compte d'un Ouvrage de M. DE FOURCROY, intitulé : *Entomologia Parisiensis*, elle a jugé cet Ouvrage digne de son approbation, & de paroître sous son Privilège.

Je certifie le présent extrait conforme à l'original & aux registres de l'Académie. Le 13 Juillet 1785.

Signé, le Marquis DE CONDORCET.

Extrait des registres de la Société Royale de Médecine.

LA Société Royale de Médecine ayant entendu, dans la séance tenue au Louvre le 23 Juin présent mois, la lecture d'un rapport très-avantageux fait par MM. GEOFFROY & MAUDUYT, sur un Ouvrage de M. DE FOURCROY, intitulé : *Entomologia Parisiensis, sive Catalogus Insectorum quæ circa Lutetiam reperiuntur, &c.* a pensé que cet Ouvrage étoit très-digne de son approbation. En foi de quoi j'ai signé le présent. A Paris, ce 28 Juin 1785.

Signé, VICQ D'AZIR, Secrétaire perpétuel.

ENTOMOLOGIA

Notes

sur l'Entomologie Parisienne

contenant

1°. un résumé de la methode de Géoffroi

2°. un résumé de celle d'Olivier.

---

frimaire an Sept.

Résumé

de la méthode de Geoffroi.

Classifications.

1°. Coléoptères ayant des ailes recouvertes par des étuis ou élytres; bouche armée de mâchoires dures. page 1re.

2°. hemiptères ailes super. presque semblables à des étuis; bouche armée d'une trompe aigue, repliée en dessous le long du c. ps. page 184.

3°. Tetraptères à ailes farineuses: 4 ailes chargées de poussière écailleuse. page 233.

4°. tetraptères à ailes nues. 4 ailes membraneuses, nues et sans poussière: page 343.

5°. Diptères 2 ailes, un petit balancier au dessous à leur origine. page 451.

6°. Aptères. Corps sans ailes. page 517.

Soudivisions des Classes.

Classe 1ère Coléoptères.

Art. 1er Etuis durs qui couvrent tout le Ventre p. 1.

ordre 1er 5 articles à tous les Tarses (page 1.)

ordre 2e 4 articles à tous les Tarses (page 71)

ordre 3e 3 articles à tous les Tarses (page 149)

ordre 4e 5 arti. aux 4 piés de devant, 4 à ceux de derr. (p.152)

Article 2e Etuis durs qui ne couvrent qu'une partie du Ventre (p.163)

ordre 1er 5 articles à tous les Tarses (p.163.)

ordre 2e 4 articles à tous les tarses (p.173)

ordre 3e 3 articles à tous les Tarses (p.175)

ordre 4e 5 art. aux 4 piés de devant, 4 à ceux de derr. (p.176)

Article 3e Etuis mous & co[?] membraneux (p.177)

ordre 1er 5 art. aux 4 piés de devant, 4 à ceux de derr. (p.177)

ordre 2e 5 articles à tous les tarses (p. 178)

ordre 3e 3 articles à tous les Tarses (p. 179)

ordre 4e 4 articles à tous les Tarses (p. 182)

ordre 5e 5 articles à tous les Tarses (p. 189)

Classe 4e Tetraptères aîles nues

ordre 1er 3 articles à tous les Tarses (p. 343)

ordre 2e 4 articles à tous les Tarses (p. 350)

ordre 3e 5 articles à tous les Tarses (p. 350)

Toutes les autres Classes sont sans division

Genres.

1°. Coléoptères. Etuis durs & entiers.

Doigts tous à 5 articles

Platycerus antennes en peigne d'un côté, à l'extrémité (2)
Ptilinus antennes en peigne d'un côté, dans toute la longueur (4.)
Scarabeus ant. en masse lamellée; écusson entre les Elytres à leur origine (4)
Copris antennes en masse lamellée; point d'écusson à l'origine des Elytres. (1?)
Melolontha ant. en masse entière, brisées au milieu. Tête renfoncée dans le corselet (6)
Dermestes ant. en masse perfoliée; dr. article solide gibbeux: Elytres point bordées (1?)
Hister ant. demi-masses, à 3 dr. art. en bouas (?)
Anthrenus ant. en masse solide un peu applatie, droites (?)
Silpha ant. perfoliées ... thorax conique non bordé (26)
Peltis ant. id. Thorax & Elytres bordés (?)
Cucujus ant. courtes, ... thorax nu en dessous. Tête à moitié enfoncée dans le corselet ... (?)
Elater antennes en ... ou filif. insérées entre la cavité de la tête en dessous. Corselet terminé en dessous par une pointe reçue dans la cavité de la poitrine (?)
Cerambix ant. filif. un ... trochanter, ou appendice à la base des cuisses de derrière (10)
Bruchus ant. filif. corselet arrondi en bosse. Corps ... dos convexe (5?)
Lampyris ant. filif. Corselet grand, applati, cachant la tête par un large rebord (5?) ... du ventre plié en papilles

Cicindela aut. filif. corselet plane, bordé. tête découverte élytres flexibles (59)

[illegible]alis aut. illif. corselet plane, 4gone; terminé postérieurem. en 2 angles aigus. (64)

Hydrophylus aut. en masse, perfoliées; p. courtes que les palpes. piés propres à la nage. (65)

Dytiscus aut. filif. p. longues que la tête. piés id. (66)

Gyrinus aut. raides p. courtes que la tête: piés id. 4 yeux (71)

2°. doits tous à 4 articles;

Melolontha aut. en scie, placées devant les yeux (71)

Prionus aut. en scie, placées dans l'œil. (73)

Cerambix aut. placées dans l'œil, diminuant de grosseur de la base au sommet. corselet armé de pointes (73)

Leptura aut. id. corselet sans pointes (77)

Stenocorus aut. placées devant les yeux, diminuant de grosseur de la base au sommet: élytres p. étroits par le bout (89)

[illegible]upreus aut. filif. à longs articles: corselet plane, bordé (89)

Cryptocephalus aut. id. thorax bossu, hémisphér. (90)

Crioceris aut. cylindr. à articul. globuleuses. corselet cylindr. (94)

[illegible]ica aut. égales partout: cuisses postérieures renflées & presque globuleuses (97)

[illegible]aleruca aut. égales partout; artic. un peu renflées. corselet inégal, scabre, bordé (102)

Chrysomela aut. grossissant de la base au sommet; artic. globul. corselet égal, bordé (104)

Mylabris aut. croissant sensiblt. à articul. hémisphér. insérées sur un bec; court & plane. halytra fon

extrémité (112)

Rhinomacer ant. toutes droites, coudées : insérées sur un long bec (115).

Curculio ant. en masse, brisées, placées sur un long bec de substance (116)

Attelabus ant. en masse, comp. de 3 articles placées sur la tête : point de bec. corselet cubique, retrécit la tête : tarses non épineux. (133)

Clerus ant. id. point de bec : corselet un peu cylind. point bordé : tarses spongieux (134)

Dermestes ant. id. point de bec. corselet large, bordé : tarses spongieux (138)

Scolytus ant. à masse solide, point de bec (130)

Cassida ant. noueuses, plus épaisses à l'extrémité. corselet & élytres bordés, tête couverte par le corselet (140)

Chrysomela ant. filif. croissant sensiblement. écusson à peine visible : corselet plane, lisse, point bordé (141)
3 articles aux doigts

Coccinella ant. noueuses plus épaisses à l'extrém. plus courtes que les palpes : corps hemisphér. (145)

Tritoma ant. plus épaisses sensiblement à l'extrém. corps oblong. (152) ant. plus longues que les palpes. 4 (?) art. aux 4 pieds devant, 3 aux 2 de derr.

Diaperis ant. laxiformes ; articul. lentif. perfoliés. corselet convexe, bordé (152)

Pyrochroa ant. en peigne d'un côté : corselet inégal, scabre, non bordé (153)

Cantharis ant. filif. thorax id. (157)

Tenebrio ant. filif. corselet convexe, bordé (156)

Mordella ant. un peu en scie, articul. triangul. corselet convexe, plus étroit en devant (151)

Clairons ant. filif: contien à capitu, à dent aiguë (162)
Anthrènes ant. à des articles en massue, celles des ♂ sont pliées bien presque au milieu (163)

2° Coléoptères; Étuis durs, point entiers.

1° 5 articles aux tarses
Staphylin ant. filif. ailes couvertes; abdomen sans armé (163)

2° 4 articles aux tarses
Necydalis ant. filif. ailes nues, (175)

3° 3 articles aux tarses
Forficula ant. filif. ailes recouvertes; abdomen armé de crochets. 175 Perce oreilles.

4° 5 articles en avant, 4 en arrière.
Meloë ant. décroissant du milieu vers la base et le sommet. (176) point d'ailes.

3° Coléoptères, à Étuis mous.

1° 5 articles en avant, 4 en arrière
Blatta ant. filif. des appendices vésiculeux, situés aux côtés de l'anus, & sillonnés en travers (177)

2° 2 articles à tous les tarses
Thrips ant. filif. la bouche avec une fente longitudinale. tarses vésiculeux (178)

3° 3 articles aux tarses
Gryllus ant. sétif. queue à 2 soies. 3 ocelles (179)
Acrydium ant. filif. plus courtes que la moitié du corps 3 ocelles (180)

4° 4 articles aux tarses
Locusta ant. filif. plus longues que le corps. 3 ocelles. (182)

5° 5 articles aux tarses
Mantis antennes filif. (183)
[illegible] une appendice qui revient en dessous [illegible] de chaque côté

Classe 2e Hemiptères.

Cicada	3 art: aux tarses: antennes pl. courtes que la tête, 2 ocelles: bec replié. 4 ailes, les inf. en croix. (184)
Cimex	3 articles aux tarses: ant. pl. longues que la tête, à 4-5 artic.: bec réfl. 4 ailes, les sup. à une ½ membran. (194)
Gerris	2 art. aux tarses: ant. très courtes, placées sous les yeux: 4 ailes en croix: 6 piés, ceux de devant en f. de pince. 1 ému sson. (219) bec arti.
Notonecta	2 art. aux tarses: antennes très courtes, placées sous les yeux: bec réfl. 4 ailes en croix: 6 piés propres à nager: 1 ecusson (220)
Corixa	1 seul article aux tarses: ant. bec. 4 ailes id. 6 piés, ceux de devant en pince, ceux de derrière propres à nager. écusson. 0 (221)
Nepa	1 seul article aux tarses: antennes en pinces. bec réfl. 4 ailes en croix: 4 piés. (221)
Psylla	2 articles aux tarses: bec recourbé naissant entre la 1re & la 2e paire de cuisses. 4 ailes vertic. later. piés propres à sauter: abdomen acuminé 3 Ocelles (222)
Aphid	1 seul article aux tarses: bec réfl. ailes nulles ou toutes 4 droites. piés propres à marcher abdomen à 2 cornes. (225) ou 2 tubercules.
Chermes	bec co. la psylle: (le ♂ a 2 ailes élevées:) abdomen à appendices sétacées: ♀ ressemblant à 1 follicule (227)
Coccus	bec id. ailes id. abdomen id. la ♀ conserve la forme d'un insecte (231)

Classe 3e. Tetrapt. farineux

Papilio — antennes en masse : nymphe nue (233)

Sphinx — antennes prismatiques ; nymphe dans une coque (251)

Pterophore — ant. filif. langue en spirale ; ailes rameuses, rameaux velus : nymphe nue horiz. (256)

Phalènes — ant. décroissant de la base au sommet ; nymphe dans une coque ; larve nue (257)

Tinea — ant. filif. id. front un peu proéminent. larve couverte d'une habitation formée par des fen. [illegible], dans laquelle elle devient nymphe (320)

Classe 4e. Tetraptères nud.

1o. 3 articles aux tarses.

Libellula — ant. très courtes : bouche à machoires ; ♂ à queue comp. de 2 petits crochets ; 3 ocelles en devant ou dans les yeux (343).

Perla — ant. filif. ailes égales, couchées sur le dos dans le repos et croisées. bouche à 4 tentacules ; queue à 2 soies ; 3 ocelles (348)

2o. 4 articles aux tarses

Raphidia — ant. filif. ailes couchées parallèles dans le repos. bouche à 4 tentacules. ♀ une appendice allongée à la queue ; 3 ocelles (350)

3o. 5 articles aux tarses

Ephemera — ant. très courtes ; ailes inf. beaucoup pl. courtes ; queue à 2-3 soies ; 3 grands ocelles devant les yeux (350)

Phryganea — ant. filif. ailes latérales en toit, presque dr. [illegible] en arrière : 4 tentacules à la bouche ; queue nue ; 3 ocelles (353)

Hemerobius — ant. filif. ailes [illegible] égales : bouche à 4 palpes

proéminente queue nue. point d'Ocelles (358)

Raphidia	ant. courtes, en masse, épaisses: ailes égales bouche à 4 palpes proéminentes: queue nue point d'Ocelles (359)
Panorpa	antennes longues filif. ailes égales; trompe dure & Cylind. armée en pince de Crabe 3 Ocelles (360)
Crabro	ant. en masse; ailes inf. p. courtes. bouche armée de Machoires: aiguillon du dernier anneau Ventre entièrement joint au corselet & partout d'égale grosseur. 3 Ocelles (361)
Uroceres	ant. filif. ailes & bouche id. aiguillon dentelé proéminent, couvert d'une gouttière Ventre id. 3 Ocelles (362)
Tenthredo	ant. ailes bouche & Ventre id. aiguillon dentelé caché dans le corps. 3 Ocelles (363)
Cinips	ant. brisées, ailes inf. p. courtes bouche armée de machoires: aiguillon conique entre 2 lames du Ventre: Ventre presqu'ovale aplati des côtés, attaché au corselet par 1 pied. court. 3 ocelles (379)
Diplolepis	ant. filif. longues Comp. de 14 art: le reste id. Ventre aigu en dessous. (391)
Eulophus (Cirtum lynips)	ant. branchues: ailes inf. p. courtes. bouche armée de Machoires: aiguillon conique Ventre presqu'ovale, attaché au corselet par 1 pied. court 3 ocelles (393)
Ichneumon	ant. filif. longues Vibratiles: ailes & bouche id. aiguillon divisé en 3 pièces: Ventre attaché au corselet par 1 pied. long ou mince. 3 ocelles (393)
Vespa	ant. brisées dont le 1er anneau est très long

ailes inf. p. courtes : bouche armée de Mâchoires avec une trompe membraneuse en dessous : aiguillon simple en pointe. Ventre attaché au corselet par un péd. court. 3 ocelles corps glabre (449)

[illegible]ile — tout id. corps velu, trompe divisée en 2 soies (442)
[illegible] — aut. [illegible] (point d'ailes dans les mulets) bouche armée de Machoires ; ventre attaché au corselet par 1 péd. court avec une écaille entre deux. 3 ocelles. (451)

Classe 8e Diptères.

[illegible] — Antennes sétacées qui naissent d'un bouton 3 pointé au-dessus de la bouche. 3 ocelles (454).
[illegible] — Antennes sétacées coniques, de 3 ou 4 part. bouche comp. d'une trompe & de 6 dents qui se joignent. 3 Ocelles. (455)
[illegible]sylus — aut. id. bouche formée par une trompe simple & aigue. 3 ocelles (459)
[illegible]alysmia — aut. sétacées & brisées : bouche avec une trompe sans dents ; l'extrémité du corselet armée de pointes ; 3 Ocelles (456)
[illegible]usca. — ant. formées par une palette platte & solide, avec une soie ou 1 poil latéral. bouche avec 1 trompe sans dents. 3 ocelles (469)
[illegible]moxia — ant. formées par une palette, avec un poil latéral velu : bouche formée par une trompe simple & aigue. 3 ocelles (500)
[illegible] — ant. formées par une palette, avec un poil latéral velu, & placées sur la tête : bouche formée par une trompe renfermée dans

une gaine où bec aigu : 3 ocelles (500)

Nemestelus [?] — ant. grenues, terminée par une pointe & placées sur la racine de la trompe : bouche formée par une trompe renfermée dans une gaine en bec aigu : 3 ocelles (502)

Scenopse — ant. filif. bouche avec une trompe, sans dents. 3 ocelles (503)

Hippobosca — ant. sétacées, très courtes, comp. d'un seul poil. bouche formée par une espèce de bec cylindr. & obtus. 3 ocelles (504)

Tipula — ant. filif. un peu pectinées (surtout en panache dans les ♂) beaucoup plus longues que la tête : bouche accompagnée de barbillons recourbés & articulés. 3 ocelles (504)

Bibio — ant. en fil perfoliées, presqu'aussi courtes que la tête. bouche id. 3 ocelles (514)

Culex — ant. pectinées (en panache dans les ♂) bouche formée par un tuyau mince & filif. 3 ocelles (515)

Classe 6.e Aptères.

Pediculus — 6 pattes, 2 yeux, ant. filif. ventre simple (5..)

Podura — 6 pattes, 2 yeux ; queue fourchue, repliée à l'extrémité du ventre, et faisant le ressort pour aider l'insecte à sauter : corps couvert de petites écailles (522)

Forbicina — 6 pattes, dont l'origine est large & écailleuse. 2 yeux. bouche avec deux barbillons mobiles. ant. filif. 3 filet. au bout de la queue. corps id. (525)

Pulex	6 pattes propres à sauter. 2 yeux. bouche recourbée en dessous. ant. filif. ventre simple & arrondi (526)
Chelifer	8 pattes. 8 yeux. ant. en pince de Crabe. pl. longues que la trompe (526)
Acarus	8 pattes. 2 yeux. ant. simples pl. courtes que la trompe (527)
Phalangium	8 pattes: 2 yeux: ant. formant un angle aigu. 2 longs barbillons semblables à des ant. (530)
Aranea	8 pattes, 8 yeux (531)
Monoculus	6 pattes, 1 seul oeil. ant. branchues avec rangées poils latéraux. corps crustacé (537)
Binoculus	6 pattes, 2 yeux: ant. simples & sétacées queue fourchue; corps crustacé (539)
Cancer	10 pattes, les 2 premières en forme de pinces: 2 yeux; ant. filif. queue comp. de plusieurs lames. corps crustacé (540).
Oniscus	14 pattes: 2 ant. courtes (540)
Asellus	14 pattes. 4 ant. brisées dont 2 sont pl. longues (541)
Scolopendra	24 au m. souvent plus. corps applati. ant. filif. comp. de plusieurs articles courts (542)
Julus	pl. de 100 pattes: corps arrondi & cylindr. ant. comp. de 5 articles (544)

Résumé

du Sistême D'Olivier.

Classification

1. 4 ailes découvertes

1° Lépidoptères, 4 ailes membraneuses, recouvertes d'une poussière écailleuse. Trompe en spirale

2° Névroptères : 4 ailes nues, membraneuses, réticulées, bouche munie de mandibules & de machoires.

3° Hymenoptères 4 ailes nues, membraneuses, veinures inégales : bouche munie de mandibules & d'une trompe souvent très courte, & imperceptible.

2° 2 ailes cachées sous des Etuis.

4 Hemypteres 2 ailes croisées sous des étuis mous, à demi membraneux. trompe aigue, recourbée sous la poitrine.

5 Orthoptères : ailes pliées longitudinalement sous des étuis mous, presque membraneux : bouche munie de mandibules & de machoires.

6 Coleoptères 2 ailes pliées transversᵗ sous des étuis durs & crustacés ; bouche munie de mandibules & de machoires

3° 2 ailes Découvertes

7 Diptères 2 ailes, nues membran. veinées : balanciers, trompe rétractile.

4° Point d'ailes dans les 2 Sexes

8 Aptères point d'ailes, bouche variable.

Genres

1 Lepidoptères

Papillon (255) — aut. filif. terminées par un bouton à q. le massue. 2 aut.[les] courtes égales, compr. velues & recourbées. trompe longue div. en 2, cachée entre les aut.[les]

Sphinx. (256) — aut. filif. prismatiques, terminées en pointe mousse. 2 aut.[les] égales, compr. velues & recourbées. trompe très longue, div. en 2, roulée & cachée entre les aut.[les]

Sesia (Zygæna) Sphinx (256) — aut. cylindr. un peu renflées vers le bout, terminées en pointe mousse. 2 aut.[les] égales, aiguës, compr. & velues. trompe longue, filif. div. en 2, roulée & cachée entre les aut.[les]

Zygæna Sphinx (256) — aut. filif. à leur base, renflées vers le bout & terminées en pointe. 2 aut.[les] égales, compr. & velues. trompe de longueur moyenne sétacée, div. en 2 & cachée entre les aut.[les]

Bombix Phalæna (257) — aut. filif. pectinées : art. courts & grenus. 2 aut.[les] égales, compr. & velues. trompe courte, filif. membran. div. en 2 & cachée entre les aut.[les]

Hepialus Phalæna (257) — aut. courtes, filif. articles distincts, égaux & arrondis. 2 aut.[les] égales, membran. compr. & velues. trompe très courte, large, membran. div. en 2 & cachée entre les aut.[les]

Noctua Phalæna (257) — aut. sétacées, articles égaux, cylindr. à peine distincts. 2 aut.[les] égales, compr. velues, cylindr. à leur extrémité. trompe sétacée, aiguë, div. en 2, cachée entre les aut.[les]

Phalæna (257) — aut. filif. (souvent pectinées dans les ♂), articles très courts égaux à peine distincts. 2 aut.[les] égales compr. membran. cylindr. presque nues. trompe

membraneuse, div. en 2 cachée entre les aut.les

Pyralis Phalæna (3..) aut. filif. simples, articles court. & égaux. 2 aut.les égales, nues, cylindr. à leur base, dilatées au milieu, sétacées à leur pointe. trompe membran. sétacée, div. en 2, cachée entre les aut.les

Tinea (320) aut. sétacées, simples : articles égaux. très courts. 4 aut.les inégales ; les 2 antér. p.s longues, droites & avancées en avant. trompe membraneuse, div. en 2 cachée entre les aut.les infér.

Alucita (Linné 320) aut. sétacées, simples art. très courts, très nombreux, à peine distincts. 2 aut.les allongées, nues, égales, membraneuses, pointues, 2 fois. trompe sétacée, membraneuse, div. en 2, & cachée sous les aut.les

Pterophorus (3..) aut. sétacées, simples : articles, très courts, égaux très peu distincts. 2 aut.les amincies, cylindr. filif. subulées à leur extrémité, nues & membran. trompe allongée, sétacée, membran. div. en 2, cachée entre les aut.les

Classe 2. Névroptères

1°. 3 articles aux tarses

Libellula (343) aut. très courts, sétacées (art. dont le 1.er est beaucoup p.s gros que les autres. 2 aut.les velues à la base ext. des mâchoires, 2 articles, dont le 1.er très court, le 2.d beaucoup p.s long, presq. cylindr. l'abdomen des ♂ terminé par 2 petits crochets

Perla (348) aut. longues, sétacées ; articles nombreux, très courts le 1.er un peu p.s gros. 4 aut.les filif. avec lesquelles les antér. comp. de 4 articles, les post. de 3. l'abdomen communém.t terminé par 2 soies distantes & sétacées

4 articles aux tarses

[illegible] — ant. filif. de longueur moyenne; articles égaux, peu distincts, le 1er un peu pl. gros que les autres. 4 ant[illegible] courtes, presqu'égales, filif. les antér. comp. de 4 articles, & les postér. de 3. (abdomen terminé par une appendice sétacée, assez long.)

5 articles aux tarses.

[illegible] — ant. sétacées assez longues: articles très nombreux & peu distincts: 4 ant[illegible] inégales, filif. les antér. comp. de 4 articles les postér. de 3.

Myrmeleon (formicaleo) (349) — ant. courtes, renflées vers l'extrémité, articles très courts. 6 ant[illegible] inégales, filif. les postér. très longues (abdomen des ♂ terminé par 2 crochets.)

[illegible]rpa (350) — ant. longues, filif. articles très courts & très nombreux. 4 ant[illegible] filif. égales, les ant. comp. de 4 articles, les postér. de 2 (abdomen des ♂ terminé par une queue articulée, armée de pinces)

Phryganea (353) — ant. longues & sétacées; articles très nombreux très courts, le 1er un peu pl. gros. 4 ant[illegible] inégales, filif. les antér. pl. longues & comp. de 5 articles les postér. courtes & comp. de 4 (abdomen simple)

[illegible]hemera (350) — ant. très courtes & subulées: articles nombreux à peine distincts. 4 ant[illegible] très courtes, peu apparentes, égales, filif. les antér. comp. de 4 articles, les postér. de 3 (abdomen terminé par 2 ou 3 filets longs & sétacés)

[illegible] (pediculus) (517) — ant. monilif. de la longueur du corselet. 14 articles arrondis & distincts. 4 ant[illegible] égales, filif. les antér. comp. de 4 articles, les postér. de 3 (abdomen simple, insecte sans ailes)

Classe III. Hyménoptères

1° Bouche sans trompe.

Formica (429) ant. filif. brisées. 1er article très long & cylind. 4 ant.res courtes, filif. les antér. un peu plus longues comp. de 6 articles égaux, les postér. de 4. Ventre attaché au corselet par un pédic., petites écailles saillantes entre-deux (point d'ailes dans les neutres)

Crabro ant. courtes filif. 1er article long & cylindr. les autres très courts. 4 ant.les inégales, les antér. comp. de 6 articles, dont le 2e, 3e, & 4e gros & coniques; les postér. comp. de 4 articles, dont le 1er très mince à la base (aiguillon simple, pointu, caché dans l'abdomen)

Vespa (429) ant. filif. brisées. 1er article long & cylindr. le 2e long & presque conique. 4 ant.les filif. inégales. les antér. un peu plus longues, comp. de 6 articles. les postér. de 4, dont le dernier tronqué & très petit (aiguillon simple & très pointu, caché dans l'abd.)

Chrysis (429) ant. courtes, filif. 1er article un peu plus long: les autres courts & égaux. 4 ant.les filif. inégales: les antér. un peu plus longues. comp. de 5 articles les postér. de 4 dont le 1er à peine distinct. (Ventre attaché au corselet par un péd. court. aiguillon)

Ichneumon (293) ant. sétacées, longues & vibratiles; articles très courts, nombreux, peu distincts. 4 ant.les inégales; filif. les antér. un peu plus longues comp. de 6 artic. les postér. de 4; Ventre attaché au corselet par un péd. long & mince; aiguillon flexible, long & div. en 3 pièces (dans la ♀)

Uroceus (302) ant. filif. articles courts, égaux, cylind. & distincts

4 aut.les très courtes, inégales. les antér. comp. de 2 articles égaux : les postér. de 4 dont les derniers p.s gros (Ventre joint au Corselet, terminé par une pointe [illegible] aiguillon dentelé, caché sous une gaine creusée en gouttière, [illegible])

Cryllaria: aut. en masse, un peu p.s courtes que le corselet. [illegible] 4 aut.les filif. les 2 antér. un peu p.s longues, comp. de 5 articles les 2 postér. de 4 (Ventre joint au corselet. aiguillon denté, caché dans l'abdomen des ♀)

Tenthredo (263) aut. filif. p.s longues que le corselet, articles égaux distincts, cylindr. 4 aut.les inégales, filif. les antér. p.s longues, comp. de 6 articles, les postér. de 4 (Ventre joint au corselet, aiguillon denté caché dans l'abdomen)

Ciplolepis (291) aut. filif. longues. 14 articles, cylindr. égaux très distincts. 4 aut.les courtes, les antér. filif. de 5 arti. égaux les postér. de 3, dont le dernier en masse (Ventre un peu comp. aiguillon caché entre 2 lames du Ventre)

Cynips (279) aut. filif. brisées 1.er art. très long & cylindr. le 2. petit, les autres courts, égaux, peu distincts. 4 aut.les courtes, inégales, presqu'en masse : les antér. un peu p.s longues, de 6 articles. les postér. de 4 (Ventre [illegible] aiguillon courbé & [illegible])

2°. bouche avec une Trompe.

Chalcis [illegible] aut. courtes, filif. un peu p.s grosses par le bout 1.er article p.s [illegible]. 4 aut.les filif. les antér. un peu p.s longues, comp. de [illegible] articles presqu'égaux les postér. de 4 (Ventre presque globuleux, attaché au corselet par un long péd. aiguillon caché dans l'abdomen. aut.les postér. [illegible])

Sphex — ant. un peu plus longues que la corselet, filif. en spirale
Ichneumon — 11 articles egaux, cylindr. distincts. 4 ant. filif.
(303) — presqu'égales. les antér. un peu plus longues, en écaille
les postér. de 4 (valve attachée au corselet) par une
pièce plus ou moins long. aiguille. pointu simple ou bicannelée

Andrena — ant. courtes filif. 1er article long, mince à sa base.
apis (362) — [illegible] les valves réunies 3 en une trompe
[illegible] pièces, supér. renfermées dans une gaine. 4
ant. filif. inégales. les antér. de 3 art. les poster. de 2
aiguillon simple caché dans l'abdomen)

Apis — ant. filif. courtes, brisées. 1er article très long: les autres
courts egaux. Trompe div. en 5 pièces; 3 supér. libres
supérieures dans une gaine à leur base. 4 ant. sétacées
très courtes. les antér. de 6 art. les post. de 3 (aiguillon
simple, très pointu, caché dans l'abdomen)

Eucera — ant. longues, 12 articles, égaux, presque cylindr.
Apis (362) — trompe div. en 5 pièces, supér. libres. 4 ant. courtes
filif. les antér. un peu plus longues, de 6 art. les poster.
de 2 (aig. simple et pointu caché dans l'abdomen)

Class. IV. Hémiptères

1re classe d'égale consistance

Membracis — ant. très courtes subulées, posées devant les yeux. 1er
Cicada (344) — article plus gros que les autres, presqu'arrondi. trompe
recourbée, longue obtuse, comp. de 3 arti les, renfermées
3 soies. 3 articles aux tarses (corselet dilaté)

Cicada — ant. courtes, sétacées, posées entre les 2 yeux. 5 articles
(34) — dont le 1er plus gros que les autres. trompe recourbée, filif.
longue à 3 articles, renfermant 3 soies. 3 articles aux
tarses, dont les 2 premiers très courts.

Tettigonia — ant. très courtes, minces, subulées, posées devant les yeux
(184) — 1er article globuleux, les autres à peine distincts

trompe courte, recourbée; comp. de 3 articles, renfermant 3 soies. 3 articles aux tarses.

Psylla (222) — ant. cylindr. 11 art. égaux. trompe recourbée, naissant entre la 1ère & la 2e paire de pattes. 2 articles aux tarses (pattes propres à sauter)

Aphides (225) — ant. filif. pl. longues que le corselet, posées devant les yeux. 1er article un peu pl. gros que les autres. trompe allongée, recourbée, comp. de 4 articles renferm. une seule soie. 1 seul. art. aux tarses. (abd. terminé par 2 fil. droits & saillants)

Thrips (178) — ant. filif. de la longueur du corselet. 7 art. dont le 1er pl. grand & le dern. pl. petit. trompe cachée dans une fente longitudinale. 2 art. aux tarses, dont les dern. forme une espèce de vésicule.

Chermes (227) — ant. filif. terminées par un fil. sétacé. trompe allongée, recourbée, à 3 art. posée entre la 1e & la 2e paire de pattes. 3 art. aux tarses (♀ aptère)

Coccus (228) — ant. courtes filif. presque cylindr. trompe courte recourbée, à 3 art. posée id. pattes très courtes, & souvent imperceptibles (♀ aptère)

:: élytres, moitié coriaces & moitié membraneuses

Notonecta (220) — ant. courtes, posées au dessous des yeux, 3 art. dont le 1er pl. gros, & le dern. pl. petit. trompe courte, recourbée, à 3 art. renfermant 3 soies. 2 art. aux tarses, les poster. larges, applatis & ciliés.

Corixa (221) — ant. très courtes, posées sous les yeux, 3 art. presq. égaux. trompe courte, recourbée, à 1 seul article, renferm. 3 soies. tarses à 1 seul art. les post. applatis, larges, ciliés

Nepa / Hepa (224) — ant. très courtes, peu apparentes, posées sous les yeux, cachées dans 1 fossette, & à 3 art. trompe id. 1-2 art. aux tarses. pattes antér. portées en avant. abd. des ♀

terminé par 2 fil. sétacés.

Orthocoris (119) ant. très courtes, posées au dessous des yeux. trompe id. 3 art. aux tarses, les postér. aplatis, arqués, ciliés. pattes antér. courtes, armées d'un onglet très fort.

Cimex (194) ant. filif. à 4 art. très distincts; trompe recourbée sous la poitrine, creusée en gouttière, & contenant 3 soies. 3 art. aux tarses; corps allongé, ou ovale, souvent déprimé.

Cimex (194) — Lectatoma ant. filif. comp. de 5 art. cylindr. trompe id. 3 art aux tarses. Corps souvent ovale.

Reduvius (194) ant. sétacées, pl. longues que le corselet, à 4 art. trompe id. courte, & courbée en arc. 3 art. aux tarses. Corps allongé, tête étroite avancée.

Classe V Orthoptères

Blatta (177) ant. longues, sétacées, posées sous les yeux, à art. nombreux très courts & peu distincts. 4 ant. fil. les antér. un peu pl. longues, comp. de 5 art. dont les 1rs très courts; les postér. de 3, presqu'égaux. 5 art. aux tarses des 4 pattes antér. & à ceux des postér. pattes propres à la course; abd. terminé par 2 appendices très courts)

Gryllus (179) ant. longues, sétacées, posées entre les yeux. art. id. 4 ant. fil. les antér. une fois pl. longues & à 5 art. dont le dernier très court: les post. de 3. tarses à 3 art. le 2e très court. abd. terminé par 2 appendices longs sétacées & distantes)

Locusta (181) ant. très longues & sétacées. art. id. 4 ant. les antér. un peu pl. longues, à 5 art. presq. cylindr. les 2 1ers très courts, les post. de 3. 4 art. aux tarses. abd. terminé par une pte deux lames tranchante & pointue, dans les ♀. pattes propres à sauter)

Mantis (183) ant. sétacées, de longueur moyenne, posées entre les yeux

art. id. 4 autres filif. presqu'égales. les antér. à part les post. de 3 (pattes antér. armées de piquants et d'un onglet, très forts et très aigus. abd. simple)

[illegible] ant. filif. presque aussi que la ½ du corps : 11 art. cylindr. égaux, distincts. 4 ant. presqu'égales, filif. les antér. (180) à part. les post. de 3 (pattes post. propres au saut. abd. id.)

Classe VI Coléoptères

1°. 5 art. à tous les tarses

[illegible] ant. en masse, 10 art. dont le 1er très long ; les autres courts, égaux : les 4 derniers en masse feuilletée d'un seul côté : 4 ant. filif. inégales : les ant. comp. de 4 art. dont les 2 der. beaucoup pl. longs. les postér. de 3, dont le 1er très court, et le 2e long et aussi mandibules allongées et dentées (jambes antér. dentées)

[illegible] (pris. 13) ant. courtes, en masse. 10 art. dont le 1er pl. long et pl. gros que les autres. les 3 der. en masse oblique, feuilletée 4 ant. filif. courtes : les antér. à 4 art. dont le 1er très court, les postér. de 3 presqu'égaux (jambes id.)

Trox [illegible] (4) ant. courtes en masse. 10 articles, le 1er gros et velu, les derniers en masse ovale, feuilletée. 4 ant. courtes, un peu en masse. les antér. à 4 art. les postér. à 3. (Jambes id. tête presqu'entière cachée dans le corselet)

Melolontha [illegible] (4) ant. en masse allongée, feuilletée. 10 art. le 1er gros et presque sphér. 4 ant. inégales, filif. les antér. un peu pl. longues, à 4 art. le 1er très court ; les post. de 3. (Jambes antér. à 2 petites dentelures)

[illegible] [illegible] (4) Trichius ant. courtes, en masse ; 10 art. le 1er pl. gros, les 3 der. en masse ovale, feuilletée. 4 ant. filif. presq. égales. les antér. à 3 art. le der. allongé : les postér. de 3, le 1er très court. mandib. presque membraneuses, peu apparentes (jambes antér. dentées ; 1 écusson)

Scarabus ant. coudées, en masse: 11 art. le 1er. très long; un autre
ou
hister court & globuleux: les 3 der. en masse solide ovale
(16) 4 aut. presque filif. les autr. à 5 art. les 3 ant. obt..., les
poster. de 3. (Jambes ant. dentées, tête petite
un peu cachée dans le corselet)

[illegible] ant. coudées, en masse. 1er. art. pl. gros, branches-
(17) [illegible], presque globuleux: les 3 der. en masse perf.
4 ant. inégaux filif. les autr. à 5 art. égaux: les
poster. de 3 (Jambes simples, sans dentelures)

Microphorus ant. en masse, 1er. art. gros & assez long; les autr. courts
Dermestes (17) & presque globuleux: les 4 der. très gros, applatis en masse
perfoliée: 4 ant. égaux, filif. les anter. à 4 articles
le 1er. très court; les poster. de 4 le 1er. pl. long que les autres
(corselet bordé, applati)

Silpha ant. en masse; 1er. art. assez long, les autres courts &
Peltis (29) égaux: les 4 der. un peu pl. gros, en masse perfoliée
le der. ovale. 4 ant. inégales filif. les anter. un peu pl.
longues, à 4 art. le 1er. très court & très petit, le 2e gros
& conique: les post. de 3, le 1er. pl. long que les autres (Elytres
& corselet bordés)

Nitidula ant. en masse. art. courts presqu'égaux, les 3 der.
Dermestes (17) très gros applatis en masse perfoliée. 4 ant. [illegible]
égales. les anter. à 4 art. presqu'égaux. les post. de 3
(Corselet & Elytres un peu bordés)

[illegible] ant. Courtes, en masse; art. courts & [illegible] les
Cistela (8) 6 der. en masse perfoliée, applatis & grossissant
insensiblement. 4 ant. égales presqu'en masse. le der.
art. ovale & pl. gros: les anter. à 4 les poster. de 3
(Jambes compr.)

Anthrenus ant. courtes, en masse. art. presqu'égaux les 2 der.
(17) en masse solide, un peu compr. 4 ant. [illegible]

les antér. un peu p. longues, à 4 art. les postér. de 3 (corps ovale, presque arrondi)

Sphæridium — ant. courtes, en masse. articles égaux, presqu'arrondis
Dermestes (7) — les 4 der. pr. gros, en masse perfoliée; le der. pr. petit ovale. 4 ant. filif. inégales. les antér. à 4 art. les postér. de 3, très courtes (jambes épineuses, corps ovale, presqu'hémisphér.)

Anobium — ant. filif. légèrem. en masse, les 3 der. articles un
Ptinus (25) — peu pl. gros & pl. longs, presqu'ovales, amincis à leur base. 4 ant. égales, terminées en masse: les antér. de 4 art. les postér. de 3. (tête enfoncée dans le corselet; corselet convexe, un peu bordé)

Ptinus — ant. longues, filif. art. presqu'égaux, un peu coniques.
Bruchus (57) — 4 ant. égales, filif. les antér. à 4 art. les postér. de 3. (corselet élevé en bosse)

Ips — ant. droites, en masse. art. presque sphér. &
Dermestes (17) — égaux; les 3 der. pr. gros applatis, & perfoliés; le der. arrondi à sa pointe. 4 ant. très courtes, égales, filif. à 3 art. presqu'égaux; le der. ovale, un peu renflé (corps allongé, presque parallélipipède; 1er art. des tarses très court, & pr. petit que les autres)

Elaphrus — ant. filif. art. grains distincts, presqu'égaux:
Cicindela (19) — le 1er un peu pl. gros & renflé; le 2d. un peu pl. petit & arrondi. 4 ant. inégales, filif. les antér. un peu p. longues; à 4 art. le 1er pl. petit & pl. mince, & les autres égaux; les postér. de 3; le 1er très petit & à peine distinct.

Ptilinus — ant. pectinées d'un seul côté, dans toute leur
(4) — longueur, les 2 1rs articles simples & arrondis. 4 ant. courtes filif. les antér. un peu p. longues, à 4 art. égaux: les poster. de 3 dont les 2 1rs globuleux.

Malachius (64) ant. filif. art. presque cylindr. le 1er. plus gr., presque globuleux. 4 ant.res inégales filif. les antér. un peu plus longues, comp. de 4 art. presque globuleux, le 1er aminci à sa base : les post. de 2 art. égaux ; corselet un peu applati, terminé postér.t en angles aigus.

Telephorus (Cicindela, 59) ant. filif. art. cylindr. égaux, le 1er beaucoup plus court. 4 ant.res inégales, sécuriformes : les antér. un peu plus longues, à 4 art. les poster. de 3, le dr art. dilaté, compr. triangul. entier ou échancré. (côtés du ventre plissés & à papilles ; corselet plat, légèrem. bordé)

Malachius (Cicindela, 59) ant. filif. presqu'en scie, le 1er art. gros & arrondi. 4 ant.res filif. les antér. un peu plus longues, à 4 art. égaux, presque cylindr. les postér. de 3 (vésicules cachées de chaque côté de la poitrine & du ventre)

Lampyris (58) ant. filif. art. égaux, presque cylindr. le 1er un peu plus gros. 4 ant.les inégales, filif. les antér. un peu plus longues, à 4 art. les poster. de 3 (corselet grand applati, cachant la tête par un large rebord)

Lycus (Lampyris, 59) ant. filif. compr. souvent en scie. 1er art. plus petit & arrondi. 4 ant.res un peu plus grosses à l'extrémité, inégales ; le dr art. large, compr. presque triangul. les antér. à 4 art. les poster. à 3 (tête étroite, prolongée & allongée ; corselet applati, un peu bordé.)

Elater (38) ant. filif. en scie, souvent pectinées. 1er art. plus gros, arrondi ; le 2d. très petit. 4 ant.res courtes, inégales, sécurif. les antér. à 4 art. les poster. de 3. le dr art. plus gros dilaté, arrondi, presque triangul. (corselet terminé en dessous par une pointe reçue dans une cavité de la poitrine.)

Buprestis (Cucujus, 35) ant. courtes, filif. en scie. art. égaux, le 1er gros & arrondi. 4 ant.res inégales, filif. les antér. à 4 art. les

postér. de 3, le 1er oblong, presque tronqué; tête à moitié enfoncée dans le corselet.

[illegible] ant. filif. presque sétacées, art. cylindr. égaux, le 1er très court. 6 antles filif. les antér. à 2 art. allongés égaux; les moyennes pl. longues, à 4, dont le 1er très court & le 2d très long. les postér. de 4 dont les 2 1ers très courts (yeux saillants, tarses filif. appendice à la base des ailes postér.)

[illegible] ant. sétacées; art. courts & égaux, le 1er pl. gros. 6 antles presqu'égales filif. les antér. de 2 art. égaux; les moyennes de 4, cylindr. & les postér. de 3, dont le 1er pl. court (yeux saillants. appendice id.)

[illegible] ant. filif. art. allongés, égaux, presque cylindr. le 1er pl. gros, & arrondi; le 2d très petit. 6 antles inégales, filif. le 1er art. un peu pl. gros, & tronqué: les antér. très courtes de 2 art. égaux: les moyennes pl. longues de 4, & les postér. de 3 (corselet avec un rebord. app. id.)

[illegible] ant. courtes, en masse. art. arrondis, les 3 der. beaucoup pl. gros, en masse ovale, foliée, perfoliée. 4 antles inégales presqu'en masse, le der. art. ovale & renflé: les antér. un peu pl. longues, à 4 art. dont le 2d long & cylindr. les postér. de 3 dont le 1er très court. Tarses filif. 1er art. très court & le 2d assez long.

[illegible] ant. en masse, pl. courtes que les antles 1er art. gros & assez long, les autres courts & globuleux: les 4 der. très gros, en masse perfoliée. 4 antles inégales filif. les antér. longues, à 4 art. cylindr. le 1er très court. les postér. de 3 (tarses des pattes postér. larges & ciliés des 2 côtés)

[illegible] ant. filif. presque sétacées, de la longueur du corselet. art. presqu'égaux, coniques; le 1er assez long

le 2d. très courts, le dern. aminci. 6 aut.s filif. les antér. très courtes, à 2 art. égaux; les moyennes longues 4 à 6. les poster. de 4 (tarses postér. larges applatis & ciliés)

Gyrinus (71) — ant. très courtes, pédonculées: 1er art. grand en forme de cuiller, les autres très courts, grandistincts: 6 aut.s égales filif. les antér. à 4 art. arrondis, presqu'égaux: les postér. de 3 (6 pattes postér. id.

Staphylinus (163) — ant. filif. 1er art. alongé, les autres globuleux; les 2e au pr. courts, un peu compr. le dern. tronc, souvent coupé obliquem. 4 aut.les courtes, égales, filif. les antér. à 4 art. le 1er court & petit, le 2d. pr. long & conique les poster. de 3 égaux (Elytres très courtes)

Oxyporus staphylinus (163) — ant. courtes, monilif. presqu'en masse: 1er art. mince, les autres renflés, lenticulaires perfoliés le dern. arrondi à sa pointe. 4 aut.les courtes, égales les antér. à 4 art. égaux, filif. les poster. de 4 dont le dern. en masse, large, applati, 3 angul. presq. en croiss. aut (Elytres très courtes)

Paederus staphylinus (163) — ant. monilif. 1er art. un peu allongé, les autres égaux presque sphér. 4 aut.les inégales. les antér. beaucoup pl. longues à 4 art. le dern. ovale, un peu pl. gros, presqu'en masse: les poster. de 3 art. égaux filif. (Elytres très courtes)

2°. 5 art. à tous les pattes de devant; 4 seulem. à ceux des pattes de derrière

Meloë (176) ant. monilif. 1er art. assez long; le 2d. court & petit. le dern. sétacé. 4 aut.s inégales: les antér. un peu pl. longues: à 4 art. dont le 1er très court & très petit les post. de 3, dont le dr. ovale & un peu pl. gr.. (tarses terminés par 2 crochets; Elytres court. presq. ovale

…thacis (153) ant. filif. p^s longues que le corselet, art. égaux, presq. cylind^s. le 1er assez gros & le 2e. très court. 4 aut^es filif. inégales; les antér. à 4 art. le 1er. très court, les poster. de 3. (tarses terminés par 2 crochets. élytres molles & flexibles. tête inclinée.)

…rocamus (153) ant. moniliformes en masse. art. égaux, très applatis, dilatés en dedans; art. … dans le q. le dern. gros, en masse, comp^é. par les côtés. 4 aut^es égales, filif. les antér. à 4 art. le 1er très petit le 2e très allongé, le 3e & le 3e. très renflés, presque vesiculeux en dedans; les poster. de 3 art. égaux (tarses & élytres id.)

…ixaria (…) …ttharis (153) ant. filif. presque de la longueur du corps. art. égaux, cylind. le 1er à peine p^s gros, le 2e. un peu p^s court. 4 aut^es filif. les antér. un peu p^s longues, à 4 art. le 1er très court & très petit. les poster. de 3, le 1er un peu p^s petit (tarses terminés par 2 crochets, art. pénultième, large, bifide, garni de houppes)

…ctus (162) ant. filif. art. presque coniques, les dern^s arrondis, monilif. …ttharis (153) 4 aut^es monilif. les antér. à 3 art. arrondis, le d^er. à peine p^s gros & presque ovale; les postér. de 3, le 1er. très petit (art. pénultième des tarses id)

…yrochroa (153) ant. en scie ou pectinées: 1er art. gros & un peu allongé. le 2e. petit & presque rond. 4 aut^es inégales, filif. les antér. beaucoup p^s longues, à 4 art. le 1er. très court & très petit, le d^er. ovale, allongé. les poster. de 3. (tarses à art. pénultième, court, bifide, & garni de houppes)

…stela …ebris (156) ant. filif. un peu p^s longues que le corselet. art. presque coniques, le 2e. un peu p^s petit que les autres & arrondi. 4 aut^es filif. les antér. un peu p^s longues à 4 art. le 1er. très court & les autres presque égaux & coniques; les poster. à 3 très courts; le d^er. un peu p^s long & conique (tarses filif.)

Diaperis aut. courtes, renflées: 1er & 2e art. petits les autres [illegible]
(152) applatis, perfoliés. 4 aut. courtes, filif. les antér. à 4 art. le 1er très petit, le der. ovale: les postér. très courtes, de 3 art. à peine distinct (art. des tarses très courts, le der. très long)

Opatrum aut. filif. un peu plus grosses par le bout, plus courtes que le
Tenebrio (156) corselet: 2e art. petit & arrondi. 4 aut. en massue: les antér. un peu plus longues, à 4 art. le der. gros et tronqué. les poster. de 3 art. plus gros à leur extrémité (corselet avec un rebord)

Tenebrio aut. monilif. art. presqu'égaux: le 3e à peine plus long
(156) que les autres; le der. globuleux, un peu renflé. 4 aut. filif. les antér. un peu plus longues à 4 art. le 1er un peu plus petit, le der. un peu plus gros & tronqué (corps [illegible])

Pimelia aut. filif. à leur base, monilif. à leur extrémité: le 1er
Tenebrio (156) & le 2e art. très courts: le 3e très long presq. cylindr. les der. globuleux. 4 aut. les antér. beaucoup plus lo. à 4 art. presque coniques, un peu renflés. le der. oblong presque tronqué (corps souvent renflé)

Blaps aut. filif., monilif. à leur extrémité: 1er art. court, un
Tenebrio (156) peu plus gros, le 2e très petit; le 3e très long: les der. art. arrondis. 4 aut. inégales, en masse; les antér. à 4 art. 1er très petit. le der. gros, conique, un peu compr. [illegible] les postér. de 3 art. presqu'égaux, le der. tronqué.

Helops aut. filif. souvent presq. monilif. 2e art. un peu plus court
Tenebrio (156) le 3e à peine plus long que les autres. 4 aut. inégales. les ant. à 4 art. le 1er très mince à la base; les autres coniques; le der. en masse, large, compr. presq. [illegible] les post. de 3 art. dont le der. plus gros [illegible]

Mordella aut. filif. souvent un peu en scie, quelque fois pectinées
(151) de la longueur du corselet. 4 aut. les antér. un peu plus longues, à 4 art. le der. un peu plus gros allongé: les post. [illegible]

à 3 art. comme le ... convexe, abd. terminé en pointe dans les ♀.)

3°. 4 art. à tous les Tarses

Bionus (?) ant. longues, écartées, quelquefois en scie, 1er art. renflé 2e. très court arrondi, posées devant les yeux. 2 ant.les presqu'égales, filif. les antér. à 4 art. le 2e. très long, et le 3e. renflé à sa pointe, et ... long que : les postér. de 3 dont le 2e. très long. pénultième art. des Tarses, large, 2 lobé, garni de houppes (corselet applati, tranchant sur les côtés, dentelé, ou épineux)

...(?) ant. écartées, longues, posées dans les yeux. 1er art. gros et assez long. 2e. très court et très petit: les suivants un peu renflés à leur pointe: les 2 der. égaux compr. 4 ant.les presqu'égales, filif. les antér. à 4 art. le 1er. très court et très petit: les postér. de 3 dont le 1er. court et petit. Tarses id. (Corselet arrondi tuberculé ou épineux sur les côtés. yeux échancrés entourant la base des ant.)

...(?) ant. id. art. presq. cylindr. le 1er un peu p. gros et le 2e très court. 4 ant.les égales, filif. les antér. à 4 art. le 1er court, et le 2e assez long: les postér. à 3 art. presqu'égaux. Tarses id. (Corselet cylindr. yeux id.)

...ocorus (35) ant. filif. posées devant les yeux: 1er art. un peu p. gros, 2e. court et arrondi. 4 ant.les inégales, presque filif. 2er art. un peu p. gros, presqu'ovale à peine ... : les antér. de 4 art. les postér. de 3. Tarses id. (Corselet épineux ou tuberculé yeux ovales)

...(?) ant. ... à peu près de la longueur du corps, posées dans une échancrure, au devant des yeux. 4 ant.les égales: les antér. à 4 art. dont le der. presqu'en massue et le 1er petit: les postér. de 3 dont le der. assez gros. Tarses id. (Corselet globuleux, arrondi et légèrement applati)

Donacia (stenocorus) (85) ant. filif. un peu p.s courtes que le corps, posées devant les yeux. 1er art. assez gros; le 2d. à peine p. court que les autres. 4 ant. égales, filif. les autres à 11 art. égaux les post. de 3. Tarses id. (yeux ronds & saillants)

Leptura (stenocorus) (86) ant. filif. à peine de la longueur du corps posées devant les yeux: 1er art. très petit: 4 ant. inégales filif. les autres à 4 art. presqu'égaux. les post. de 3. Tarses id. (corselet un peu p.s étroit ant.)

Necydalis (Leptura 87) ant. filif. un peu p.s courtes que le corps, posées dans une échancrure au devant des yeux. 1er art. ... à son extrémité; le 2d. très petit. 4 ant. presqu'égales filif. les autres à 4 art. le 1er petit & le 2d ... les postér. de 3; le d. un peu p. long, & à peine p. gros que les autres. Tarses id. (élytres souvent très courtes rétrécies à leur pointe)

Cuperus (89) ant. filif. de la longueur du corps, art. égaux, cylindr. allongés. 4 ant. filif. les autres à 4 art. dont les 3 1ers courts & presqu'égaux; le d. ... & pointu, les postér. de 3, dont le d. pointu. Tarses id.

Clerus (...) ant. presque monilif. p. grosses à leur extrémité. le 1er art. long & en masse le 2d. court, assez gros, & obconique 4 ant. presqu'égales, les autres à peine p. courtes, à 4 art. le d. un peu p. gros, comprimé, conique; les postér. de 3: le d. triangul. presqu'en ... tronqué Tarses id. (corselet arrondi, un peu aminci postér.)

Bostrichus (133) ant. courtes en masse; le 1er art. assez gros & un peu allongé: le 2d. gros & globuleux: les 3 d.ers très gros, en masse perfoliée. 4 ant. égales, filif. les autres à 4 art. presque cylindr. les postér. à 3, dont le d. ... un peu p. gros. Tarses simples ... art. ...

Scolytus (134) ant. id. 1er art. assez gros: le 2d. globul. le d. gros en masse

solide. 4 ant.les courtes filif. presqu'égales; les antér. à 4 art. dont le d.er terminé en pointe; les poster. de 3. pénultième art. des tarses, large, 2 fide, garni de houppes (corselet gros presque cylindr. un peu renflé: tête enfoncée dans le corselet, arrondie & terminée en pointe.)

[illegible] ant. filif. presqu'en scie; 1.er art. assez gros, les 2 suivants simples, arrondis les 7 d.ers presqu'en scie. 4 ant.les filif. les antér. p.s longues, à 5 art. presqu'égaux: les poster. de 4, id. [illegible] Tarses id. (tête armée & penchée)

[illegible] (130) ant. courtes, en masse. 1.er art. gros & allongé, les autres un peu renflés, les 4 d.ers en masse perfoliée. 4 ant.les les antér. un peu p.s longues, à 4 art. le d.er en masse, [illegible] les poster. de 3. tarses id. (corselet large un peu bordé)

[illegible] (115) ant. moniliformes. un peu p.s courtes que le corselet; 1.er & 2.e art. un peu p.s gros: les 3 d.ers en masse perfoliée. 4 ant.les filif. les antér. un peu p.s longues, à 4 art. égaux, arrondis. les poster. de 3. bouche placée au bout d'une espèce de trompe dure & courte. Tarses id.

[illegible] (116) ant. brisées, presqu'en masse le 1.er art. long, & renflé à son extremité; les 4 d.ers formant une masse ovale; presque solide. 4 ant.les courtes filif. presqu'égales, les antér. à 4 art. dont le d.er terminé en pointe: les poster. de 3. Bouche id. Tarses id. Mandibules simples.

[illegible] (104) ant. moniliformes. p.s longues que le corselet; art. presque égaux, le 1.er un peu p.s gros. 4 ant.les inégales, les antér. un peu p.s longues, à 4 art. dont le d.er p.s gros et en masse. les poster. de 3, dont le 1.er très petit [illegible] unique. tarses id. machoires div. en 2 pièces (corselet large, un peu bordé)

[illegible] (97) ant. filif. presque de la longueur du corps. 4 ant.les filif. les antér. un peu p.s longues, à 4 art; le 1.er très court. le 2.e assez gros & arrondi, le 4.e en pointe: les poster. de 3.

* voyez en face — maxilles, 3 Tarses id. cuisses postér. renflées)

Crioceris * (94) ant. presque monilif. à peine de la longueur du corps: le 1er art. un peu p. gros; le 2e un peu p. petit. 4 antles courtes égales: les antér. à 4 art. dont le 1er un peu p. gros, en pointe: les postér. de 3 art. presque égaux: pénultième art. des Tarses, 2 fide & garni de houppes (corselet arrondi, presque cylindri.)

Hispa — *Crioceris* (94) ant. filif. de la longueur du corselet, très rapprochées à leur base, art. égaux, le 1er seul un peu p. gros. 4 antles courtes égales, [illegible] les antér. à 4 art. presque égaux les postér. de 3. Tarses id. (tête petite avancée corselet arrondi)

Cryptocephalus (90) *melolontha* — ant. filif. presque en scie, 1er art. assez gros, les 2 ou 3 suivants p. petits globuleux; les derniers presque cylindr. ou en scie. 4 antles filif. égales; les antér. à 4 art. presqu'égaux, le dernier terminé en pointe mousse. les poster. à 3 art. égaux. mâchoire div. en 2 pièces. Tarses id. (tête à moitié enfoncée dans le corselet. corselet convexe, en bosse)

Cassida. (140) ant. courtes, presque filif. grossissant insensiblement vers la pointe, très rapprochées à leur base. 4 antles presq. filif. inégales: les antér. à 4 art. dont le dernier est ovale allongé, en pointe: les postér. de 3, le dernier un peu p. gros ovale. Tarses id. (corselet & élytres débordant considérablement le corps)

[illegible] (141) ant. presque monilif. grossissant insensiblement 1ers art. un peu p. petits & un peu p. allongés; les autres égaux entre eux & monilif. 4 antles: les antér. un peu p. longues à 4 art. le dernier p. gros, tronqué, obliquement, presqu'en f. de hache: les postér. de 3. pénultième art. des Tarses des 4 pattes antér. court & garni de houppes. Tarses

postér. presque sétacés. art. assez longs et très distincts (corps allongé, tête penchée).

Scleruca (102) ant. filif. presque de la longueur du corps. 1er art. gros et allongé. 4 ant. fil. inégales. les antér. à 4 art. presqu'égaux, arrondis. le dernier en pointe. les postér. très courtes. à 3, dont le 1er à peine distinct, les 2 autres arrondis (Machoires div. en 2 pièces (Cuisses simples; corselet inégal) (cet art. est déplacé)

4 ? art. à tous les tarses

Coccinella (140) ant. courtes, presqu'en masse. 1er art. un peu allongé, les autres presque globuleux; les 3 derniers plus gros, en masse. 4 ant. inégales; les antér. un peu plus longues, à 3 art. dont le dernier plus gros, en forme de hache. les postér. à 4 art. égaux. corps hémisphér. plat en dessous. corselet et élytres bordés)

...icnus ant. très courtes en masse. les 2 derniers art. gros et ... 4 ant. les antér. un peu plus longues, à 3 art. le dernier dilaté, applati, aigu de chaque côté. les postér. de 2. le dernier presqu'en masse. (corselet et élytres très peu bordés)

...ricula ant. filif. presque sétacées. 1er art. assez allongé, les autres égaux, cylindr. 4 ant. filif. les antér. beaucoup plus longues, à 5 art. dont les 2 1ers assez courts. les postér. de 3, dont le 1er très court. élytres très courtes; abdomen terminé par deux pièces longues, cornées, très fortes)

Classe 7e. (Diptera)

Oestrus (454) ant. courtes, sétacées. 1er art. gros et globuleux. Trompe très courte rétractyle, sétacée, cachée entre 2 espèces de lèvres vésiculeuses. Suçoir à 3 soies membraneuses, petites, courtes, presqu'égales, appliquées sur la trompe)

Tabanus (455) ant. courtes, rapprochées: 3 art. dont le 3e grand dilaté ayant une espèce de dent latérale. les 3 dern. courts, peu apparents, terminés en pointe. Trompe courte bilabiée, cannelée. Suçoir div. en 7 pièces; 4 sup. larges applaties, contenant 3 soies dans la cannelure à la trompe. 2 antennules grandes, contournées, et appuyées sur la trompe.

Nemotelus ant. courtes, rapprochées, 3 art. grenus, moniliforme, le

musca (469) der. terminé en pointe aigue, allongée. Trompe id. suçoir div. en 4 pièces. 1 supér. large, membraneuse, applatie; contenant 3 soies courtes, dans la cannelure de la trompe. 2 antles filif. insérées à la base latér. du suçoir, et appuyées sur la trompe.

Stratiomys (466) ant. cylindr. brisées, un peu pl. longues que la tête 3 art. le 1er et le 3e très longs. le 2e très court. Trompe id. Suçoir libre, form. d'une seule pièce, reçue dans la cannelure de la trompe. 2 antles courtes, en masse, à 3 art. le dr. gros et ovale; insérées à la partie latérale de la trompe (écusson, souvent armé de piquants)

Syrphus ant. courtes, 2 art. le 1er ovale, compr. et le 2e formant

musca (469) une soie très mince. Trompe courte, rétractile, bilabiée cannelée. Suçoir div. en 4 pièces, la supér. pl. longue et pl. large, à 3 soies dans la cannelure de la trompe. 2 antles minces, articulées, de la longueur des soies, insérées à côté du suçoir et appliquées sur la trompe.

Musca, 469) ant. id. Trompe id. Suçoir libre, à 1 seule soie, reçue dans la

cannelure de la trompe. 2 ant.[es] filif. un peu p.[lus] grosses vers la pointe, insérées à la partie latérale un peu supér. de la trompe.

Conops (Sol) ant. courtes rapprochées courbées: 2 art. le 1.er ovale alongé, un peu compr. très.[?] formant un poil très mince & velu. Trompe rétractile, allongée, filif. bilab.: 2 fide, coudée à sa base. Sucoir formé de 2 soies renfermées dans la trompe. 2 ant.[les] courtes filif. insérées à la base super. de la trompe.

Conops ... (4,?) ant. p.[lus] longues que la tête, presqu'en masse, réunies à leur base. d.[er] art. renflé, terminé en pointe. Trompe rétractile, cannelée, 2 labiée. Sucoir de 2 pièces, a super. un peu p.[lus] large & applatie, contenant une dans la cannelure de la trompe. 2 ant.[les] courtes, filif. insérées à la base du sucoir & appliquées sur la trompe.

Myopa ... (1,?) ant. courtes, courbées. 3 art. le 2.e presque conique, le d.er ovale, applati, à 1 poil latéral assez court. Trompe rétractile, longue, filif. brisée, & repliée au milieu. Sucoir formé d'une seule soie renfermée dans la trompe. 2 ant.[les] minces, très courtes, à 3 art. presqu'égaux, insérées à la base later. un peu super. de la trompe (partie anter. de la tête presq. vésiculeuse)

... ... (4,?) ant. courtes, 3 art. grenus, monilif. terminés par un poil allongé. Trompe très courte, 2 labiée, cannelée. Sucoir de 3 soies, reçues dans la cannelure de la trompe. 2 ant.[les] avancées, de la longueur de la trompe, filif. assez grosses & velues.

... (4,?) ant. de la longueur de la tête, rapprochées, presque filif. le d.er art. allongé, terminé en pointe. Trompe filif. cannelée. Sucoir de 4 pièces: la sup. très courte

& assez large; contenant 3 soies dans la cannelure de la trompe. 2 ant[es] courtes très velues; insérées à la base latér. de la trompe.

Empis ant. presque de la longueur de la tête, rapprochées: 1[er] & 2[e] art. grenus, arrondis: le 3[e] terminé en pointe très
asilus (479) allongée. Trompe filif. longue, 2 fides, cannelée. Suçoir de 4 pièces, la supér. assez grosse, de la longueur de la trompe, contenant 3 soies reçues dans sa cannelure, 2 ant[es] courtes, filif. un peu velues, id.

Bombylius ant. courtes, rapprochées, filif. 3 art. dont le 1[er] long; le 2[e]
asilus (479) court; le 3[e] allongé terminé en pointe. Trompe droite allongée, sétacée, cannelée, 2 fide. Suçoir de 4 pièces, la supér. un peu p[s] large, contenant 3 soies dans la cannelure de la trompe. 2 ant[es] courtes filif. insérées id.

Culex ant. sétacées, velues, pectinées ou plumeuses, de la long[r]
(515) du corselet. Trompe longue, sétacée, cannelée, 2 fide. Suçoir de 5 pièces égales, très minces & très déliées, reçues dans la cannelure de la trompe. 2 ant[es] velues, courtes

Tipula ant. sétacées, simples ou velues, ou plumeuses, ou pectinées
(504) beaucoup p[s] longues que la tête. Trompe courte, sétacée, cannelée. Suçoir libre, formé d'une pièce très reçue dans la cannelure. 2 ant[es] filif. beaucoup p[s] longues que la trompe, à plusieurs art. dont les 3, 1[ers] p[s] gros & p[s] distincts

Bibio (514) ant. moniliformes un peu p[s] courtes que la tête; art. courts, applatis perfoliés. Trompe id. Suçoir id. 2 ant[es] id. à 5 art. distincts (tête grosse, arrondie dans le ♂, petite & applatie dans la ♀)

Hippobosca ant. très courtes, sétacées; 2 art. dont le 1[er] très court, & le
(504) 2[e] p[s] long. Trompe très courte, div. en 2. Suçoir formé d'1 seule soie, forte, presque cornée, contenue entre les 2 pièces de la trompe. (point d'ant[es]. corps un peu applati)

Classe 8. Aptères

1°. 6 pattes, 2 antennes

Pulex ... ant. courtes, filif. à peine p[lus] grosses vers le bout; 4 art. presque coniques. 2 yeux. Trompe allongée, conique, recourbée sous la poitrine, articulée, sans ant[enn]es. pattes postér. p[lu]s longues, propres à sauter, abdomen simple.

Pediculus ... ant. filif. de la long. env. du corselet; art. presqu'égaux, distincts. 2 yeux. Trompe courte, droite, inarticulée; sans ant[enn]es. (abd. simple un peu aplati)

Ricinus ... ant. filif. p[lu]s courtes que le corselet; art. id. 2 yeux. (pediculus) (57) bouche munie de mandibules, & d'une trompe courte, droite, inarticulée, sans ant[enn]es (abd. id.)

Lepisma ... ant. sétacées, longues, à beaucoup d'art. égaux, à (25) peine distincts. 2 yeux. bouche munie de mâchoires, & de 4 ant[enn]es inégales, filif. les antér. à 3 art. les posté. à 3. abd. terminé par 3 fil. sétacés)

Podura ... ant. filif. à 4 art. le 1[er] très court, le d[erni]er sétacé. 16 yeux à (52) peine distincts. bouche à mâchoires, & à 4 ant[enn]es presque en Massue: les ant[érieur]es à 4 art. les postér. à 3. queue fourchue, repliée sous le ventre, propre à sauter.

2°. 8 pattes: point d'antennes

Acarus ... 2 ant[enn]es droites, courtes, filif. à 3 art. distincts, insérées (57) à la partie latérale de la bouche. Trompe courte, droite, dure, presque cylindr. 2 yeux (abdomen confondu avec le corselet)

Leptus ... 2 ant[enn]es filif. p[lu]s longues que la tête, courbées, à 4 art. le d[erni]er (...) (57) terminé en pointe aigue, insérées à la partie latérale de la trompe. Trompe avancée, allongée, droite, presque conique, obtuse. 2 yeux (abd. id.)

Phalangium ... 2 ant[enn]es allongées, filif. courbées, à 4 art. le 2[e] & le 4[e] p[lu]s (30) longs que les autres, insérées à la base ext. des mâchoires.

bouche munie de mandibules & de mâchoires, mandib. avancées, dures, composées de 2 pièces, dont la 2e est armée d'une dent mobile, en forme de pince. 2 yeux (abdomen confondu avec le corselet, ou très peu distinct)

Aranea (531) 2 antennes filiformes allongées, à 4 art. doublées en mâle, contenant les sexes, dans les 2 insérées à la base latérale des mâchoires. bouche munie de mandibules et de mâchoires. Mandib. épaisses, rostiformes, de 2 pièces, dont la 2e mince, très forte & très aigue. 8 yeux (abdomen séparé du corselet par un étranglement)

Chelifer 2 antennes très longues, assez grosses, articulées, terminées en pinces, insérées à la base latérale de la tête. (bouche munie de mandibules & de mâchoires. mandib. courtes, presque cylindr. simples. 2 yeux (abdomen simple joint au corselet; point de lames sur le corps)

3° Crustacés

8, 10, ou 14 pattes, ou plus. 2 ou 4 ant.

Monoculus (537) Binoculus (539) ant. simples, sétacées ou branchues. articles nombreux à peine distincts. bouche à mandib. & mâchoires. 4 antennes inégales: les antér. à 4 art. le 1er petit, le 2e assez gros. les postér. de 3, doublés ... en grande taille. ... pattes; (corps terminé par une queue pointue, simple ou fourchue)

Cancer (540) 4 ant. très courtes, presq. égales: les 2 antér. sétacées les 2 postér. filif. 2 yeux pétiolés, mobiles. bouche à mandibules & à 6 antennules inégales. corps ovale, quarré, ... terminé par une queue articulée, ... plissée, appliquée sous le corps. 10 pattes, dont les 2 antér. en forme de pinces.

Astacus Cancer (540) 4 ant. les 2 supér. très longues, & sétacées: les 2 infér. courtes, à 4 art. le dernier double & sétacé. 2 yeux arrondis,

pédonculés, mobiles: bouche à mandib. & à 6 ant[les] [illegible]. corps allongé, terminé par une queue articulée garnie de 5 feuillets: 10 pattes, les 2 postér. souvent en forme de pinces

[illegible] 4 ant. simples, pédonculées: les antér. courtes & subulées [illegible] les postér. p[lus] longues & sétacées. 2 yeux id. bouche id., corps allongé, souvent compr. terminé id. 10 à 16 pattes, terminées par des onglets simples

[illegible] 4 ant. sétacées: les 2 antér. p[lus] rapprochées & p[lus] longues que les postér. art. nombreux. bouche sans mandibules ni mâchoires apparentes. 2 ant[les] courtes filif. le d[er] article étroit: corps à plusieurs anneaux, & terminé par une queue large; p[lus] ou m[oins] longue, & munie de 2 fil. [illegible]. 14 pattes, terminées par un onglet simple, fort & crochu.

[illegible] 2 ant. sétacées, brisées. [illegible] dont le d[er] sétacé, & [illegible] p[lus] ou m[oins] nombreux, très peu distincts. bouche à mandib. à mâchoires & à 2 ant[les] courtes, filif. corps à plusieurs anneaux, & terminé par 2 appendices simples, sétacées. souvent très courtes & à peine visibles. 14 pattes, terminées par un onglet simple.

[illegible] 2 ant. courtes, filif. presqu'en masse, 7 art. le pénultième un peu p[lus] gros. le d[er] petit arrondi à son extrémité [illegible]. à mandibules & mâchoires très petites, & à 2 ant[les] courtes, filif. insérées entre les mandib. & les mâchoires. corps à plusieurs anneaux sans appendices: 2 paires de pattes à chaque anneau; nombre de pattes indéterminé.

[illegible] 2 ant. sétacées, art. nombreux. bouche à mandib. & à 2 ant[les] p[lus] longues: 2 crochets longs, recourbés, très aigus insérés au dessous de la bouche. corps id. 1 paire de pattes à chaque anneau, terminées par un onglet simple.

postér. presque sétacés. ant.

ENTOMOLOGIA PARISIENSIS.

PRIMA SECTIO INSECTORUM.

INSECTA COLEOPTERA.

Caracteres sectionis.

Abdomen elytris duris tectum.
Maxillæ corneæ laterales.

ARTICULUS PRIMUS.

Caract. articuli I.

Elytra integra dura.

ORDO PRIMUS.

Caract. Ordin. I.

Tarsorum articuli quinque.

I. PLATYCERUS. *Le Cerf-volant.*

Antennæ in extremo uno verſu pectinatæ.

FAMILIA I. *Antennis fractis.*

1. P. Cervus.
Le grand Cerf-volant.

Longueur 21 lignes. Largeur 7 lignes.

P. fuſcus, cornubus duobus mobilibus, aſpice bifurco, intus ramo denticuliſque inſtructis.

Locus. Habitat ſilvas & præcipue ilices.

2. P. fœmina cervi.
La grande Biche.

Long. 16 lig. Larg. 6 lig.

P. fuſcus, elytris lævibus, capite lævi.

Loc. Larva carie exeſos fraxinorum truncos habitat.

3. P. parallelipipedus.
La petite Biche.

Long. 9 lig. Larg. 4 lig.

P. niger, elytris lævibus, capitis puncto duplici prominente.

Loc. Habitat arbores carioſas.

4. P. caraboides. *Lu. carab. fabr.* +

La Chèvrette bleue.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

P. violaceo-cœruleus, elytris lævibus.

Varietas A. Platycerus caraboides latior, ſuperne viridis, inferne fuſcus. *La Chevrette verte.*

Loc. Habitat eaſdem arbores.

FAMIL. II. *Antennis integris.*

5. P. ſtriatus. *Trogosita caraboides.*

La Chevrette brune.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

P. fuſcus, capite & thorace punctatis, elytris punctato-ſtriatis.

Loc. Habitat vetuſtas arbores.

6. P. pygmæus.

Le Cerf-volant mignonette.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

P. nigro fuſcus, elytris ſtriatis, pedibus fuſcis, capite brevi, antennis vix apparentibus.

Loc.

II. PTILINUS. *La Panache.*

Antennæ ſecundùm totam longitudinem uno verſu pectinatæ.

1. P. fuſcus.
La Panache brune.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

P. atro-fuſcus, thorace convexo, pedibus antenniſque pallidis.

Loc. Habitat vetuſtas ſalices quas rotundis foraminibus larva terebrat.

2. P. flaveſcens.
La Panache jaune.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

P. niger, ſubvilloſus, thorace plano marginato, elytris flavis mollioribus.

Loc. Habitat flores apertos.

III. SCARABÆUS. *Le Scarabé.*

Antennæ clavatæ, clavâ lamellatâ; ſcutellum inter elytrorum origines.

FAMIL. I. *Antennarum lamellis ſeptem.*

1. S. naſicornis. geotrupes nasic. fabr. +
Le Moine. oryctes nasic. latr. +

Long. 15 lig. Larg. 9 lig.

S. capite unicorni recurvo, thorace gibbo, abdomine hirſuto.

Loc. Habitat humum recentem (*les couches*) & arborum cariem.

2. S. fullo. melolontha fullo oliv.
Le Foulon.

Long. 17 lig. Larg. 7 lig.

S. antennarum lamellis maximis, corpore nigro, ſquammis albis, varie maculato.

Loc. Habitat meridionales Galliæ provincias; in muſæis frequens.

3. S. melolontha. melo. vulgaris oliv. Walk
Le Hanneton.

Long. 1 pouce. Larg. 6 lig.

S. teſtaceus, thorace villoſo, abdominis inciſuris lateralibus albis, caudâ inflexâ.

Loc. Habitat arbores.

FAMIL. II. *Antennarum lamellis tribus.*

4. S. typhæus.

Le Phalangiſte.

Long. 8 lig. Larg. 4 ½ lig.

S. niger, elytris ſtriatis, thorace antrorſum tricorni.

Loc. Habit. bovinas fæces, gallicè *Bouzes de vaches.*

5. S. auratus.

L'Eméraudine.

Long. 9 lig. Larg. 5 lig.

S. viridi-ænæus, thoracis parte pronâ, antice prominente.

Loc. Habitat flores præcipue roſæ & pæoniæ.

6. S. nobilis.

Le Verdet.

Long. 7 lig. Larg. 4 lig.

S. viridis nitens, thorace infra æquali, non prominente.

Loc. Habitat flores umbellatos.

7. S. autumnalis.

Le petit Hanneton d'automne.

Long. 7 lig. Larg. 3 ½ lig.

S. teſtaceus, thorace villoſo, elytris luteo-

pallidis, lineis tribus elevatis pallidioribus.

Varietas A. Scarabæus autumnalis omnino viridis.

Loc. Habitat circa arbores.

8. S. horticola.

Le petit Hanneton à corcelet vert.

Long. 4 lig. Larg. 2 $\frac{2}{3}$ lig.

S. capite thoraceque cœruleo piloſo; elytris rufis.

Loc. Habitat bovinas fæces.

9. S. ſtercorarius.

Le grand Pilulaire, le fouille-merde.

Long. 10 lig. Larg. 5 lig.

S. ater, dorſo glabro, elytris ſulcatis; capitis clypeo rhomboide, centro prominulo.

Loc. Habitat bovinas fæces.

10. S. vernalis.

Le petit Pilulaire.

Long. 7 lig. Larg. 5 lig.

S. cœruleſcens, dorſo elytriſque glabris læviſſimiſque, capitis clypeo rhomboide, centro prominulo.

Loc. Habitat bovinas fæces.

11. S. ſubterraneus.

Le Scarabé perlé.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

S. ater, punctis elevatis, per ſtrias digeſtis.

Loc. Habitat arenam ſterilem; in urbe *Fontainebleau* frequens.

12. S. hæmipterus.

Le Scarabé à tarrière.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

S. ater depreſſus & ſquamoſus, maculis albis variegatus, elytris abdomine brevioribus, fæmina aculeo ani.

Loc. Habitat arbores exeſas & cortices.

13. S. argenteus.

L'Ecailleux violet.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig. $\frac{3}{4}$.

S. violaceus & ſquamoſus, ſquamis ſubtus argenteis.

Loc. Habitat exeſos arborum truncos.

14. S. funerarius.

Le Drap mortuaire.

Long. 5 lig. Larg. 3 lig.

S. nigro-cœrulefcens, maculis albis fparfis, ordine macularum abdominalium longitudinali.

Loc. Habitat umbelliferarum flores.

. S. marginatus. Melolontha varicola oliv. Walk +

Le Scarabé à bordure.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

S. niger, elytris croceis margine nigro.

Loc.

. S. fafciatus. Cetonia fasc. oliv. Trichius fasc. Walk.

La Livrée d'ancre,

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 3 lig.

S. niger hirfutie-flavus, elytris luteis, fafciis tribus nigris interruptis.

Loc. Habitat flores umbellatos.

. S. villofus. Cetonia hirta +

L'Arquelin velu.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

S. villofus albo, nigro flavoque irregulariter variegatus.

Loc.

. S. bicolor. Copris pinetarius oliv. +

Le Scarabé bedeau. Aphodius fim. Walk. +

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

S. capite thoraceque nigro, antennis elytriſque rubris.

Loc. Larva & Scarabæus fæces bovinas habitat.

19. S. fimetarius.

Le Scarabé gris des bouzes.

Long. 1, 2, 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ 1, 1 $\frac{1}{2}$ lig.

S. capite thoraceque nigro glabro, elytris griſeis, pedibus pallidis.

Loc. Abundat in bovinis fæcibus.

20. S. foſſor.

La Tête armée.

Long. 2, 3, 4, 5 lig. Larg. 1, 2, 2 $\frac{1}{2}$ lig.

S. totus niger, ſpinulis tribus capitis tranſverſim poſitis.

Loc. Abundat in bovinis fæcibus.

21. S. gagatinus.

Le Scarabé jayet.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

S. totus niger, capite inermi.

Loc. Habitat bovinas fæces.

22. S. fulveſcens.

Le Scarabé fauve aux yeux noirs.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

S. fulvus, oculis nigris, thorace glabro.

Loc. Habitat arbuſta ſepium.

var. du mel. ruricola juv. latr. +

23. S. atratus. melolontha humeralis fabr. oliv. +

Le Velours noir.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

S. niger hirſutus.

Loc. In horto regio Pariſienſi frequens.

24. S. fumoſus. melolontha variabilis oliv. Hal. +

Le Scarabé couleur de ſuie.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

S. ater, thorace ſubvilloſo, elytris fuſcis ſtriatis.

Loc.

25. S. lamellatus.

Le Scarabé brun chagriné.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

S. atro-fuſcus, ſupra veluti cineraſcens, antennis pedibuſque fuſcis, lamellis antennarum longis, elytris ſtriatis.

Loc.

26. S. aquaticus.

Le Scarabé noir des marais.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

S. piceus.

Loc. Habitat putridas paludum aquas.

27. S. natator.

Le Scarabé nageur.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

S. totus rufo-niger, maculis nigrioribus.

Loc. Habitat rivulos & aquas.

28. S. perla.

La Perle aquatique.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

S. ſubrotundus lucidus, capite thoraceque nigro, elytris pallidis pellucidis.

Loc. Habitat rivulos.

29. S. putridus.

Le petit Scarabé noir ſtrié.

Long. $\frac{3}{4}$ lig. Larg, $\frac{1}{3}$ lig.

S. niger, pedibus rufis, elytris profunde ſtriatis.

Loc. Habitat putridas plantas.

30. S. florilegus.

Le petit Scarabé des fleurs.

Long. $\frac{1}{2}$ lig.

S. nigro-cœruleſcens.

Loc. Habitat flores.

31. S. ſulcatus.

Le Scarabé à côtes.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg, 1 $\frac{2}{3}$ lig.

S. ater, ſupra coſtis elevatis ſtriatis.

Loc.

IV. COPRIS. *Le Bousier.*

Antennæ clavatæ, clavâ lamellatâ. Scutellum inter elytrorum origines nullum.

1. C. lunaris.

Le Bouſier capucin.

Long. 8 lig. Larg. 4 $\frac{2}{3}$ lig.

C. capitis clypeo lunulato, margine elevato, corniculo denticulato.

Loc. Habitat fimetaria & bovinas fæces rar.

2. C. ſerratus.

Le Hottentot.

Long. 7 lig. Larg. 5 lig.

C. niger; capite clypeato, margine ſerrato, thorace lato lævi; elytris ſtriatis.

Loc. Habitat bovinas fæces; rar. in agris lutetianis.

3. C. nuchicornis.

Le petit Bousier noir cornu.

Long. 3 $\frac{1}{2}$, 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2, 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. fusco-niger, capite clypeato angulato, pone cornuto, elytris ferrugineo-nebulosis, brevibus, striatis.

Loc. Habitat bovinas fæces.

4. C. acornis.

Le petit Bousier noir sans cornes.

Long. 2, 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1, 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. fusco-niger, capite clypeato augulato, non cornuto, elytris brevibus, striatis.

Loc. Habitat bovinas fæces.

5. C. conspurcatus.

Le Bousier à deux cornes.

Long. 4 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

C. obscure ænæus, capite pone bicorni, thorace antice prominente, elytris rufis nigro maculatis.

Loc. Habitat bovinas fæces.

6. C. fulvus.

Le Bousier fauve.

Long. 2, 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig.

C. fulvus, capite ænæo, thoracis utrinque cavitate laterali fuſcâ.

Loc. Habitat bovinas fæces.

7. C. hæmorrhoidalis.

Le Bouſier à points rouges.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

C. niger nitidus, thorace antice gibbo duplici, elytro ſingulo maculâ duplici rubrâ.

Loc. Habitat bovinas fæces.

8. C. ſinuatus.

Le Bouſier à couture.

Long. 5 lig. Larg. 4 lig.

C. niger, capite clypeato, elytris margine exteriore ſinuatis.

Loc. Habitat bovinas fæces.

9. C. arachnoides.

Le Bouſier araignée.

Long. 4 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

C. niger, pedibus longis, femorum poſteriorum baſi denticulatâ, elytris poſtice gibbis.

Loc. Idem.

10. C. corniger.

Le Bousier à cornes retroussées.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

C. niger, capite pone bicorni, corniculis tenuibus arcuatis, longitudine thoracis, thorace utrinque sinuato.

Loc. Habitat bovinas fæces.

V. ATTELABUS. *L'ESCARBOT.*

Antennæ clavatæ, clavâ integrâ, in medio fractæ.

Caput intra thoracem.

1. A. unicolor.

L'Escarbot noir.

Long. 1, 3, 4 lig. Larg. 1, 2, 3 lig.

A. totus niger, elytris lævibus nonnihil striatis.

Loc. Habitat identidem fæces bovinas, sæpius glaream-sterilem.

2. A. bimaculatus.

L'Escarbot à taches rouges.

Long. 1, 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1, 1 $\frac{1}{4}$ lig.

A. niger, elytro singulo macula rubra.

Loc. Cum præcedent.

3. A. cupreus.
L'Escarbot bronzé.
Long. 2 lig. Larg. 1 lig.
A. nigro-cupreus, capite nonnihil prominulo.
Loc. Cum præcedent.

I. DERMESTES. *Le Dermeste.*

Antennæ clavatæ perfoliatæ, ultimo articulo solido gibboso.
Elytra non marginata.

1. D. vespillo.
Le Dermeste à point d'Hongrie.
Long. 9 lig. Larg. 4 lig.
D. thorace marginato, elytris abscissis, nigris, fasciis duabus transversis undulatis luteis.
Loc. Habitat cadavera putrida.

2. D. Listerianus.
Le grand Dermeste noir.
Long. 14 lig. Larg. 6 lig.
D. thorace marginato, elytris abscissis, totus niger.
Loc. Cum præcedente, rarior.

3. D. bipunctatus.

Le Dermeſte à 2 points rouges.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

D. niger, coleoptris punctis rubris binis.

Loc. Putrida cadavera habitat.

4. D. pellio.

Le Dermeſte à 2 points blancs.

Long. 2, 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

D. niger, coleoptris punctis albis binis.

Loc. Habitat hortos & domos.

5. D. lardarius.

Le Dermeſte du lard.

Long. 3 lig.

D. niger, elytris antice cinereis.

Loc. Habitat partes animalium putridas, muſæis ubi pelles conſervantur infeſtus.

6. D. pallidus.

Le Dermeſte effacé.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

D. nigro-fuſcus, elytris antice pallidioribus nebuloſis.

Loc. Habitat partes animalium putridas, muſæis ubi pelles conſervantur infeſtus.

7. D. murinus.

Le Dermeſte à écuſſon jaune.

Long. 2, 3 lig. Larg. 1 lig.

D. lævis niger, cinereo-nebuloſus, ſcutello luteo.

Loc. Cadavera & exeſas arbores habitat.

8. D. flaveſcens.

Le Velours jaune.

Long. 2 lig.

D. flaveſcens piloſus, oculis nigris.

Loc. Habitat lignum exeſum.

9. D. oblongus.

Le Dermeſte levrier à ſtries.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

D. oblongus fuſcus, elytris ſtriatis.

Loc. Habitat ligneas ſupellectiles in domis.

10. D. contractus.

Le Dermeſte levrier ponctué & ſtrié.

D. oblongus ferrugineus; elytris punctato-ſtriatis.

Loc. Habitatio præcedentis.

11. D. auriculatus.

Le Dermeſte à oreilles.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

D. tentaculis ante oculos antenniformibus mobilibus.

Loc. Vere novo in aquas natat.

12. D. ſtercoreus.

Le Dermeſte du fumier.

Long. $\frac{1}{2}$ lig.

D. oblongus, glaber, teſtaceus, oculis nigris.

Loc. Fimetaria habitat, identidem in domis reperitur.

13. D. variegatus.

Le Dermeſte panaché.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

D. nigro fuſcoque nebuloſus, elytris vix ſtriatis.

Loc. Habitat cortices carioſos.

14. D. ſtriatus.

Le Dermeſte à côtes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

D. nigro fuſcoque nebuloſus, thorace

elytrisque profundè striatis & punctatis.

Loc. Habitat vetustas arbores.

5. D. aquaticus. *Elophorus aquaticus*

Le Dermeste bronzé.

Long. $1\frac{1}{2}$, $3\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$, $1\frac{3}{4}$ lig.

D. viridi-ænæus, thorace fasciis quatuor elevatis, elytris punctato-striatis.

Loc. Confervas rivorum habitat.

6. D. 4-punctata.

Le Dermeste à 4 points rouges, strié.

Long. $2\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

D. niger, coleoptris punctis rubris quaternis, elytris striatis oblongus.

Loc. Habitat arbores; rarus.

7. D. hortensis. *Sphaeridium scarabaeoides +*

Le Dermeste à 4 points rouges, sans stries.

Long. 3 lig. Larg. $1\frac{1}{4}$ lig.

D. niger, coleoptris punctis rubris quaternis, elytris lævibus subrotundus.

Loc. Habitat arbores in sylvis & hortis.

8. D. gagatinus. *Sphaeri. marginatum +*

Le Dermeste jayet.

Long. $1\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

D. niger ſubrotundus elytris lævibus.

Loc. Habitat flores.

19. D. lugubris.

Le Dermeſte en deuil.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

D. niger ſubrotundus, elytris ſtriatis.

Loc. Habitat plantas aquaticas.

20. D. longicornis.

Le Dermeſte noir à longues antennes.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

D. niger ſubrotundus, elytris lævibus, antennis thorace longioribus.

Loc. Habitat flores.

21. D. fulvipes.

Le Dermeſte noir à pattes fauves.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

D. niger oblongus, elytris punctatis, pedibus fulvis.

Loc. Habitat flores.

22. D. pellucidus.

Le Dermeſte à étuis tranſparens.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

D. elytris corneis pellucidis, thorace obſcuriore.

Loc. Habitat umbelliferarum flores.

. D. ſuturatus.

Le Dermeſte à couture.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

D. totus niger, ſubrotundus, thorace elytriſque profunde ſtriatis & punctatis.

Loc.

. D. triſulcus.

Le Dermeſte à tête noire.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

D. oblongus, fuſcus capite nigro, thorace coſtis tribus elevatis, elytris ſtriatis.

Loc.

. D. faſciatus.

Le Dermeſte à bande noire.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

D. oblongus, niger, pedibus coleoptriſque fulvis, elytrorum faſciâ tranſverſâ nigra.

Loc.

.. D. ſcapularis.

Le Dermeſte à épaulettes.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

D. capite thoraceque rubro, elytris ni-
gris, maculis antice extufque rubris.

Loc.

* 27. D. pygmæus.

Le Dermeſte puce.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

D. ovatus teſtaceus, ſubpiloſus oculi
nigris.

Loc.

* 28. D. thoracicus.

Le Dermeſte puce à corcelet rouge

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

D. ovatus, capite, thorace pedibuſqu
rubicundis, elytris nigris.

Loc.

* 29. D. teſtudinarius.

Le Dermeſte-tortue noire.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

D. niger nitens ovatus, elytris poſtic
lividis.

Loc.

* 30. D. tricolor.

Le Dermeſte-tortue à tache rouge

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

I

D. niger nitens ovatus, elytris poſtice, antice maculâ rubrâ.

Loc.

31. D. teſſelatus.

Le Dermeſte à l'échiquier.

Lon. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

D. niger; maculis fuſcis, plurimis connexis, elytris punctatis.

Loc.

32. D. ſemi-coleopterus.

Le Dermeſte noir à étuis courts.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

D. ater, elytris marginatis brevibus, pedibus fuſcis.

Loc.

33. D. dimidiatus.

Le Dermeſte à demi-étuis.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

D. niger, elytris dimidiatis pone flavis.

Loc.

VII. BIRRHUS. *LA VRILLETTE.*

Antennæ articulis tribus ultimis longiſſimis ſemi-clavatæ.

1. B. domeſticus.

La Vrillette des tables.

Long. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ lig.

B. teſtaceo-niger, thorace ſubhirſuto.

Loc. Ligneas ſuppelectiles foraminibus rotundis terebrar.

2. B. paniceus.

La Vrillette de la farine.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

B. teſtaceus glaber oculis nigris.

Loc. Habitat cerealia.

3. B. mollis.

La Vrillette fauve.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

B. fulvus obſcurus, oculis nigris.

Loc. Habitat pinum.

4. B. pertinax.

La Vrillette ſavoyarde.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

B. totus nigro-fuſcus.

Loc. Habitat ligna tabulata domorum.

5. B. faſciatus.

La Vrillette brune à bandes griſes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

B. fuſcus, faſciis elytrorum tranſverſis cinereis.

Loc.

5. B. cœruleſcens.

La Vrillette bleuâtre.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

B. totus nigro-cœruleus ſubvilloſus.

Loc.

III. ANTHRENUS. *L'Anthrêne.*

Antennæ clavatæ integræ, clavâ ſolidâ compreſſâ.

1. A. ſcrophulariæ. a. pimpinellae +

L'Anthrêne à broderie.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

A. ſquamoſus niger, faſciâ punctiſque coleoptrorum albis, ſuturis fuſcis.

Loc. Habitat flores, multiplex.

. A. florilegus. ou. Verbasci +

L'Amourette.

Long. $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. ſquamoſus niger, elytris fuſcis, faſciâ triplici undulatâ albâ.

Loc. Larva cadavera habitat, alatus flore

IX. CISTELA. *La Cistele.*

Antennæ extrorſum craſſiores nonnihil perfoliatæ.

Thorax conicus non marginatus.

1. C. virideſcens.

La Ciſtele ſatinée.

Long. 4 lig. Larg. 2 $\frac{2}{3}$ lig.

C. ſubvilloſa virideſcens, faſciis longitudinalibus fuſcis interruptis.

Loc. Habitat arenam & gramina.

2. C. atra.

La Ciſtele à bande.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

C. ſubvilloſa atra, faſciâ elytrorum tranſverſâ aurato-fuſcâ.

Loc.

3. C. nitens.

La Ciſtele noire liſſe.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. nigra nitens glabra.

Loc.

. PELTIS. *LE BOUCLIER.*

Antennæ extrorſum craſſiores nonnihil perfoliatæ.

Thorax & elytra marginata.

1. P. atrata.

Le Bouclier noir à trois raies & corcelet liſſe.

Long. 4, 5, 6 lig. Larg. 2, 3, 4 lig.

P. nigra, elytris lineis tribus elevatis, ſpatio interjecto punctato, thorace lævi.

Variet. A. ead. ſpatio interjecto punctato, thorace lævi, utrinque ſulco armato.

B. ead. ſpatio interjecto punctato, thorace lævi, ubique æquali.

C. ead. ſpatio interjecto punctato, thorace lævi, punctis duobus impreſſis.

D. ead. ſpatio interjecto punctis latis inæqualibus, thorace lævi.

Loc. Habitat putrefacta animalium cadavera.

2. P. ſcabra.

Le Bouclier noir à corcelet raboteux.

Long. 5, 6 lig. Larg. 2, 5 lig.

P. nigra, elytris lineis tribus elevatis, ſpatio interjecto minutiſſime punctato, thorace ſcabro.

Loc. Habitat cadavera, rarior.

3. P. gibboſa.

Le Bouclier à boſſes.

Long. 9 lig. Larg. 4 lig.

P. nigra, elytris lineis tribus elevatis; primâ & ſecundâ gibboſitate connexis, thorace lævi.

Loc. Habitat cadavera.

4. P. complicata.

Le Bouclier noir chiffoné à corcelet raboteux.

Long. 5 ½ lig. Larg. 2 lig.

P. nigra, elytris lineis tribus elevatis acutis, ſpatio interjecto veluti complicato, thorace ſcabro.

Loc. Habitat cadavera.

5. P. inæqualis.

Le Bouclier noir chiffonné à corcelet liſſe.

Long. 1 lig. Larg. 2 lig.

P. nigra, elytris lineis tribus elevatis acutis, ſpatio interjecto veluti complicato, thorace lævi.

Loc. Habitat cadavera.

6. P. thoracica. Silpha thor: oliv. +

Le Bouclier à corcelet jaune.

Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

P. nigra, lineis tribus elevatis acutis, thorace ferrugineo.

Loc. Habitat cadavera.

7. P. maculata. S. quadripunctata +

Le Bouclier jaune à taches noires.

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

P. nigra, thorace elytriſque teſtaceis, thoracis maculâ coleoptrorumque punctis quinque nigris.

Loc. Habitat cadavera, rarior.

8. P. excavata. S. lævigata +

La Goutiere.

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

P. nigra tota, elytris lævibus, punctis minimis excavatis.

Loc. Habitat ligna humida.

9. P. teſtacea. S. pedemontana

Le Bouclier fauve.

Long. 2 ½ lig. Larg. 1 ¼ lig.

P. tota teſtacea.

Loc.

10. P. villoſa. Catops morio Fabr. + Choleva morio Latr. +

Le Bouclier brun velouté.

Long. 1 ½ lig. Larg. ½ lig.

P. nigro-fuſca ſubvilloſa.

Loc. Habitat arenam.

XI. CUCUJUS. *LE RICHARD.*

Antennæ ſerratæ breves. Buprestis

Thorax ſubtus nudus.

Caput dimidium intra thoracem craſſum.

1. C. chryſoſtygma. Bup. Chr. +

Le Richard à foſſettes.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

C. aureus, elytrorum foſſulis quatuor impreſſis nitentibus.

Loc. Habitat excelſas arbores ; frequenter in inſula luteciana *Louvier* dicta reperitur, ad quam cum ligno advehitur, ex ſylvis.

2. C. 8-guttatus. Bup. biguttata +

Le Richard à points blancs.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. viridi-ænæus, punctis quatuor impreſſis albis.

Loc. Idem.

3. C. ruſticus. Bup. rustica +

Le Richard doré à ſtries.

Long. 7 lig. Larg. 1 lig.

C. viridi-auratus, oblongus, thorace punctato, elytris ſtriatis.

Loc. Habitat arbuſta ſepium.

4. C. rubinus. Bup. manca +

Le Richard rubis.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. æneus, elytris fuſcis, thorace rubro faſciis fuſcis.

Loc. Habitat roſas.

5. C. viridis. Bu. vir. +

Le Richard vert allongé.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. viridi-cupreus, lævi oblongus.

Loc. Habitat arbores ſepium.

6. C. minutus. Bup. minuta +

Le Richard triangulaire ondé.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. fuſco-cupreus, triangularis, faſciis un-dulatis villoſo albidis.

Loc. Idem.

* 7. C. ater.

Le Richard noir allongé.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. niger oblongus, punctatus, elytr ſtriatis.

Loc.

* 8. C. dentatus.

Le Richard noir chagriné.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. niger thorace punctato, poſtice den-tato, elytris ſulcatis.

Loc. Habitat inſulas Sequanæ propè locum di-tum *le Gros Caillou.*

XII. ELATER. *Le Taupin.*

Antennæ ſerratæ vel filiformes intra capitis cavitatem ſubtus receptæ.

Thorax ſubtus aculeo intra cavitatem abdominis recepto.

1. E. ruber. E. ſanguineus +

Le Taupin rouge.

Long. 8 lig, Larg. 3 lig.

E. thorace elytriſque rubris.

Loc. Habitat cariofas ſalices.

2. E. ſanguineus. L... +

Le Taupin à étuis rouges.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

E. niger, elytris rubris.

Loc. Habitat cortices arborum,

3. E. flaveſcens.

Le Taupin à étuis jaunes & corcelet liſſe.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

E. niger, elytris flavis.

Varietas A. niger, elytris omnino flavis.

B. niger, elytris flavis apice nigris.

C. niger, elytris teſtaceo-fuſcis.

Loc. Habitat vetuſtas arbores.

4. E. caſtaneus. *Lin.* +

Le Taupin à corcelet velouté.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

E. thorace villoſo, elytris teſtaceis apice nigris.

Varietas A. thorace villoſo, elytris flaveſcentibus apice nigris.

B. thorace villoſo, elytris rubeſcentibus apice nigris.

Loc. Idem.

5. E. ruficollis. *L. thoracicus* +

Le Taupin noir à corcelet rouge.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

E. niger, thorace rubro.

Loc.

6. E. cruciatus. *Lin.* +

Le Taupin porte-croix.

Larg. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

E. thorace nigro, circulo rubro, elytris fulvis, cruce-nigra.

Loc.

7. E. pectinicornis.

Le Taupin brun cuivreux.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

E. fuſco-viridi-æneus.

Loc. Habitat gramina.

8. E. niger.

Le Taupin brun nébuleux.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

E. nigro-fuſcus, cinereo-nebuloſus.

Loc. Habitat meſſes.

9. E. teſſellatus.

Le Taupin à plaques velues.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

E. niger, villoſo undulatus.

Loc. Habitat agros.

10. E. murinus.

Le Taupin gris de ſouris.

Long. 4, 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

E. niger, elytris villoſo-murinis.

Loc.

11. E. balteatus. *l. marginatus*

Le Taupin bedeau.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

E. niger, elytris fuſcis, ſingulo faſciâ longitudinali fulvâ.

Loc. Habitat arva.

12. E. obſcurus.

Le Taupin noir à étuis bruns.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

E. niger, elytris fuſcis.

Loc. Idem.

13. E. ater. *l. niger*

Le Taupin en deuil.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

E. totus niger nitidus.

Loc. Idem.

14. E. rufipes. *bon +*

Le Taupin noir à pattes fauves.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

E. niger pedibus rufis.

Loc. Habitat cortices.

15. E. bimaculatus. *l. bipustulatus +*

Le Taupin noir à taches rouges.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

E. niger, elytrorum baſi maculis rubris.
Loc. Habitat cortices.

16. E. clavicornis.
Le Taupin à antennes en maſſe.
Long. 1 lig. Larg. ½ lig.
E. fuſcus, antennis ſerrato-clavatis.
Loc. Habitat ſylvas.

17. E. rachifer.
Le Taupin à bandes.
Long. 1 ½ lig. Larg. ½ lig.
E. niger, elytris fulvis, rachi nigra.
Loc.

18. E. melanophtalmos.
Le Taupin fauve aux yeux noirs.
Long. 3 ½ lig. Larg. 1 lig.
E. fuſcus, oculis nigris.
Loc.

19. E. fuſcus.
Le Taupin brunet.
Long. 4 lig. Larg. 1 ½ lig.
E. totus fuſcus, thorace punctato, elytris ſtriatis.
Loc.

* 20. E. villoſus.

Le Taupin brun velouté.

Long. 9 lig. Larg. 2 lig.

E. fulvus vellere, levi faſciatim conſperſus.

Loc.

XIII. BUPRESTIS. *Le Bupreste.*

Carabus fabr.

Antennæ filiformes.

Trochanter magnus ſeu appendix ad baſim femorum poſteriorum.

FAMIL. I. *thorace cordato capite latiore elytris anguſtiore.*

1. B. coriaceus. Carabus cor. fabr. +

Le Bupreſte noir chagriné.

Long. 14 lig. Larg. 6 lig.

B. ater, elytris rugoſis.

Loc. Habitat humida hortorum loca.

2. B. nitens. Car. auratus +

Le Bupreſte doré & ſillonė à larges bandes.

Long. 11 lig. Larg. 4 lig.

B. viridis, elytris obtuſe ſulcatis, non

punctatis, pedibus antennisque ferrugineis.

Loc. Habitat frequentissimè hortos & agros.

. B. granulatus. Carabus gran. +

Le Bupreste galonné.

Long. 11 lig. Larg. 5 lig.

B. niger, elytris æneis convexe punctatis striatisque.

Varietas A. totus violaceus, elytris convexe punctatis striatisque.

Loc. Idem. rarior.

. B. purpurascens. Carabus purp. +

Le Bupreste azuré.

Long. lig. Larg. lig.

. B. totus nigro-violaceus, elytris dense striatis.

Varietas A. Elytro singulo striis XVI, oris aureo-cupreis.

B. Elytro singulo striis XVI, tribus interruptis.

C. Elytro singulo striis XXII, tribus interruptis.

Loc. Habitat hortos humidos.

5. B. sycophanta.

Le Bupreste quarré couleur d'or

Long. 7 lig. Larg. 3 lig.

B. nigro-violescens, elytris latis æneis è viridi purpureis, singulo striis sexdecim

Loc. Habitat ilicem, ubi papilionum larvas devorat.

6. B. antiquus.

Le Bupreste quarré couleur de bronze antique.

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

B. totus è fusco-viridi cupreus, elytris latis, singulo striis sexdecim.

Loc. Idem.

7. B. leucophtalmos.

Le Bupreste tout noir.

Long. 8 lig. Larg. 3 $\frac{3}{4}$ lig.

B. ater, elytro singulo striis octo lævibus, pedibus nigris.

Loc. Idem.

* 8. B. longicornis.

Le Bupreste luisant.

Long. 10 lig. Larg. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

B. ater, elytro singulo striis octo læv

bus vix impreſſis pedibus nigris, antennis fuſcis, thorace duplo longioribus.

Loc. Idem.

9. B. rufipes.

Le Bupreſte noir à pattes rougeâtres.

Long. 4, 5 lig. Larg. 2 lig.

B. niger, elytro ſingulo ſtriis octo punctatis, pedibus ferrugineis.

Loc. Idem.

10. B. flavipes.

Le Bupreſte noir à pattes jaunes.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

B. niger, elytro ſingulo ſtriis octo lævibus, pedibus lividis.

Loc. Idem.

11. B. vinearum.

Le Bupreſte à ſix points enfoncés.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

B. nigro-viridis, elytro ſingulo ſtriis octo punctis tribus impreſſis.

Loc. Habitat vites.

12. B. agrorum.

Le Bupreſte vert pointillé à huit ſtries & pattes fauves.

Long. 4 lig. Larg. 1 ½ lig.

B. viridis punctatus, elytro ſingulo ſtriis octo, pedibus pallidis.

Loc. Habitat agros.

13. B. lucorum.

Le Bupreſte vert liſſe, à huit ſtries & pattes fauves.

B. viridis nitens; elytro ſingulo ſtriis octo, pedibus pallidis, punctis tribus impreſſis.

Loc. Habitat ſylvas aridas.

14. B. bicolor.

Le Bupreſte à étuis verts & bruns.

Long. 3 lig. Larg. 1 ½ lig.

B. viridis, elytro ſingulo ſtriis octo, pedibus elytrorumque anticâ parte & margine fulvis.

Loc. Habitat arenam.

5. B. 6-punctatus.

Le Bupreſte à étuis cuivreux.

Long. 4 lig. Larg. 1 ½ lig.

B. nitens, capite thoraceque viridi, elytris cupreis punctulis duodecim.

Loc. Habitat arenam, propè rivulos.

6. B. thoracicus.

Le Bupreſte à corcelet cuivreux.

Long. .

B. nitens, capite elytriſque viridibus, thorace cupreo, punctis duodecim.

Loc. Idem.

7. B. cyano-cephalus.

Le Bupreſte bleu à corcelet rouge.

Long. 3 lig. Larg. ½ lig.

B. capite elytriſque cæruleis, thorace rubro.

Loc. Idem.

8. B. equeſtris.

Le Chevalier noir.

Long. 3 lig. Larg. 1 ¼ lig.

B. niger, thorace atro, elytris rubris cruce nigrâ.

Loc. In loco dicto *Fontainebleau* frequens.

19. B. crux major.
Le Chevalier rouge.
Long. 3 lig. Larg. $1\frac{1}{2}$ lig.
B. niger, thorace pedibuſque rubris elytris rubris, cruce nigra.
Loc.

20. B. crepitans.
Le Bupreſte à tête, corcelet & pattes rouges & étuis bleus.
Long.
B. capite, thorace, pedibuſque rubris, elytris cæruleo-nigris.
Loc. Habitat humum umbroſum, ſub lapidibus.

21. B. uſtulatus.
Le Bupreſte quadrille à corcelet rond & étuis ſtriés.
Long. $1\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{2}$, 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$, 1 lig.
B. niger, thorace ovato, nigro, elytris ſtriatis maculis quatuor lividis.
Loc. Habitat rivorum ripas.

22. B. 4-maculatus.
Le Bupreſte quadrille à corcelet plat & étuis liſſes.
Long. idem. Larg. idem.

B. niger, thorace plano ferrugineo, elytris lævibus, maculis quatuor lividis.

Loc. Idem.

B. crucifer.

Le Bupreſte quadrille à corcelet plat, brun & étuis ſtriés.

Long. idem. Larg. idem.

B. niger, thorace plano ferrugineo, elytris ſtriatis, maculis quatuor lividis.

Loc. Idem.

B. quadrifer. car. ustulatus

Le Bupreſte quadrille à corcelet plat & noir & étuis ſtriés.

B. niger, thorace plano nigro, elytris ſtriatis, maculis quatuor lividis.

Loc. Idem.

B. octo-maculatus. {bembidion varium latr. / Car. ~~[illegible]~~ ustulatus? fabr.}

Le Bupreſte noir à huit taches fauves.

Long. 1 lig. Larg. ½ lig.

B. niger, elytris ſtriatis, maculis octo lividis.

Loc. Habitat arenam.

26. B. fulvus. Car. atricapillus +
lebia atricap. lat. +

Le Bupreſte fauve à tête noire.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

B. teſtaceus, capite nigro.

Loc. Idem.

27. B. minutus. car. bipunctatus

Le Bupreſte noir ſans ſtries.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

B. totus niger, lævis.

Loc. Habitat arenam.

FAMIL. II. *Thorace capite elytriſque anguſtiore.*

28. B. campeſtris. Cicindela camp. +

Le Velours vert à 12 points blancs.

Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

B. inauratus, ſupra viridis, coleoptris punctis duodecim albis.

Loc. Habitat loca ſicca, arenam.

* 29. B. epiſcopalis. Carabus caerulescens

Le Bupreſte épiſcopal.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

B.

B. totus violaceus, pedibus antenniſque fuſcis.

Loc. Idem.

10. B. faſciatus. *Cicindela hybrida* +

Le Bupreſte à broderie blanche.

Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

B. inauratus, ſupra fuſco-viridis, coleoptris faſciis ſex undulatis albis.

Loc. Idem.

11. B. ſuturatus.

Le Bupreſte à bandes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

B. niger; elytris ſtriatis, coleoptrorum anticâ parte ſuturâque lividis.

Loc.

12. B. germanicus. *Cicindela Germanica* +

Le Bupreſte vert à 6 points blancs.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

B. inauratus, ſupra fuſco-viridis, coleoptris punctis ſex albis.

Loc. Habitat arenam, prope rivulos.

13. B. marginatus.

Le Bupreſte bordé.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

B. fulvus, oculis nigris; elytris nigris, poſtice fulvis.

Loc.

34. B. riparius. Elaphrus rip. +

Le Bupreſte à mamelons.

Long. 2 $\frac{1}{2}$, 3 lig. Larg. 1 lig.

B. viridi-æneus, elytris punctis latis excavatis mammilloſis.

Loc. Habitat arenam humidam.

* 35. B. ſcapularis. Car. Scap.

Le Bupreſte taché à corcele rouge.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

B. teſtaceus, capite nigro: elytris ſtriatis nigris utrinque maculâ antice fulvâ.

Loc.

36. B. aquaticus. Elaphrus aquaticus +

Le Bupreſte à tête cannelée.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

B. fuſco-æneus, capite profunde ſtriato, elytrorum ſtriâ primâ remotiſſimâ.

Loc. Habitat arenam humidam.

37. B. contractus.

Le Bupreſte levrier.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

B. niger, elytris fulvis ſtriatis, femoribus latis, pedibus valde ſpinoſis.

Loc.

8. B. impreſſus. (Elaphrus (flavipes)) +

Le Bupreſte à 4 points enfoncés.

Long. 1 $\frac{1}{2}$, 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$, 1 lig.

B. cupreo viridique variegatus, punctis quatuor impreſſis, pedibuſque pallidis.

Loc. Habitat arenam prope rivulos.

9. B. lunulatus.

Le Bupreſte à lunules.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg.

B. niger, elytris ſtriato punctatis; poſtice maculis duabus, & apice flavis.

Loc.

0. B. ſtagnorum. Elaphrus littoralis +

Le Bupreſte bronzé à 2 points enfoncés.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

B. fuſco-æneus elytris ſtriatis, punctis duobus impreſſis.

Loc. Habitat arenam humidam, rarior.

* 41. B. foveatus.

Le Bupreste strié à 4 points enfoncés.

Long. 1 $\frac{1}{1}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

B. totus niger, elytris striatis, punctis quatuor impressis.

Loc.

FAM. III. *Thorace capite latiore, elytrorum latitudine.*

harpalus piger latr.+ , Car. gibbus +

42. B. piger. Carabus madidus ?

harp. tardus latr.

Le Bupreste paresseux.

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

B. ater, thorace lato, elytrorum striis punctatis.

Loc. Habitat siccam arenam.

* 43. B. capitatus.

Le Bupreste brun à tête noire.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

B. totus fuscus, capite nigro.

Loc.

harp. aeneus +

Car. aeneus +

44. B. viridulus. Car. viri.?

Le Bupreste verdet. car. azureus oliv.

Long. 4 lig. Larg. 3 lig.

B. totus viridis, thorace lato.

Loc.

5. B. maxillosus.

Le Quadrille à mâchoires brunes.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

B. niger maxillis thoraceque ferrugineis : elytris striatis, maculis quatuor luteis.

Loc.

6. B. vulgaris. Car. vulgaris ? harpalus communis latr +

Le Bupreste rosette.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

B. infra niger, supra nigro-æneus, thorace lato.

Loc. Habitat arenam.

7. B. plateosus. Car. lunatus + harp. lunatus latr. +

Le Bupreste à plaques.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

B. capite cœruleo-nitido, thorace fulvo; elytris luteis striatis maculis sex atris.

Loc.

8. B. luctuosus. Car. latus ? an Car. frigidus? an bimitatus?

Le Bupreste en deuil.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

B. totus niger, thorace lato lævi, elytrorum ſtriis lævibus.

Loc. Habitat humum ſub lapidibus.

* 49. B. fumoſus.

Le Bupreſte noir à pattes brunes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

B. totus niger, elytris ſtriatis, pedibus fuſcis.

Loc.

Larg. rufic. latr. +
Carabus ruficornis +

50. B. ſericeus. Car. agrestis ?

Le Bupreſte noir velouté.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

B. ater ſubvilloſus, antennis pedibuſque ferrugineis.

Loc. Habitat agros.

51. B. æruginoſus.

Le Bupreſte cuivreux à pattes brunes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

B. totus nigro-auratus, elytris ſtriatis, pedibus fuſcis.

Loc.

2. B. leporinus.

Le Bupreſte noir à pattes brunes.

B. ater, lævis, pedibus antennarumque baſi ferrugineis.

Loc.

3. B. connexus.

Le Bupreſte à ſuture.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

B. niger, pedibus fulvis : elytris fulvis ſuturâ margineque poſtico nigris.

Loc.

4. B. pſittaceus.

Le Bupreſte perroquet.

Long. 5, 3 lig. Larg. 2, 1 lig.

B. totus viridi cupreus, antennis nigris.

Loc. Habitat agros & hortos, frequentiſſimus.

5. B. variegatus.

Le Bupreſte vert à bordure.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

B. viridis, pedibus elytrorumque margine exteriore pallide teſtaceis.

Loc. Habitat agros.

56. B. melanocephalus.

Le Bupreste noir à corcelet rouge.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

B. niger, thorace, antennis pedibusque ferrugineis.

Loc. Habitat agros.

57. B. rubescens.

Le Bupreste fauve.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

B. ferrugineo-lividus, elytris punctato-striatis.

Loc.

* 58. B. rosaceus.

Le Bupreste rouget.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

B. niger lævis, thorace antennis pedibusque rubris.

Loc.

* 59. B. rusticus.

Le Bupreste brunet.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

B. niger punctatus, thorace capite antennis pedibusque fuscis.

Loc.

10. B. humeralis. car. hum.

Le Bupreste à nœud d'épaule.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

B. niger striatus, pedibus pallidis, elytrorum basi maculâ flavâ.

Loc.

XIV. BRUCHUS. *LA BRUCHE.*

Antennæ filiformes. ptinus oliv. fabr.

Thorax subrotundus gibbus.

Corpus sphæroidæum, dorso convexo.

1. B. fur. ptinus fur. +

La Bruche à 2 bandes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

B. testaceus, elytrorum fasciâ duplici albidâ.

Loc. Habitat herbaria, plantas siccas devorat.

2. B. apterus. gibbium scotias latr. +

La Bruche sans ailes. ptinus scotias latr.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

B. totus testaceus, elytris coadunatis.

Loc. Habitat plantas siccas.

* 3. B. cruciatus.

La Bruche à croix de S. André.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

B. fuſcus ſubvilloſus, ſcutello albo, elytris cruce divaricatâ albidâ.

Loc.

XV. LAMPYRIS. *Le Ver-luisant.*

Antennæ filiformes.

Caput clypeo thoracis marginato tectum.

Abdominis latera plicato-papilloſa.

1. L. nocticula. lamp. splendidula

Le Ver-luiſant à femelle ſans aîles.

Le mâle. Long. 3 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

La femelle. Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

L. fæminâ apterâ.

Loc. Fæmina abdomine nudo campos habitat, mas in hortis volitat per noctem.

2. L. hemiptera. bon +

Le Ver-luiſant à demi-fourreaux.

Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

L. hemiptera.

Loc. Idem.

3. L. ſanguinea.

Le Ver-luiſant rouge.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

L. elytris rubris, thorace rubro, nigrâ maculâ.

Loc. Idem.

XVI. CICINDELA. *La Cicindele.*

Antennæ fili formes.
Thorax planus, marginatus.
Caput deteƈtum.
Elytra flexilia.

1. C. fuſca.

La Cicindele noire à corcelet maculé.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. elytris nigricantibus thorace rubro, nigrâ maculâ.

Loc. Habitat flores.

2. C. livida.

La Cicindele à corcelet rouge.

Long. 5, 6 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. thorace rubro immaculato, genubus poſticis nigris.

Varietas A. elytris teſtaceis, thorace rubro immaculato, genubus poſticis nigris.

B. elytris nigricantibus, thorace rubro immaculato, genubus poſticis nigris.

Loc. Habitat flores.

3. C. nigra.

La petite Cicindele noire.

Long. $2\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. elytris nigricantibus, thorace rubro immaculato, genubus omnibus rubris.

Loc. Idem.

4. C. pallida.

La petite Cicindele pâle.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. elytris teſtaceis, thorace rubro immaculato, genubus omnibus rubris.

Loc Idem.

5. C. maculata.

La Cicindele à etuis tachés de noir.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. rubra, elytris teſtaceis, apice nigris.
Loc. Habitat flores.

cant. testacea fabr +

6. C. luteſcens. telephorus testaceus +
La Cicindele noire à étuis jaunes.

Long. 2, 2 ½ lig. Larg. ⅔ lig.

C. nigra, elytris pedibuſque pallidis.

Varietas A. nigra, thorace omnino nigro, elytris pedibuſque pallidis.

Cant. pallida fabr. Tel. pallidus oliv.

B. nigra, thoracis margine flavo, elytris pedibuſque pallidis.

Cant. testacea fabr. Tel. testaceus oliv.

Loc. Idem.

7. C. ænea. malachius aeneus oliv. fabr. +
La Cicindele bedeau.

Long. 3 lig. Larg. 1 ½ lig.

C. viridi-ænea, elytris extrorſum rubris.
Loc. Idem.

8. C. bipuſtulata. malachius bipustulatus oliv + fabr +
La Cicindele verte à points rouges.

Long. 3 lig. Larg. 1 ½ lig.

C. æneo-viridis, elytris apice rubris.
Loc. Habitat flores.

9. C. elegans. *malachius ele. +*

La Cicindele verte à points jaunes.

C. æneo-viridis, elytris apice flavis.

Varietas A. tota æneo-viridis, elytris apice flavis.

B. cœruleo-viridis, thoracis margine rubro, elytris apice flavis. *an mal. marginellus ?*

Loc. Habitat flores.

10. C. minima. *malachius pulicarius +*

La Cicindele noire à points jaunes & corcelet rouge.

Long. 1 ½ lig. Larg. ½ lig.

C. fuſca, elytris apice flavis, thorace rubro nigrâ maculâ.

Loc. Idem.

11. C. biguttata. *malachius pedicularius +*

La Cicindele noire à points jaunes & corcelet noir.

C. fuſca, elytris apice flavis, thorace fuſco.

Loc. Idem.

2. C. faſciata.

La Cicindele à bandes rouges.

C. elytris nigris, faſciis duabus rubris.

Loc. Habitat flores.

3. C. thoracica.

La Cicindele verte à corcelet rouge.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

C. viridis, thorace rubro immaculato.

Loc. Idem.

4. C. viridi-cœrulea.

La Cicindele verdâtre.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. viridi-cœrulea.

Varietas A. viridis.
B. cœrulea.
C. viridi-cœrulea.

Loc. Idem.

5. C. plumbea.

La Cicindele plombée.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. plumbeo-nigra.

Loc. Idem.

16. C. cinerea.

La Cicindele cendrée.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. villoſo-cinerea.

Loc. Habitat flores.

17. C. rotundata.

La Cicindele bronzée.

Long. 1 lig.

C. plumbeo-cuprea, tibiis pallidis, abdomine ſubrotundo.

Loc. Idem.

XVII. OMALISUS. *L'OMALISE.*

Antennæ filiformes.

Thorax planus tetragonus, angulis poſterioribus in ſpinam productis.

1. O. fontis bellaquæi. o. suturalis +

L'Omaliſe.

Long. 2 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. 1 lig.

Loc. Habitat fontem bellaquæum.

VIII. HYDROPHILUS. *L'HYDROPHILE.*

Antennæ clavatæ perfoliatæ antennulis breviores.

Pedes natatorii.

1. H. picæus. l.. +
Le grand Hydrophile.
Long. 17 lig. Larg. 9 lig.
H. niger, elytris ſulcatis, antennis fuſcis.
Loc. Habitat rivulos & ſtagna.

2. H. caraboides. b.. +
L'Hydrophile noir picoté.
Long. 7 lig. Larg. 3 lig.
H. niger, elytrorum punctis per ſtrias digeſtis, antennis nigris.
Loc. Habitat aquas.

3. H. punctatus. h. orbicularis fabr. +
L'Hydrophile liſſe à points.
Long. 2 lig. Larg. 1 lig.
H. niger, elytris lævibus denſe punctatis.
Loc. Idem.

4. H. fuſcipes.
L'Hydrophile noir ſtrié.
Long. 3 ½ lig. Larg. 1 ⅔ lig.
H. niger, elytris ſtriatis, pedibus fuſcis.
Loc. Habitat aquas.

5. H. fulvus.
L'Hydrophile fauve.
Long. 2 lig. Larg. 1 lig.
H. fulvus.
Loc. Idem.

XIX. DYTICUS. *LE DITIQUE.*

Antennæ filiformes, capite longiores.
Pedes natatorii.

1. D. ſtagnalis.
Le Ditique brun à bordure.
Long. 8 lig. Larg. 4 lig.
D. fuſcus, margine coleoptrorum thoraciſque flavo.
Loc. Habitat ſtagnantes aquas.

2. D. marginalis.
Le Ditique noir à bordure.
Long. 1 pouce. Larg. 6 lig.
D. niger, margine coleoptrorum thoraciſque flavo.
Loc. Habitat ſtagna.

3. D. ſemiſtriatus.

Le Ditique demi-ſilloné.

Long. 14 lig. Larg. 7 lig.

D. elytris ſtriis viginti dimidiatis.

Loc. Habitat aquas.

4. D. cinereus.

Le Ditique à corcelet à bandes.

Long. 7 lig. Larg. 4 lig.

D. cinereus, margine coleoptrorum flavo, thoracis medietate flavâ.

Loc. Habitat ſtagna.

5. D. ſulcatus.

Le Ditique ſillonné.

Long. 6 lig. Larg. 4 lig.

D. elytris ſulcis decem longitudinalibus, thoracis medietate flavâ.

Loc. Idem.

6. D. luctuoſus.

Le Ditique en deuil.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

D. totus niger lævis.

Loc. Idem.

7. D. teſſelatus.

Le Ditique fauve à taches noires.

Long. 3 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

D. fulvus, maculis ſparſis nigris.

Loc. Habitat aquam.

8. D. variegatus.

Le Ditique à bordure panachée.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

D. fuſcus, elytris antice & externe flavis.

Loc. Idem.

9. D. lividus.

Le Ditique noir à étuis bruns.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

D. ater, elytris fuſcis.

Loc. Idem.

10. D. ovatus.

Le Ditique ſphérique.

Long. 2 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

D. ovatus fuſcus, capite thoraceque rubicundis.

Loc. Idem.

11. D. melanophtalmos.

Le Ditique aux yeux noirs.

Long. $1 \frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

D. flavo-fuſcus, oculis nigris, elytris lævibus.

Lo. Habitat aquas ſtagnantes.

2. D. thoracicus.

Le Ditique ſtrié à corcelet jaune.

Long. 1 lig. Larg. ½ lig.

D. cinereus, capitre nigro, thorace luteo, elytris nigro-maculatis punctato-ſtriatis.

Loc. Habitat ſtagna.

3. D. quadratus. D. granularis

Le Ditique panaché ſans ſtries.

Long. 2 lig. Larg. 1 ¼ lig.

D. niger, thorace flavo, elytris lævibus, maculis limboque luteis.

Loc. Idem.

4. D. monoſtriatus. D. unistriatus

Le Ditique à une ſeule ſtrie.

Long. 1 lig. Larg. ⅓ lig.

D. niger, elytris maculis & limbo luteis, ſtriâ unicâ.

Loc. Idem.

15. D. clavi-cornis. D. crassicornis +

Le Ditique à groſſes antennes.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

D. fuſcus, capite thoraceque fulvo, antennis ſubclavatis, ſcutello nullo.

Loc. Habitat aquas ſtagnantes.

* 16. D. hebraicus.

Le Ditique hébraique.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

D. niger, capite thoraceque antice flavis, elytris lævibus, maculis aliquot luteis, nonnullis connexis.

Loc. Habitat ſtagna.

* 17. D. punctatus.

Le Ditique picoté.

Long. 5 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

D. thorace flavo maculâ nigrâ, elytris fuſcis punctis nigris confertis.

Loc. Habitat aquas.

* 18. D. marmoratus.

Le Ditique marbré.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

D. fusco-pallidus, elytris externe maculis obliquis lineisque albidis.
Loc. Habitat rivulos & stagna.

X. GYRINUS. *Le Tourniquet.*

Antennæ rigidæ, capite breviores.
Pedes natatorii.
Oculi quatuor.

1. C. natator. bon bronzé brillant; élytres à stries ponctuées; pattes fauves
Le Tourniquet.
Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.
Loc. Habitat aquarum superficiem quam per orbes concentricos vivacissime peragrat.

ORDO SECUNDUS.

Caract. Ordinis II.

Tarsorum articuli quatuor.

XI. MELOLONTHA. *La Melolonte.*

Antennæ serratæ ante oculos positæ.

1. M. quadri-punctata. elythra 4 punctata
La Melolonte quadrille à corcelet noir.
Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

M. coleoptris rubris, maculis quatuor nigris, thorace nigro.

Loc. Habitat pruni ſylveſtris folia.

2. M. rubra.

La Melolonte quadrille à corcelet rouge.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

M. coleoptris rubris, maculis quatuor nigris, thorace rubro nigrâ maculâ.

Loc. Habitat prunum ſylveſtrem.

3. M. pallida.

La Melolonte liſette.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

M. nigro-viridis, elytris luteo-pallidis.

Loc. Habitat ſylvas.

4. M. cœrulea.

La Melolonte bleuette.

Long. 1 ½ lig. Larg. ¾ lig.

M. cœrulea, thorace pedibuſque ferrugineis.

Loc. Idem.

5. M. muſcoides.

La Melolonte mouche.

Long. 1 ¾ lig. Larg. 1 lig.

M.

M. viridi-cœruleo, thorace rubro cœruleâ maculâ, tibiis ferrugineis.

Loc. Habitat sylvas.

5. M. cuprea.

La Mélolonte cuivreuse.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

M. oblonga nigro-cuprea, subvillosa elytris punctatis.

Loc. Idem.

XII. PRIONUS. *Le Prione.*

Antennæ serratæ in oculo positæ.

1. P. coriarius. *Lou*

Le Prione.

Long. 15 lig. Larg. 9 lig.

Loc. Habitat sylvas, larva arborum truncos.

XIII. CERAMBYX. *Le Capricorne.*

Antennæ à basi ad apicem decrescentes, in oculo positæ.

Thorax aculeatus.

1. C. cerdo. *C. heros fabr.*

Le grand Capricorne noir.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ pouce. Larg. 6 lig.

C. fusco-niger, elytris rugosis, apice

interiore ſpinoſis, antennis corpore longioribus.

Loc. Larva truncos arborum habitat; cerambix ſylvas.

2. C. piceus.

Le petit Capricorne noir.

Long. 9 lig. Larg. 3 ½ lig.

C. ater, elytris rugoſis integris, antennis corpore longioribus.

Loc. Idem.

3. C. textor.

Le Capricorne noir chagriné.

Long. 1 pouce. Larg. 5 lig.

C. ater, elytris punctis elevatis, antennis corpore brevioribus.

Loc. Idem.

4. C. alpinus.

La Roſalie.

Long. 15 lig. Larg. 4 lig.

C. cinereo-cœruleſcens, elytrorum maculis ſex fuſcis.

Loc. Habitat exeſos arborum truncos.

5. C. moſchatus.

Le Capricorne vert à odeur de roſe.

Long. 1 pouce. Larg. 3 ½ lig.

C. viridi-cœrulescens.

Loc. Habitat truncos & folia salicis.

. C. ruber. C. Koehleri

Le Capricorne rouge.

Long. 8 lig. Larg. 2 $\frac{2}{3}$ lig.

C. niger, elytris thoracisque lateribus rubris.

Loc. Habitat truncos arborum.

. C. monilis. C. nebulosus lamia nebulosa latr

Le Capricorne noir marbré de gris.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. niger, elytris vellere cinereo marmoratis, antennis pedibusque cinereo interfectis.

Loc. Habitat salices.

. C. fasciatus. lamia fuliginator

Le Capricorne ovale cendré.

Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

C. ater ovatus, antennis corpore dimidio brevioribus, elytris vellere cinereo albidis.

Varietas A. elytris fuscis vellere cinereo fasciatis.

Loc. Habitat sepium arbusta.

9. C. hispidus.

Le Capricorne à étuis dentelés.

Long. 3 lig. Larg. 1, 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. ovatus, fuscus, elytris antice cinereis, apice bidentatis.

Loc. Habitat pratorum gramina.

10. C. ovatus.

Le Capricorne brun de forme ovale.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. ovatus fuscus, elytris integris.

Loc. Idem.

11. C. compressus.

Le Capricorne applati.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. niger, compressus, scaber, thorace utrinque serrato, pedibus fulvis.

Loc.

* 12. C. dentatus.

Le Capricorne à pointes.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. fusco-nebulosus, elytris antice cinereis, apice unidentatis.

Loc.

. C. nebulosus.

Le Capricorne nébuleux.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. fusco-nebulosus, elytris antice thoracisque medio subcinereis, elytris integris.

Loc.

IV. LEPTURA. *LA LEPTURE.*

Antennæ à basi ad apicem decrescentes, in oculo positæ.

Thorax inermis.

FAMIL. I. *Thorace cylindraceo.* Saperda

L. carcharias. sap. carch. oliv. fabr.

La Lepture chagrinée.

Long. 1 pouce. Larg. 4 lig.

L. cinerea, nigro-punctata, thorace cylindraceo.

Loc. Habitat truncos arborum.

L. subcœrulea. sap. cylindrica oliv. fabr.

La Lepture ardoisée.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

L. tota cœruleo-atra, capite thoraceque subvillloso.

Loc. Habitat flores.

3. L. betulina.

La Lepture à corcelet cylindrique & taches jaunes.

Long. 4, 5, 6 lig. Larg. 1, 1 ½ lig.

L. nigra, thoracis lineis tribus, elytrorumque maculis villoſo-flavis, thorace cylindraceo, antennis corpus æquantibus.

Loc. Habitat betulam.

4. L. piloſa.

La Lepture noire à étuis jaunes.

Long. 2 lig. Larg. ½ lig.

L. nigra; elytris flavis, apice nigris.

Loc. Habitat hortos.

5. L. oculata.

La Lepture aux yeux de Paon.

Long. 5 lig. Larg. 2 ½ lig.

L. nigro-cinerea, thorace elytriſque maculis oculiferis atris, circulo cinereo, thorace ſubcylindraceo.

Loc. Habitat hortos, rara, in horto regio inventa.

* 6. L. nebuloſa.

La Lepture nébuleuſe.

Long. 6 lig, Larg. 2 ½ lig.

L. fuſca, ſubvilloſa, maculis cinereis marmorata.

Loc.

7. L. ferruginea.

La Lepture rouillée.

Long. 17 lig. Larg. 5 lig.

L. tota nigro-ferruginea, thorace ſubcylindraceo.

Loc. Habitat ſylvas.

8. L. fulvipes.

La Lepture à pattes fauves.

Long. 6 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

L. atra, punctata, pedibus flavis, thorace cylindraceo.

Loc. Habitat agros fontis-Bellaquæi.

FAMIL. II. *Thorace globoſo.* Callidium fabr.

9. L. variegata. Cal. liciatum

La Lepture# *à corcelet rond & taches jaunes.*

Long. 6 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

L. nigra, maculis villoſo-flavis, thorace globoſo, antennis corporis dimidio brevioribus.

Loc. Habitat hortos.

est le meme que le leptura liciata & le leptura ustulata de Linnée

10. L. villosa. *cal. sex punctatum*

La Lepture velours jaune.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

L. nigra, villoso-flava, maculis duabus in elytro singulo glabris nigris.

Loc. Habitat flores.

11. L. punctata.

La Lepture à corcelet rouge ponctué.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

L. nigricans, capite thoraceque rubro; punctis nigris.

Loc. Habitat hortos.

12. L. arcuata. *cal. arcuatum*

La Lepture aux croissans dorés.

Long. 5, 6, 8 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig.

L. nigra, elytrorum lineis quatuor arcuatis, punctisque flavis, pedibus testaceis.

Loc. Habitat arborum truncos.

[illegible] regarde le call. detritum comme var. de l. [illegible]

13. L. arietis. *cal. arietis*

La Lepture à trois bandes dorées.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

L. nigra, elytrorum lineis tribus transver

ſis punctiſque flavis, pedibus teſtaceis.

Loc. Habitat flores.

4. L. ruſtica.

La Lepture à raies blanches.

Long. 2 $\frac{1}{2}$, 4 lig. Larg. 1, 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. nigra, elytrorum lineis tranſverſis punctiſque albis.

Loc. Habitat umbelliferarum flores.

5. L. ſignata.

La Lepture noire à étuis gris tachés de jaune.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

L. nigra, elytris pallido-fuſcis, ſignaturis flavis.

Loc. Habitat flores.

16. L. gammoides.

La Lepture jaune à bandes noires.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

L. villoſo-flava, elytris lineis tribus tranſverſis nigris.

Loc. Idem.

17. L. myſtica.

La Lepture arlequine.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

L. nigra, elytris maculis teſtaceis, nigris, albidis, lineiſque nigris & albicantibus variegatis.

Loc. Rar. hab. hortos, in regio horto inventa.

18. L. cyanea.

La Lepture bleue.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

L. cœrulea, tibiis rufis thorace ſubgloboſo.

Loc. Habitat arborum truncos.

FAMIL. III. *Thorace inæquali ſcabro.*

19. L. quadri-punctata.

La Lepture brune à corcelet rhomboïdal.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

L. teſtaceo-fuſca, thorace rhomboidali villoſo, elytrorum maculis quatuor albidis tranſverſim poſitis.

Loc. Habitat arbores.

20. L. vidua.

La Lepture veuve.

Long. 7 lig. Larg. 2 lig.

L. tota atra, denſe punctata.

Loc. Habitat arbores.

21\. L. teſtacea. *Cal. testaceum*

La Lepture livide à corcelet liſſe.

Long. 4 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

L. teſtacea, thorace glabro.

Loc. Habitat flores.

22\. L. punctuoſa. *Cal. femoratum*

La Lepture maroquinée.

Long. 6 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

L. atra, denſe punctata, femoribus rufis.

Loc.

23\. L. femorata. *callidium femineum*

La Lepture noire à corcelet rougeâtre.

L. atra, thorace teſtaceo, femoribus craſſis.

Loc. Habitat flores.

24\. L. turcica.

La Lepture aux croiſſans d'argent.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

L. nigra, elytris antice rufis, poſtice lineis quatuor albis arcuatis.

Loc. Habitat hortos.

25. L. craſſipes.

La Lepture noire à groſſes cuiſſes brunes.

L. atra, femoribus craſſis rufis.

Loc. Habitat flores.

26. L. fuſca.

La Lepture brune.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

L. tota fuſca punctata.

Loc. Idem.

27. L. ſanguinea.

La Lepture veloutée couleur de feu.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

L. nigra, thorace coleoptriſque ſericeo-rubris.

Loc. Habitat truncos arborum & frequentiſſimè loca domorum ubi lignum ſervatur.

28. L. attenuata.

La Lepture à étuis étranglés.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

L. nigra, elytris pedibuſque rubeſcentibus lividis, coleoptris attenuatis.

Loc. Habitat flores.

XXV. STENOCORUS. *LE STENCORE.*

Antennæ à baſi ad apicem decreſcentes, ante oculos poſitæ.

Elytra apice anguſtiora.

FAMIL. I. *Thorax armatus ſpinâ vel tuberculo laterali.*

1. S. pariſinus.

Le Stencore liſſe à bandes jaunes.

Long. 8, 9 lig. Larg. 2 ½ lig.

S. glaber, è fuſco niger, elytro ſingulo lineis tribus elevatis, maculis duabus luteis, thorace ſpinoſo.

Loc. Habitat ſylvas.

2. S. inquiſitor.

Le Stencore noir velouté de jaune.

Long. 6 ½ lig. Larg. 2 lig.

S. niger, vellere flavo variegatus, ely-

tris lineis duabus elevatis, thorace ſpinoſo.

Loc. Habitat flores.

3. S. geniculatus. Leptura meridiana oliv.

Le Stencore à genoux noirs.

Long. 7, 8, 10 lig. Larg. $1\frac{1}{2}$, 2, $2\frac{1}{3}$ lig.

S. è fuſco niger, femoribus rufis articulis nigris.

Loc. Idem.

4. S. rubro-violaceus.

Le Stencore rouge à étuis violets.

Long. 9 lig. Larg. $2\frac{1}{2}$ lig.

S. ruber, oculis nigris, elytris violaceis.

Loc. Habitat arbores.

5. S. rubeus. leptura calcarata oliv.

Le Stencore jaune à bandes noires.

Long. 6 lig. Larg. $1\frac{1}{2}$ lig.

S. niger, elytris teſtaceo-flavis, punctis duobus, cruce faſciiſque nigris.

Loc. Habitat rubum.

FAMILIA II. *Thorax inermis.*

6. S. lamed. leptura hastata oliv.

Le Stencore bedeau.

S. niger, elytris rubeſcentibus, apice ſuturæque medietate nigris.

Loc.

7. S. melanurus. leptura melanura oliv. fabr.

Le Stencore noir à étuis rougeâtres.

S. niger, elytris rubeſcentibus lividis, apice nigris. *Mas.*

S. niger, elytris rubeſcentibus lividis, apice ſimili. *Fœmina.*

Loc. Habitat ſepes & atbores.

8. S. luteſcens. leptura tomentosa oliv.

Le Stencore noir à étuis jaunes.

S. niger, elytris luteis, apice nigris.

Loc. Habitat rubum.

9. S. piceus. leptura nigra oliv.

Le Stencore noir à ventre rougeâtre.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

S. niger nitidus, abdomine fuſco-rubente.

Loc. Idem.

10. S. clavipes. leptura atra

Le Stencore noir à cuiſſes rouges.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. niger, femoribus clavatis rufis, apice nigris.

Varietas A. S. totus niger.

Long. 3 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

Loc.

11. S. ſylveſtris. leptura collaris

Le Stencore noir à corcelet rouge.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

S. niger, thorace rubro.

Loc. Habitat urbem *Fontainebleau.*

12. S.† aquaticus. Donacia crassipes fab.

Le Stencore doré.

Long 2 $\frac{1}{2}$, 3, 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$, 1 lig.

S. deauratus, femoribus poſticis dentatis.

Varietas A. Stenocorus rubro-æneus, femoribus poſticis dentatis.

B. Stenocorus viridi-æneus, femoribus poſticis dentatis.

† leptura aqua. L.

D. sagittariae, C. Stenocorus flavo-æneus, femoribus poſticis dentatis.

D. crassipes D. Stenocorus violaceo-æneus, femoribus poſticis dentatis.

E. Stenocorus nigro-æneus, femoribus poſticis dentatis.

Loc. Habitat rivulorum ripas, & irides pratorum.

13. S. ruber.

Le Stencore rouge.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

S. totus ruber, oculis nigris.

Loc.

14. S. ignitus.

Le Stencore noir à étuis rouges.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

S. niger, elytris, ruberrimis densè punctatis.

Loc.

15. S. funereus.

Le Stencore en deuil.

Long. 9 lig. Larg. 3 lig.

S. totus niger punctatus.

Loc.

XXVI. LUPERUS. *Le Lupere.*

Antennæ filiformes articulis longis.

Thorax planus, marginatus.

1. L. ulmarius.

Le Lupere noir à corcelet & pattes rouges. Crioceris flavipes fabr. Galeruca flav. fabr.

L. niger, thorace pedibuſque rufis.
Loc. Habitat ulmum.

2. L. betulinus.

Le Lupere noir à pattes rouges.

Long. 1 ½ lig. Larg. ¾ lig.

L. niger, pedibus rufis.
Loc. Habitat betulam.

XXVII. CRYPTOCEPHALUS. *Le Gribouri.*

Antennæ filiformes articulis longis.
Thorax gibbus hemiſphæricus.

1. C. alni.

Le Gribouri bleu de l'aulne.

Long. 4 lig. Larg. 3 lig.

C. violaceus, punctis inordinatis.
Loc. Habitat alnum.

2. C. vitis.

Le Gribouri de la vigne.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. niger, elytris rubris.
Loc. Habitat vitis folia.

3. C. ſericeus.

Le Velours vert.

Long. 3, 4 lig. Larg. 2 lig.

C. viridi-auratus ſericeus.

Loc. Habitat ſalicem.

4. C. bolati.

Le Gribouri à deux bandes jaunes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. niger, elytro ſingulo duplici lineâ longitudinali flava.

Loc. Habitat prata & ſepes.

5. C. 4-maculatus.

Le Gribouri à deux taches jaunes.

C. niger, capite thoraceque antice luteis, elytro ſingulo externe maculâ duplici flavâ.

Loc. Idem.

6. C. bi-punctatus.

Le Gribouri rouge ſtrié à points noirs.

Long. 2 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. niger, elytris rubris ſtriatis, maculis quatuor limboque nigris.

Loc. Habitat cirſium.

7. C. cirſii. Cr. cirsii

Le Gribouri rouge ſans ſtries, à points noirs.

C. niger, thorace lineis flavis, elytris rubris punctatis, maculis quatuor limboque nigris.

Loc. Idem.

8. violaceus.

Le Gribouri bleu ſtrié.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. cœruleo-violaceus, punctis per ſtrias digeſtis.

Loc.

9. S. cœruleus.

Le Gribouri bleu à points.

Long. 2 lig. Larg. $1 \frac{1}{4}$ lig.

C. cœruleus, punctis ſparſis, tibiis anticis ferrugineis.

Loc.

10. C. niger.

Le Gribouri noir strié.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. niger striatus, pedibus rufis.

Loc.

11. C. rufipes.

Le Gribouri noir à corcelet rouge.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. niger striatus, thorace pedibusque rufis.

Loc.

12. C. fulvus.

Le Gribouri fauve.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. capite thoraceque fulvo, elytris pallidis.

Loc.

13. C. 10-maculatus.

Le Gribouri rouge à 10 taches noires.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. niger, elytris rubris punctatis maculis decem nigris.

Loc.

* 14. C. limbosus.

Le Gribouri rouge à corcelet jaune.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. thorace flavo maculis nigris; elytris rubris punctatis, maculis sex limboque nigris.

Loc

* 15. C. chermesinus.

Le Gribouri couleur de feu.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. niger thorace elytrisque rubris punctatis.

Loc.

* 16. C. fuscipes.

Le Gribouri à pattes brunes.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. cœruleus, punctis inordinatis, pedibusque villoso-fuscis.

Loc.

XXVIII. CRIOCERIS. *Le Criocere.*

Antennæ cylindraceæ articulis globosis.
Thorax cylindraceus.

1. C. merdigera.
Le Criocere rouge du lys.
Long. 3 lig. Larg. 1 ½ lig.
C. rubra.
Loc. Habitat lilia.

2. C. 12-punctata.
Le Criocere rouge à points noirs.
Long. 2 ½ lig. Larg. 1 ⅓ lig.
C. rubra, punctis tredecim nigris.
Loc. Habitat aſparagum.

3. C. aſparagi.
Le Criocere porte-croix de l'aſperge.
Long. 2 ⅔ lig. Larg. 1 lig.
C. thorace rubro punctis duobus nigris, coleoptris flavis, cruce cœruleo-nigra.
Loc. Idem.

4. C. hordei.
Le Criocere bleu à corcelet rouge.
Long. 2 lig. Larg. ⅔ lig.
C. cœruleo-viridis thorace femoribuſque rufis.
Loc. Habitat hordeum & avenam.

5. C. cyanella.

Le Criocere tout bleu.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. tota cœruleo-viridis.

Loc.

6. C. pallida.

Le Criocere aux yeux noirs.

Long. 2 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. 1 lig.

C. pallida, oculis nigris.

Loc.

* 7. C. ſpinoſiſſima.

La Châtaigne noire.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. tota atra, ſpinis horrida.

Loc. Habitat gramen loliaceum.

* 8. C. thoracica.

Le Criocere noir à corcelet rouge.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. atro-cœrulea, thorace femoribuſque fuſcis, elytris punctis ſparſis.

Loc.

* 9. C. atrata.

Le Criocere noir ſtrié.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C.

C. tota atro-cœrulea ſtriata.
Loc.

10. C. paleata.
Le Criocere paillet.
Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. 1 lig.
C. nigra, elytris pedibuſque pallidis.
Loc.

XXIX. ALTICA. *L'Altise.*

Antennæ ubique æquales.
Femora poſtica craſſa ſubgloboſa.

1. A. helxines.
L'Altiſe bleue.
Long. 2 lig. Larg. 1 lig.
A. viridi-cœrulea.
Loc. Habitat hortos.

2. C. malvæ.
L'Altiſe de la mauve.
A. nigra, elytris cœruleis, thorace pedibuſque rubris.
Loc. Habitat folia malvæ.

3. A. bicolor.
L'Altiſe bedaude.
Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

A. nigra, elytris nigro-æneis ſtriatis, thorace rubro, pedibus nigris.

Loc. Habitat malvam.

4. A. hortenſis. A. erythrocephala

L'Altiſe noire dorée.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. nigra-ænea, elytris ſtriatis, pedibus ferrugineis.

Loc. Habitat hortos frequentiſſima.

5. A. ovata. a. nigripes

L'Altiſe noire ovale.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

A. nigro ænea, ovata, pedibus nigris.

Loc. Habitat hortos.

6. A. braſſicæ. a. hortensis

L'Altiſe noire allongée des cruciferes.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

A. nigro-ænea, oblonga, pedibus nigris.

Loc. Habitat cruciferas.

7. A. lævis. bon

L'Altiſe noire à pattes fauves.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{5}{6}$ lig.

A. nigra, ovata, pedibus rufis, elytris non ſtriatis.

Loc. Habitat hortos.

8. A. minuta. a. atra

L'Altiſe noire à jambes jaunes.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. nigra, ſubrotunda, tibiis ferrugineis.

Loc. Idem.

9. A. nemorum. bon

L'Altiſe à bandes jaunes.

Long. $\frac{1}{2}$, 1 lig. Larg. $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ lig.

A. atra, elytris longitudinaliter in medio flaveſcentibus.

Loc. Habitat aromaticas plantas.

". A. marginata. bon

L'Altiſe à bordure noire.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. nigra; thorace elytriſque flavis, oris nigris.

Loc. Habitat hortos.

:. A. hyoſciami. bon

L'Altiſe du choux.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. cœrulea, elytris ſtriatis, tibiis ferrugineis.

Loc. Habitat braſſicam & hyoſciamum.

12. A. cœrulea. bon

L'Altiſe bleue ſans ſtries.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

A. cœrulea, elytris punctis ſparſis, tibiis ferrugineis.

Loc. Habitat braſſicam.

13. A. nitidula. bon

L'Altiſe rubis.

Larg. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. nigro-aurata, thorace aureo, femoribus ferrugineis.

Loc. Habitat ſalicem.

14. A. aurea. a. helxines

Le Plutus.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. aurea, pedibus flavis.

Loc. Habitat hortos.

15. A. 4-punctata. i. 4 pustulata

L'Altiſe à points rouges.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

A. nigra, coleoptris punctis quatuor rubris.

Loc. Idem.

:6. A. ferruginea. a. exoleta

L'Altise fauve à stries.

A. oblonga, ferruginea, elytris striatis.

Loc. Idem.

:7. A. fulva. a. testacea

L'Altise fauve sans stries.

Long. lig. Larg. lig.

A. ovata ferruginea, elytris punctis sparsis.

Loc. Idem.

8. A. exsoleta. a. [illegible]

L'Altise jaune.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

A. flava.

Loc. Idem.

9. A. pallida. a. atricilla

La Paillette.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. elytris pallido-flavis, capite nigro.

Loc. Idem.

* 20. A. ænea.

L'Altiſe bronzée.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

A. nigro-ænea, ovata, pedibus rufis, elytris punctis ſparſis.

Loc. Habitat hortos.

XXX. GALERUCA. *LA GALERUQUE.*

Antennæ ubique æquales, articulis ſubgloboſis.

Thorax inæqualis, ſcaber, marginatus.

1. G. tanaceti.

La Galeruque brunette.

Long. 4 lig. Larg. 3 lig.

G. atro-fuſca, elytris lineis tribus elevatis, punctis numeroſis.

Varietas A. fuſca, elytris lineis elevatis interruptis.

Loc. Habitat tanacetum, & flores compoſitos in pratis.

2. G. ſanguinea.

La Galeruque ſanguine.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

G. ſanguineo-rubra.

Loc. Habitat flores.

3. G. ulmi. G. Calmariensis

La Galeruque à bandes de l'orme.

Long. 2, 3 lig. Larg. 1 ½, 2 lig.

G. pallida, thorace nigro variegato, elytris faſciis duabus longitudinalibus nigris.

Loc. Habitat folia ulmi, abundans.

4. G. aquatica.

La Galeruque aquatique.

Long. 2 lig. Larg. 1 ½ lig.

G. pallida, thorace nigro variegato, elytris unicoloribus pallidis.

Loc. Habitat potamogeton in rivis & ſtagnis.

5. G. livida.

La Galeruque griſette.

Long. 2 ½ lig. Larg. 1 ½ lig.

G. nigra, thorace elytriſque luteo-lividis.

Loc. Habitat betulam.

6. G. violacea.

La Galeruque violette.

Long. 3 lig. Larg. 1 ½ lig.

G. nigro-violacea.

Loc.

* 7. G. viridis.

La Galeruque verte.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

G. thorace pallide flavefcente, elytris viridibus nitentibus.

Loc.

8. G. 4-maculata.

La Galeruque quadrille.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

G. rubro-lutea, maculis quatuor nigris.

Loc.

XXXI. CHRYSOMELA. *LA CHRYSOMELE.*

Antennæ à bafi ad apicem crefcentes, articulis globofis.

Thorax æqualis marginatus.

1. C. populi. bin

La grande Chryfomele rouge à corcelet bleu.

Long. 5, 6 lig. Larg. 4 lig.

C. nigro-cœrulea, elytris rubris apice nigris.

Variet. A. ead. elytris ommino rubris.

La petite Cryſomele rouge à corcelet bleu.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

Loc. Habitat populum.

2. C. polita. C. Tremula

La Chryſomele rouge à corcelet doré.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 $\frac{1}{3}$ lig.

C. viridi-ænea, elytris rubicundis, punctis ſparſis.

Loc.

3. C. ſtriata. C. lurida

La Chryſomele rouge à corcelet noir.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

C. nigra, elytris rubris ſtriatis, ſtriis punctatis.

Loc.

4. C. 10-punctata. bou

La Chryſomele rouge à points noirs.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

C. rubra, elytro ſingulo maculis quinque nigris.

Loc. Habitat ſalicem.

5. C. hæmoptera. bon

La Chryſomele violette.

Long. 3 ½ lig. Larg. 3 lig.

C. tota violacea.

Loc.

6. C. violaceo-cœrulea.

La Chryſomele bleue à corcelet violet.

Long 4 lig. Larg. 2 ½ lig.

C. cœrulea, thorace violaceo.

Variet. ead. thorace nigro-violaceo.

Loc.

7. C. nigra.

La Chryſomele noire à aîles rouges.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

C. tota nigra.

Loc.

8. C. ſanguinolenta. bon

La Chryſomele noire à bordure rouge.

Long. 5 lig. Larg. 4 lig.

C. nigro-cœrulea, elytris atris punctatis, margine exteriore rubro.

Loc. Habitat sylvas.

9. C. marginata. C. limbata

La Chrysomele bleue à bordure rouge.

Long. 3 ½ lig. Larg. 3 lig.

C. nigro-cœrulea, elytris lucidis, punctatis margine exteriore & anteriore rubris.

Loc. Habitat prata; rara.

10. C. graminis.

Le grand Vertubleu.

Long. 4 lig. Larg. 3 lig.

C. viridi-cœrulea.

Loc. Habitat galeopsim, lamium, mentham & gramina.

11. D. viridula. C. fastuosa

La Chrysomele dorée. C. aenea

Long 2, 3 lig. Larg. 1 ½, 2 lig.

C. viridis nitida, thorace antice æquali, elytris pone contiguis.

Loc. Habitat flores labiatos.

12. C. ænea.

Le petit Vertubleu.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. viridis nitida, thorace antice excavato, faſciis elytrorum longitudinalibus cœruleis.

Loc. Habitat flores labiatos.

13. C. nitidula.

La Chryſomele à gallons.

Long. 4 lig. Larg. 3 lig.

C. viridis nitida, ſtriis decem cupreis, punctorum duplici ſerie diviſis.

Loc. Idem.

14. B. faſciata.

L'Arlequin doré.

Long. 3, 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2, 2 $\frac{1}{4}$ lig.

C. aurea, faſciis cœruleis, cupreiſque alternis, punctis inordinatis.

Loc. Habitat colles aridos.

15. C. rubro-cuprea.

La Chryſomele briquetée.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 3 lig.

C. supra rubro-cupræa, infra nigra nitens.

Loc.

16. C. malvæ.

La Chryſomele verte à corcelet rouge.

Long. 1 $\frac{1}{4}$, 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. nigra, elytris cœruleo-viridibus, thorace pedibus antennarumque baſi rufis.

Loc. Habitat malvam.

17. C. betulæ.

La Chryſomele bleue du ſaule.

Long. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig. Larg. 1, 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. nigro-purpurea, punctis excavatis, ſtriata.

Loc. Habitat ſalicem & betulam.

18. C. thoracica.

La Chryſomele à ſuture noire.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

C. rubra, thorace punctis duobus nigris, coleoptrorum ſuturâ nigrâ.

Loc.

19. C. caraboides.

La Chryſomele à un ſeul étui.

Long. 3, 6, 7 lig.

C. atro-purpurea, elytris coadunatis, alis nullis.

Loc. Habitat hortos & ſylvas; larva Gallium.

20. C. phellandrii.

La Chryſomele à bandes jaunes.

Long. 2 ½ lig. Larg. ⅘ lig.

C. oblonga nigra, elytrorum lineis duabus longitudinalibus luteis.

Loc. Habitat phellandrium.

21. C. ferruginea.

La Chryſomele brunie.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. nigro cuprea, punctis elytrorum per ſtrias digeſtis.

Loc.

22. C. gemellata.

La Chryſomele à ſtries jumelles.

Long. 2 ⅓ lig. Larg. 1 ⅓ lig.

C. viridis, punctis elytrorum per ſtrias gemellas digeſtis.

Loc. –

* 23. C. ſcabra.

La Chryſomele greſillée.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. viridi-aurea, elytris ſcabris nitentibus.

Loc.

24. C. antiqua.

La Chryſomele antique.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

C. tota fulvo cuprea punctata.

Loc.

25. C. ſuturata.

La Chryſomele couturée.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

C. rubeſcens, elytrorum ſtriis punctatis; ſutura nigra.

Loc.

26. C. tulipa.

La Chryſomele tulipe.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. thorace pedibuſque fulvis; elytris antice luteis maculâ fuſcâ; poſtice fuſcis, maculis luteis.

Loc.

XXXII. MYLABRIS. *Le Mylabre.*

Antennæ ſenſim creſcentes, articulis hemiſphæricis, roſtro brevi plano inſidentes.

Antennæ quatuor in extremo roſtri.

1. M. crucigera.

Le Mylabre à croix blanche.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

M. fuſca, cinereo-nebuloſa abdominis apicè cruce albâ.

Loc. Larva legumina habitat, mylabris flores.

2. M. fuſca.

Le Mylabre brun.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

M. tota fuſca.

Loc.

3. M. ſericea.

Le Mylabre ſatiné.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. nigra, abdomine albo ſericeo.

Loc. Habitat flores.

XXIII. RHINOMACER. *Le Becmare.*

Antennæ clavatæ integræ, roſtro longo inſidentes.

1. R. elongatus.
Le Becmare levrette.
Long. 3 lig. Larg. ⅔ lig.
R. corpore anguſto longo niger, thorace faſciis quatuor albicantibus.
Loc. Habitat carduum.

2. R. viridis. attelabus betuleti
Le Becmare vert.
Long. 3 lig. Larg. 2 lig.
R. totus viridi-ſericeus.
Loc.

3. R. auratus. att. populi
Le Becmare doré.
Long. 2 lig. Larg. 1 ½ lig.
R. viridi-auratus, ſubtus nigro-violaceus.
Loc.

4. R. ruber. { attelabus bacchus / att. aequatus
Le Becmare doré à étuis rouges.
Long. 1 ¼, 2 lig. Larg. ⅔ 1 lig.

R. niger, elytris rubris, capite thoraceque aureis, proboſcide longitudine fere corporis.

Loc.

5. R. cœruleus.

Le Becmare bleu à poil.

Long. 1, 1 $\frac{1}{2}$, 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$, 1, 1 $\frac{1}{4}$ lig.

R. ſubvilloſus cœruleus.

Loc. Habitat flores.

6. R. niger.

Le Becmare non ſtrie.

R. nigro-fuſcus, glaber, punctato-ſtriatus.

Loc. Idem.

7. R. oblongus.

Le Becmare allongé.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

R. nigro-virideſcens, oblongus ſtriatus.

Loc. Habitat umbelliferarum flores.

8. R. fulvipes. att. flavipes

Le Becmare noir à pattes fauves.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

R. ſubgloboſus, niger, ſtriatus, femoribus rufis.

Loc. Habitat flores.

9. R. minutus.

Le Becmare puce.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

R. ſubgloboſus, villoſus, niger, pedibus elytriſque rufis.

Loc. Idem.

10. R. coccineus. attelabus curculionoides

Le Becmare laque.

Lon. $1\frac{1}{2}$, 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$, $1\frac{1}{4}$ lig.

R. niger, thorace elytriſque rubris, proboſcide longitudine capitis.

Loc.

11. R. coryli. att. coryli var B lata.

La Tête écorchée.

Long. 3 lig. Larg. $1\frac{1}{2}$ lig.

R. niger, thorace elytriſque rubris, capite pone elongato.

Loc. Habitat corylum.

12. R. ſtriatus.

Le Becmare noir à trompe fauve.

Long. $1\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

R. oblongus, nigro cupreus; pedibus & proboſcide fulvis, punctis elytrorum per ſtrias digeſtis.

Loc.

* 13. R. fulgidus.

Le Becmare rouge.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

R. ovatus, ſtriatim punctatus, ſupra ruber, infra cupreus; antennis, proboſcide pedibuſque nigris.

Loc.

XXXIV. CURCULIO. *LE CHARANSON.*

Antennæ clavatæ fractæ, roſtro longo corneo inſidentes.

FAMIL. I. *Femoribus inermibus.*

1. C. nebuloſus.

Le Charanſon à trompe ſillonnée.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

C. albo nigroque varius, proboſcide planiuſculâ carinatâ, thoracis longitudine.

Loc. Habitat arbores.

2. C. rugoſus. C. carinatus
Le Charanſon ridé.
Long. 4 lig. Larg. 2 lig.
C. totus fuſcus rugoſus.
Loc. Habitat prata.

3. C. ſulcatus. C. striatus
Le Charanſon à corcelet ſillonné.
Long. 3 ½ lig. Larg. 2 lig.
C. fuſco-nebuloſus, thorace ſulcato; elytris ſtriatis.
Loc. Idem.

4. C. paraplecticus. bon
Le Charanſon à ſuture noire.
Long. 5 lig. Larg. 1 ½ lig.
C. oblongus, elytris villoſo-cinereis, ſuturâ nigrâ.
Loc.

5. C. pictus. C. punctatus
Le Charanſon à côtes tachetées.
Long. 3 ½ lig. Larg. 1 ⅔ lig.
C. fuſcus, fulvo maculatus; elytris ſtriatis, ſtriis alternatim nigro maculatis.
Loc. Habitat loca arida.

6. C. bipunctatus. C. colon

Le Charanſon à deux points blancs.

Long. 4 lig. Larg. 1 ½ lig.

C. oblongus, fuſcus, thoracis lateribus albidis, elytris ſtriatis puncto albo.

Loc.

7. C. faſciatus. C. nebuloſus.

Le Charanſon à deux bandes tranſverſes.

Long. 9 lig. Larg. 4 lig. (5 li. 2 li. olir.)

C. nigro-fuſcus, thorace utrinque faſciâ longitudinali, elytris duplici tranſverſâ cinereâ.

Loc. Habitat carduum.

8. C. cardui. C. cynarae C. jaceae fabr.

Le Charanſon tacheté des têtes de chardon.

Long. 2 ½, 4 lig. Larg. 1 ¼, 2 lig.

C. niger, ſtriatus, maculis villoſo-fuſcis nebuloſus.

Loc. Idem.

9. C. elegans. C. abbreviatus fabr.

Le Charanſon brodé.

Long. 3 ⅔ lig. Larg. 1 ¼ lig.

C. niger, thorace punctato, elytris alternatim ſtriatis & punctatis.

Loc.

10. C. incanus.

Le Charanſon gris, ſtrié & ſans aîles.

Long. 2 ½, 4 lig. Larg. 1 ½, 2 ¼ lig.

C. cinereus, ſquamoſus, alis carens, elytris ſtriatis.

Loc. Habitat hortos, flores, arbores; abundans.

11. C. inciſus.

Le Charanſon noir à ſillons.

Long. 2 lig. Larg. ⅖ lig.

C. oblongus, totus niger, thorace punctato, elytris ſulcatis.

Loc.

12. C. argentatus.

Le Charanſon à écailles vertes, & pattes fauves.

Long. 2, 3 lig. Larg. ⅔, 1 ⅓ lig.

C. ſquamoſo-viridis, roſtro thorace breviore, pedibus rufis.

Loc. Habitat hortos, arbores, &c.

13. C. faſciolatus. C. lineatus?

Le Charanſon à corcelet rayé.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. roſtro thoracis longitudine, thorace tribus ſtriis pallidioribus.

Loc. Habitat arbores ſepium.

14. C. interſectus. bon

Le Charanſon écailleux à bandes.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. roſtro thorace breviore, ſquamis nitentibus, thoracis elytrorumque faſciis longitudinalibus.

Loc. Habitat flores.

15. C. modeſtus. C. humilis

Le Charanſon griſette.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{5}$ lig.

C. rufus, ſubvilloſus, capite nigricante, roſtro thorace breviore.

Loc. Idem.

16. C. viridis. C. cupri rostris

Le Charanſon ſatin-vert.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C.

C. cœruleo-viridis nitens, thorace punctato, elytris striatis.

Loc. Habitat cruciferas.

17. C. funereus.

La Pleureuse.

Long.

C. oblongus, niger; abdomine squamoso, lateribus albis.

Loc.

18. C. granarius.

Le Charanson brun du bled.

Long. 1 ½ lig. Larg. ½ lig.

C. rufo-testaceus oblongus, thorace elytrorum fere longitudine.

Loc. Habitat grana; horræis infestus.

19. C. saltator.

Le Charanson sauteur brun.

C. rufus, femoribus posticis crassioribus, elytris rufis.

Loc. Habitat ulmum.

F

20. C. alni. *bon*

Le Charanſon ſauteur à taches noires.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. rufus, femoribus poſticis craſſioribus, elytris maculis quatuor nigris.

Loc. Habitat ulmum & alnum.

21. C. quadrilis. *bon*

Le Charanſon quadrille à courte trompe.

Long. $1 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. cinereus elytrorum puncto quadruplic i nigricante, proboſcide thorace breviore.

Loc.

22. C. 5-maculatus. *C. 4 maculatus*

Le Charanſon quadrille à longue trompe.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. cinereus, elytrorum puncto quadruplici albo, proboſcide thorace longiore.

Loc.

23. C. communis. C. asperatus?

Le Charanſon ſatin gris.

Long. 1 ½ lig. Larg. 1 lig.

C. niger, ovatus, ſtriatus, totus villoſo-cinereus, thorace inermi.

Loc

24. C. armatus.

Le Charanſon à corcelet épineux.

Long.

C. ovatus, nigro-cinereus, thorace utrinque denticulato.

Loc.

5. C. pultiaris. C. pygmaeus

Le Charanſon à bandes blanches.

Long. Larg.

C. ſubrotundus, niger, ſquamoſus, elytris ſtriatis; thorace utrinque occuleato, lateribus lineâque mediâ albis.

Loc.

6. C. floriger. C. floralis

Le Charanſon noir ſtrié.

Long. 1 lig. Larg. ½ lig.

C. ſubgloboſus, cinereo-ater, ſtriatus, proboſcide thoracis longitudine.

Loc. Habitat flores.

27. C. cinctus. C. tricinctus

Le Charanſon roux à bande tranſverſale blanche.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{2}{5}$ lig.

C. globoſus rufus, elytris ſtriatis, faſciâ tranſverſâ albâ.

Loc.

28. C. vittatus. C. transversus

Le Charanſon noir à bande tranſverſale blanche.

C. globoſus niger, elytris ſtriatis, faſciâ tranſverſâ albâ.

Loc. Habitat ſalicem.

29. C. murinus. bon

Le Charanſon ſouris.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. ſubvilloſo-murinus, ſcutello albicante.

Loc.

30. C. ſpinifer.

Le Charanſon à côtes épineuſes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. totus fuſcus ſpinoſus, elytris ſtriis elevatis villoſo-ſpinoſis.

Loc.

31. C. denticulatus.

Le Charanſon noir à côtes.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. niger, ſcutello albicante, elytrorum ſtriis utrinque denticulatis.

Loc.

32. C. acridulus.

Le Charanſon pyriforme.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. pyriformis, nigro-cœruleſcens, abdomine ovato.

Loc. Habitat flores.

33. C. marmoratus.

Le Charanſon marbré à bandes.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

C. lividus, coleoptris faſciis plurimis obſcuris.

Loc. Habitat flores ſalicariæ.

FAMIL. II. *Femoribus denticulatis.*

34. C. coronatus. C. germanus

Le Charanſon à corcelet couronné.

Long. 6 lig. Larg. 2 ½ lig.

C. niger apterus, thorace utrinque puncto duplici fulvo, baſi pilis fulvis coronatâ.

Loc.

* 35. C. ſcabroſus.

Le Charanſon noir chagriné.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

C. totus niger, nitidus, elytris ſtriatis ſubrugoſis.

Loc.

36. C. tigrinus. C. [illegible]

Le Charanſon tigré.

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

C. niger, maculis villoſo-flavis, elytris ſubrugoſis.

Loc. Habitat Normanniam.

* 37. C. contractus.

Le Charanſon levrier.

Long. 2 lig. Larg. ⅓ lig.

C. oblongus, totus niger, thorace punctato, elytris ſtriato-punctatis.

Loc.

38. C. monopterus. C. ligustici

Le Charanſon gris à étuis réunis & chagrinés.

Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

C. cinereus, ſquamoſus, alis carens, elytris rugoſis.

Loc.

* 39. C. fuſcipes.

Le Charanſon noir à pattes brunes.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. niger ſtriatus, pedibus fuſcis.

Loc.

40. C. rugoſiſſimus.

Le Charanſon cartiſanne.

Long. 3, 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$, 2 $\frac{1}{2}$ lig.

C. fuſcus, apterus, elytris rugoſo-ſtriatis.

Loc.

41. C. auratus. C. argentatus

Le Charanſon à écailles vertes.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. ſqamoſus, viridi-auratus.

Loc. Habitat hortos, arbores.

42. C. querneus. C. oblongus

Le Charanſon à étuis fauves.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus, niger, elytris pedibuſque teſtaceis.

Loc. Habitat arbores.

43. C. geographicus.

Le Charanſon géographie.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. ſubgloboſus, nigro-fuſcus, ſquamoſus, lineolis albis variegatus.

Loc. Habitat viperinam.

44. C. ſtellifer. b...

Le Charanſon brun à bandes tranſverſes de taches blanches.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. fuſcus, elytris ſtriatis macularum albarum faſciâ triplici tranſverſâ.

Loc.

45. C. nucum.

Le Charanſon trompette.

Long. 2, 3, 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1, 1 $\frac{1}{2}$, 2 $\frac{2}{3}$ lig.

C. rufo-marmoratus, ſcutello cordato albo, proboſcide ſubulatâ longiſſimâ.

Loc. Habitat nuces.

46. C. teſſelatus. *[C. Druparum]*

Le Charanſon damier.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. flaveſcens, elytris luteo & rufo teſſelatis.

Loc.

47. C. ſcrophularis. *[C. Verbasci oliv. fabr.]*

Le Charanſon à lozange de la ſcrophulaire.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. ſubgloboſus niger, punctis duobus atris futuræ longitudinalis coleoptrorum, thorace exalbido.

Loc. Habitat ſcrophulariam.

48. C. hortulanus. *[C. scrophulariae oliv. fab]*

Le Charanſon gris de la ſcrophulaire.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. subglobosus, cinereus, punctis duobus nigris suturæ longitudinalis coleoptrorum.

Loc. Habitat scropuulariam.

49. C. pericarpius, oliv. ~~C. verbasci~~

Le Charanson porte-cœur de la scrophulaire.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. subglobosus; fusco-nebulosus, maculâ cordatâ albâ in medio dorso.

Loc. Idem. Scrophularia

50. C. tripunctatus. C. guttula

Le Charanson brun à points blancs.

C. subglobosus, squamosus, cinereo-fuscus elytrorum maculis tribus & apice albis.

Loc. Habitat prata.

51. C. armiger. C. cerasi

Le Charanson noir à corcelet armé.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. niger, thorace utrinqe dentato.

Loc. les chardons, au printems

52. C. plebeius.

Le Charanſon noir à corcelet ſans points.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. fuſco-niger thorace inermi.

Loc.

53. C. ſcutellatus.

Le Charanſon brun à écuſſon blanc.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. fuſcus, ſcutello puncto albo, elytris maculâ rubeſcente.

Loc.

54. C. rubigineus.

Le Charanſon couleur de rouille.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. ferrugineus, elytris ſtriatis, oculis nigris.

Loc.

55. C. villoſus.

Le Charanſon velouté.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. obſcure rufus, villis cinereis aſperſus, roſtro, thorace breviore.

Loc.

56. C. virgo. bru

Le Charanſon vierge.

Long. 1 lig. Larg. ½ lig.

C. oblongus, villis cinereis aſperſus, roſtro thoraci æquali.

Loc. Habitat flores.

* 57. C. punctulatus.

Le Charanſon noir picoté.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. totus niger, oblongus, thorace punctato, elytris punctato-ſtriatis, femoribus denticulatis.

Loc.

* 58. C. cordifer.

Le Charanſon à cœur.

Long. 1 ½ lig. Larg. ⅔ lig.

C. cinereus, ſcutello albo, faſciâque elytrorum interruptâ albâ, proboſcide longiſſimâ.

Loc.

59. C. fasciatus.

Le Charanson fascié.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. fusco-cinereus villosus elytrorum suturâ maculisque albis.

Loc.

XXXV. BOSTRICHUS. *LE BOSTRICHE.*

Antennæ clavatæ, clavâ ex articulis tribus compositâ, capiti insidentes.

Rostrum nullum.

Thorax cubicus caput intra se recondens.

Tarsi nudi spinosi.

1. B. ruber. { Bos. capucinus oliv. / apate cap. fabr.

Le Bostriche.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

B. niger, elytris rubris.

Loc. Habitat sylvas.

* 2. B. fuscus.

Le Bostriche brun.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

B. fuſcus, thorace coſtis, elytris ſtriis punctatis elevatis.

Loc.

XXXVI. CLERUS. *Le Clairon.*

Antennæ clavatæ, clavâ ex articulis tribus compoſitâ, capiti inſidentes.

Roſtrum nullum.

Thorax ſubcylindraceus, non marginatus.

Tarſi ſpongioſi.

1. C. apiarius. C. alvearius oliv. + Trichodes alv. fabr +

Le Clairon à bandes rouges.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

C. nigro-violaceus, hirſutus, elytris faſciâ triplici coccineâ.

Loc. Larva nidos apium habitat, clerus flores.

2. C. violaceus. necrobia violacea fabr + corynetes viol. fabr. +

Le Clairon bleu.

Long. 1 ½, 2, 2 ½ lig. Larg. ⅔, 1, 1 ¼ lig.

C. nigro-cœruleus.

Loc. Larva & clerus putrida loca habitat, frequens in domis.

3. C. cruciger.

Le Clairon porte-croix.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. fuſcus, villoſus, elytris flavis cruce fuſcâ.

Loc. Habitat flores.

4. C. villoſus.

Le Clairon ſatiné.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. niger, ſubovatus, villis cinereis.

Loc. Habitat flores reſedæ.

5. C. faſciatus.

Le Clairon porte-livrée.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. niger villoſus, elytrorum faſciâ anticâ rufâ, poſticâ albâ.

Varietas A. Id. thorace rufo.

Long. 3 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

B. Id. niger ſubvilloſus, elytrorum faſciâ anticâ rufâ, mediâ flavâ, poſticâ albâ.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

Loc. Habitat arbores vetuſtas.

* 6. C. maculatus.

Le Clairon à taches jaunes.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. fusco-niger subvillosus, elytro singulo maculis duabus flavis.

Loc.

XXXVII. ANTRIBUS. *L'Antribe.*

Antennæ clavatæ, clavâ ex articulis tribus compositâ capiti insidentes.

Rostrum nullum.

Thorax latus, marginatus.

Tarsi spongiosi.

1. A. marmoratus. scabrosus latr.

L'Antribe marbré.

Long. 1 ½ lig. Larg. 1 ⅓ lig.

A. ovatus, niger, elytris striatis, rubro nigroque marmoratis.

Loc. Habitat jaceam pratensem.

2. A. variegatus. ant. varius fabr.

L'Antribe minime.

Long. 1 ⅓ lig. Larg. ⅔ lig.

A. ovatus subvillosus, è fusco cinereoque variegatus.

Loc. Habitat flores.

3. A. ater. au. lati rostris

L'Antribe noir ſtrié.

Long. 6, 7 lig. Larg. 2 $\frac{1}{3}$ lig.

A. ater, elytris apice cineraſcentibus.

Loc. Habitat flores.

4. A. pulicarius. nitidula pedicularia +

L'Antribe des fleurs.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. niger, elytris abdomine brevioribus.

Loc. Habitat umbelliferas plantas.

5. A. bimaculatus. phalacrus bicolor lati. anaspitoma bicolor fabr.

L'Antribe à deux points rouges au bout des étuis.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. niger ovatus, elytris apice punctis duobus rubris.

Loc. Habitat flores.

6. A. lœvis.

L'Antribe noir liſſe.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

A. niger, ovatus, elytris abdomen tegentibus.

Loc. Idem.

* 7. A. fulvus. Ips cellaris oliv. + Dermestes cellaris fabr. +

L'Antribe fauve.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

A. oblongus, totus rufus.

Loc. Habitat vetuſta ligna.

* 8. A. connexus.

L'Antribe panaché.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

A. oblongus niger ſubvilloſus, elytri maculis connexis luteis.

Loc. Habitat flores.

* 9. A. nitidus.

L'Antribe perlé.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. ovatus totus fuſcus.

Loc. Idem.

* 10. A. vittatus.

L'Antribe à bandes.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. ovatus fuſcus, ſuturâ longitudinali nigrâ.

Loc. Idem.

1. A. pallidus.

L'Antribe paillet.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

A. ovatus, ſubtùs pallidus, ſupra fuſcus ſubvilloſus.

Loc. Habitat flores.

2. A. interſectus.

L'Antribe bigaré.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

A. oblongus ater, elytris ſignaturis albis pedibuſque annulis albis interſectis.

Loc. Idem.

XXVIII. SCOLYTUS. *Le Scolyte.*

Antennæ clavatæ, clavâ ſolidâ.

Roſtrum nullum.

S. niger. S. bostrichus oliv.

Le Scolyte. Bostrichus Scolytus fabr.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig. Sc. destructor latr.

Loc. Habitat cortices.

XXXIX. CASSIDA. *La Casside.*

Antennæ extrorſum craſſiores, nodoſæ.

Thorax & elytra marginata.

Caput thorace tectum.

1. C. viridis.

La Caſſide verte.

Long. 1, 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$, 1 lig.

C. viridis, corpore nigro.

Loc. Habitat plantas verticillatas & carduos.

2. C. nebuloſa.

La Caſſide brune.

Long. 2, 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. nebuloſa, pallida, corpore nigro.

Loc. Idem.

3. C. nobilis.

La Caſſide à bandes d'or.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

C. pallida, lineâ duplici longitudinali, viridi-deaurata.

Loc. Idem.

4. C. thoracica.

La Casside verte à corcelet brun.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. viridis, thorace ferrugineo.

Lo. Habitat asteris varias species.

5. C. variegata.

La Casside panachée.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

C. viridis maculis nigris variegata.

Varietas A. Cassida rubra maculis nigris variegata.

Loc. Habitat enulam campanam.

XL. ANASPIS. *L'Anaspe.*

Antennæ filiformes sensim crescentes.
Scutellum vix apparens.
Thorax planus, lævis non marginatus.

1. A. nigra. a. frontalis var. lat.

L'Anaspe noire. mordella front. fabr.

Long. 1, 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg $\frac{1}{2}$ lig.

A. tota nigra.

Loc. Habitat flores.

2. A. bicolor.

L'Anaſpe à taches jaunes.

A. nigra, elytro ſingulo antice maculâ flavâ.

Loc. Habitat flores.

3. A. thoracica.

L'Anaſpe à corcelet jaune.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{2}{5}$ lig.

A. nigra, thorace luteo.

Loc. Habitat rarior.

4. A. maculata.

L'Anaſpe fauve.

Long. $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

A. villoſo-flaveſcens, coleoptrorum maculis tribus obſcuris.

Loc. Idem.

ORDO TERTIUS.

Caract. Ordinis III.

Tarſorum articuli tres.

I. COCCINELLA. *LA COCCI-NELLE.*

Antennæ extrorſum craſſiores, nodoſæ, antennulis breviores.
Corpus hæmiſphæricum.

. C. bi-punctata.
La Coccinelle rouge à 2 points noirs.

Long. 2 ½ lig. Larg. 2 lig.
C. coleoptris rubris, punctis duobus nigris.
Loc. Habitat alnum; aphivora.

.. C. 5-punctata.
La Coccinelle rouge à 5 points noirs.

C. coleoptris rubis punctis quinque nigris.
Loc. Habitat hortos.

. C. 7-punctata. bon
La Coccinelle rouge à 7 points noirs.

Long. 3, 4 lig. Larg. 2 ½, 3 lig.

C. coleoptris rubris, punctis septem nigris.

Loc. Habitat tiliam.

4. C. 9-punctata.

La Coccinelle rouge à 9 points noirs & corcelet noir.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

C. coleoptris rubris, punctis novem nigris, thorace nigro, lateribus albis.

Loc. Habitat arbusta.

5. C. carpini.

La Coccinelle rouge à 9 points noirs & corcelet varié.

C. coleoptris rubris, punctis novem nigris, thorace nigro, antice albo.

Loc. Habitat carpinum.

6. C. 13-punctata.

La Coccinelle rouge à 13 points noirs & corcelet jaune varié.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C.

C. coleoptris rubris, punctis tredecim nigris.

Loc. Habitat arbusta.

7. C. trinacris.

La Coccinelle rouge à 13 points noirs & corcelet rouge à bande.

Long. $2\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

C. coleoptris rubris, punctis tredecim nigris, thorace rubro, medio nigro.

Loc. Habitat flores.

8. C. 11-punctata.

La Coccinelle rouge à 11 points & corcelet jaune.

Long. $1\frac{1}{2}$, 2 lig. Larg. 1, $1\frac{1}{2}$ lig.

C. coleoptris rubris, punctis undecim nigris; thorace luteo nigro punctato.

Loc. Habitat ulmum.

9. C. argus. 11 punctata Fabr.

La Coccinelle argus.

Long. 3 lig. Larg. $1\frac{1}{3}$ lig.

C. rubra, punctis undecim nigris, thorace rubro immaculato.

Loc. Habitat sepes.

10. C. 19-punctata.

La Coccinelle rouge à 19 points noirs.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. coleoptris rubris, punctis novem decim nigris.

Loc. Habitat ſepes.

11. C. 24-punctata.

La Coccinelle rayée.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. coleoptris rubris, punctis viginti-quatuor nigris, quibuſdam connexis.

Loc. Habitat flores.

12. C. conglobata.

La Coccinelle à bordure.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. coleoptris rubris, punctis plurimis nigris, quibuſdam connexis ſuturâ longitudinali nigrâ.

Loc. Habitat hortos.

12. C. 14-guttata.

La Coccinelle à 14 points blancs.

Long. 2, 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig.

C. coleoptris rubris, punctis quatuordecim albis.

Loc. Habitat hortos.

14. C. marginata.

La Coccinelle à points & bordure blanche.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

C. coleoptris rubris, punctis quatuordecim limboque albis.

Loc. Idem.

15. C. 14-punctata.

La Coccinelle à l'échiquier.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

C. coleoptris flavis, punctis quadratis nigris, quibusdam connatis.

Loc. Idem.

16. C. 16-punctata.

La Coccinelle jaune à suture.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C. coleoptris flavis, punctis sexdecim nigris, plurimis connexis, suturâ nigrâ.

Loc. Idem.

17. C. 22-punctata.

La Coccinelle jaune ſans ſuture.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. coleoptris flavis, punctis viginti nigris.

Loc. Habitat ſepes.

18. C. 14-puſtulata.

La Coccinelle noire à 14 points jaunes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{5}$ lig.

C. coleoptris nigris, punctis quatuordecim flaveſcentibus.

Loc. Habitat arbores.

19. C. 10-puſtulata.

La Coccinelle noire à 10 points jaunes.

C. coleoptris nigris, punctis decem flaveſcentibus aut rubris.

Loc. Habitat hortos.

20. C. 6-puſtulata.

La Coccinelle noire à points rouges.

Long. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig. Larg. 1 lig.

C. ovata, coleoptris nigris, punctis sex rubris.

Varietas A. punctis quatuor rubris.
B. punctis duobus rubris.
C. punctis duobus luteis.

Loc. Habitat hortos.

21. C. fasciata.

La Coccinelle velue à bandes.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. subvillosa nigra, fasciis duabus transversis rubris.

Loc. Habitat flores.

22. C. villosa. bis-bivernicata

La Coccinelle velue à points.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. subvillosa nigra, punctis quatuor luteo-rubris.

Loc. Idem.

23. C. interrupta.

La Coccinelle velue à bande interrompue.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. ſubvilloſa nigra, coleoptrorum baſi faſciâ tranſverſâ rubrâ interruptâ.

Loc. Habitat cortices & folia pruni; larva pilis albis & longis conſperſa dicitur, *le Barbet blanc des écorces.*

24. C. pygmæa. C. parvula

La Coccinelle velue à taches rouges au corcelet.

Long. $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. ſubvilloſa nigra, thorace utrinque maculâ rubrâ.

Loc. Habitat flores.

25. C. 4-puſtulata.

La Coccinelle tortue à 4 points rouges.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. rotunda nigra, coleoptrorum margine reflexo, punctis quatuor rubris.

Loc. Habitat urticam.

26. C. 2-puſtulata.

La Coccinelle tortue à bande rouge.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

C. rotunda nigra, coleoptrorum margine reflexo, faſciâ tranſverſâ rubrâ.

Loc. Habitat urticam.

27. C. teſtudinaris.

La Coccinelle noire à points rouges au corcelet.

C. rotunda nigra, coleoptrorum margine reflexo, thorace utrinque maculâ rubrâ.

Loc. Idem.

28. C. 16-guttata.

La Coccinelle à 16 points blancs.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

C. coleoptris rubris, punctis ſexdecim albis.

Loc.

29. C. 12-guttata.

La Coccinelle à 12 points blancs.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

C. coleoptris rubris, punctis duodecim albis.

Loc.

XLII. TRITOMA. *La Tritome.*

Antennæ extrorſum ſenſim craſſiores, antennulis longiores.
Corpus oblongum.

1. T. bimaculata.
La Tritôme.

Long. $2\frac{1}{2}$ lig. Larg. $1\frac{1}{4}$ lig.

Loc. Habitat corticis ſalices; rariſſima.

ORDO QUARTUS.

Caract. Ordin. IV.

Tarſorum primi & ſecundi pedum paris articuli quinque : pedum vero poſteriorum articuli quatuor.

XLIII. DIAPERIS. *La Diapere.*

Antennæ taxiformes, articulis lentiformibus per centrum perfoliatis.
Thorax convexus, marginatus.

1. D. fasciata.

La Diapere.

Long. 3 lig. Larg. 1, 1 $\frac{1}{4}$ lig.

Loc. Habitat ilicem, Fontis-Bellaquæi incola.

XLIV. PYROCHROA. *LA CARDINALE.*

Antennæ uno versu pectinatæ.

Thorax inæqualis, scaber, non marginatus.

1. P. ruberrima.

La Cardinale.

Long. 5. lig. Larg. 2 lig.

Loc. Habitat sepes, autumnalis.

XLV. CANTHARIS. *LA CANTHARIDE.*

Antennæ filiformes.

Thorax inæqualis, scaber; non marginatus.

FAMIL. I. *Tarſorum articulis nudis.*

1. C. veſicatoria.

La Cantharide des boutiques.

Long. 4, 5, 8, 9 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$, 2, 3 lig.

C. viridi-aurata antennis nigris.

Loc. Habitat fraxinos.

2. C. attenuata.

La Cantharide à bande jaune.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. nigra, elytris attenuatis, antice luteis.

Loc.

FAMIL. II. *Tarſorum articulis ſpongioſis.*

3. C. craſſipes.

La Cantharide verte à groſſes cuiſſes.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. viridi-cœrulea, elytris attenuatis, femoribus poſticis globoſis.

Varietas A. viridi-cœrulea, elytris attenuatis.

Loc. Habitat prata.

4. C. fulva.

La Cantharide fauve à grosses cuisses.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. nigra, elytris attenuatis fulvis, femoribus posticis globosis.

Loc. Habitat flores.

5. C. villosa.

La Cantharide jaune veloutée.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

C. flavescens, subvillosa, elytris attenuatis.

Loc. Idem.

6. C. flava. Lagria hirta

La Cantharide noire à étuis jaunes.

Long. 3 ½ lig. Larg. 1 lig.

C. subvillosa, nigra, elytris flavis, extremo antennarum articulo reliquis triplo majore.

Loc. Habitat sylvas.

7. C. testacea.

La Cantharide fauve avec la pointe des étuis noire.

Long. 5 lig. Larg. 1 ⅔ lig.

C. teſtacea, elytris apice nigris.

Loc.

8. C. formicoides.

La Cantharide fourmi.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

C. fuſca, elytris antice, thoraceque elongato rubris.

Loc.

9. C. variegata.

La Cantharide fourmi panachée.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. nigra, elytris fulvis maculis quinque nigris connexis, thorace elongato.

Loc.

XLVI. TENEBRIO. *Le Ténébrion.*

Antennæ filiformes.

Thorax planus marginatus.

FAMIL. I. *Antennæ articulis globoſis, extrorſum craſſiores.*

1. T. mortiſaga.

Le Ténébrion liſſe à prolongement.

Long. 10 lig. Larg. 4 lig.

T. atra, aptera, coleoptris lævibus, pone acuminatis.

Loc. Habitat plantas coacervatas & exeſas in hortis.

2. T. rugoſa.
Le Ténébrion ridé.

Long. 5 lig. Larg. 3 lig.

T. atra, aptera, coleoptris rugoſis, pone acuminatis.

Loc. Habitat arenam.

3. T. gemellata.
Le Ténébrion à ſtries jumelles.

Long. 4 lig. Larg. 2 ½ lig.

T. nigra, aptera, elytrorum ſtriis octo punctatis per paria diſpoſitis.

Loc. Habitat hortos.

4. T. ſtriata.
Le Ténébrion à 8 ſtries liſſes.

Long. 5 ½ lig. Larg. 1 ½ lig.

T. nigro-fuſca ovata, elytro ſingulo ſtriis octo lævibus.

Loc. Habitat arva.

5. T. cuprea.

Le Ténébrion bronzé.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

T. nigro-cuprea, elytro ſingulo ſtriis octo, coleoptris pone acuminatis.

Loc. Idem.

6. T. molitoria.

Le Ténébrion à 9 ſtries liſſes.

Long. 7 lig. Larg. 2 $\frac{2}{3}$ lig.

T. atra, oblonga, elytris ſtriis novem lævibus.

Loc. Larva farinam habitat; tenebrio domos.

7. T. ſabuloſa.

Le Ténébrion à ſtries dentelées.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

T. atra, elytris ſtriis quinque utrinque dentatis.

Loc. Habitat putrida loca.

8. T. nigra.

Le Ténébrion noir liſſe.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, tota lævis, coleoptris pone rotundatis.

Loc. Habitat arenam.

9. T. villoſa.

Le Ténébrion fauve velu.

Long. $1\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

T. tota ferruginea ſubvilloſa.

Loc.

10. T. ferruginea.

Le Ténébrion fauve liſſe.

Long. $1\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

T. tota ferruginea lævis.

Loc.

11. T. ſulcata. pimelia bipunctata

Le Ténébrion cannelé.

Long. 7 lig. Larg. $4\frac{1}{2}$ lig.

T. atra, aptera rotundata, elytris ſulcis tribus elevatis.

Loc. Habitat provincias Galliæ meridionales.

FAMILIA II. *Antennæ articulis longis, ubique æquales.*

12. T. lutea. Cistela sulphurea

Le Ténébrion jaune.

Long. $3\frac{1}{2}$ lig. Larg. $1\frac{1}{4}$ lig.

T. lutea.

Loc. Habitat flores.

* 12. T. arenaria.

Le Ténébrion à étuis fauves.

Long. 6 ½, 6, 5 ½ lig. Larg. 2 lig.

T. nigra, elytris ſtriatis ferrugineis.

Loc.

* 13. T. rotundata.

Le Ténébrion arrondi.

Long. 3 ½ lig. Larg. 2 lig.

T. nigra-cuprea, elytris ſingulis ſtriis octo punctatis, coleoptris pone rotundatis.

Loc.

* 14. T. globuloſa.

Le Ténébrion à corcelet arrondi.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

T. atra ſcabra, thorace globoſo.

Loc.

* 15. T. cœrulea.

Le Ténébrion bleu.

Long. 4 ½ lig. Larg. 1 ½ lig.

T. cœrulea punctata, elytris ſtriatis, tarſis fulvis.

Loc.

LVII. MORDELLA. *LA MORDELLE.*

Antennæ ſubſerratæ, articulis triangularibus.

Thorax antice attenuatus, convexus.

1. M. aculeata.

La Mordelle noire à pointe.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. atra, caudata, unicolor.

Loc. Habitat flores.

2. M. iriformis. m-aculeata

La Mordelle veloutée à pointe.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

M. atra, caudata, faſciis villoſo-aureis.

Loc. Idem.

3. M. ſtriata. Cistela Ceramboides

La Mordelle à étuis jaunes ſtriés.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

M. nigra, elytris fulvis ſtriatis.

Loc. Habitat arbores in ſylvis.

4. T. fulva.

La Mordelle à étuis jaunes ſans ſtries.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

M. nigra, elytris fulvis lævibus.

Loc. Idem.

5. M. flavipes.

La Mordelle brune à pattes fauves.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

M. fuſca, pedibus ferrugineis.

Loc. Idem.

XLVIII. NOTOXUS. *LA CUCULLE.*

Antennæ filiformes.

Thorax cucullatus, dente acuto.

1. C. cucullatus. N. monoceros

La Cuculle.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

Loc. Habitat umbelliferas, rariſſimus.

LIX. CEROCOMA. *La Cerocome.*

Antennæ ultimo articulo clavato : (maſculis complicatæ , in medio pectinatæ).

1. C. viridis. C. Schæfferi

La Cerocome.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

Loc.

ARTICULUS SECUNDUS.

Caract. articuli II.

Coleoptra dimidiata dura.

ORDO PRIMUS.

Caract. ordinis I.

Tarſorum articuli quinque.

L. STAPHYLINUS. *Le Staphylin.*

Antennæ filiformes.
Alæ tectæ.
Abdomen inerme.

1. S. maxillosus. St. olens +

Le grand Staphylin noir lisse.

Long. 11 lig. Larg. 2 $\frac{3}{4}$ lig.

S. ater, extremo antennarum articulo lunulato.

Loc. Habitat sylvas, hortos, &c.

2. S. cœrulescens. St. cyaneus +

Le Staphylin bleu.

Long. 7 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

S. atro-cœrulescens, extremo antennarum articulo lunulato.

Loc. Habitat hortos.

3. S. globulifer. St. similis +

Le petit Staphylin noir.

Long. 6 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

S. ater, extremo antennarum articulo subgloboso, elytris thorace brevioribus.

Loc. Idem.

4. S. macroclytron.

Le Staphylin noir à longs etuis.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

S. ater, elytris thorace duplo longioribus.

Loc. Habitat hortos.

. S. nebulofus. St. maxillosus +

Le Staphylin nébuleux.

Long. 8 lig. Larg. 2 lig.

S. niger, elytris abdomineque cinereo-nebulofis.

Loc. Habitat bovinas fæces.

5. S. teffellatus. St. pubescens

Le Staphylin velouté.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{5}{4}$ lig.

S. villofus, è fufco cinereoque viridi teffellatus.

Loc. Habitat hortos.

7. S. hirtus. bon +

Le Staphylin bourdon.

Long. 10 lig. Larg. 3 lig.

S. niger villofus, capite thorace anoque pilis fulvo-aureis.

Loc. Habitat fylvas, rarus.

8. S. chryfocephalus. bon +

Le Staphylin à tête jaune.

Long. 5 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. 1 $\frac{4}{5}$ lig.

S. pubeſcens, capite flavo, thorace elytriſque fuſco nigroque nebuloſis, punctis impreſſis.

Loc. Habitat arva.

9. S. erytropterus.

Le Staphylin à étuis couleur de rouille.

Long. $6 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

S. ater, non nitens, elytris pedibuſque rufis.

Loc.

10. S. flavopterus.

Le Staphylin noir à étuis fauves & liſſes.

Long. 1, 3, $3 \frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ lig.

S. niger nitens, pedibus, elytriſque lævibus teſtaceis.

Varietas A. Staphylinus niger nitens, pedibus elytriſque lævibus teſtaceis, thoracis punctis per ſtrias digeſtis.

Le Staphylin à étuis fauves & corcelet ſtrié.

Loc.

1. S. fulvopterus. ✱ nitidus. +

Le Staphylin à étuis marons pointillés.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

S. niger, nitens, pedibus coleoptrisque testaceis, elytris punctatis.

Loc.

2. S. brachypterus.

Le Staphylin à étuis très-courts.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

S. niger, nitens, pedibus elytrisque fuscis punctatis, thorace plano marginato.

Loc.

3. S. compressus.

Le Staphylin applati à étuis bruns.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. niger, nitens, antennis, pedibus, elytris, anoque testaceis, thorace marginato.

Varietas A. Idem; antennis clavatis.

Loc. Habitat flores.

14. S. punctatus.

Le Staphylin noir à pattes fauves & étuis pointillés.

Long. 3 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{5}$ lig.

S. niger, punctatus, antennis pedibusque ferrugineis.

Loc. Habitat flores.

15. S. rufipes.

Le Staphylin noir à corcelet lisse & bordé.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. niger, thorace marginato lævi, pedibus rufis.

Loc. Habitat arenam.

16. S. sulcatus.

Le Staphylin noir à corcelet sillonné & bordé.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. niger, thorace marginato suturato, pedibus rufis.

Loc. Idem.

17. S. æneus.

Le Staphylin à étuis bronzés.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

S.

S. niger, elytris nigro-æneis.

Loc.

18. S. chryſomelinus. Tachyporus chrys. latr. oxyp. chrys. fabr. +

Le Staphylin couleur de paille.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

S. niger, thorace, elytris, pedibuſque ſubteſtaceis.

Loc. Habitat arenam.

19. S. marginatus. Tachinus rufipes latr. oxyp. rufipes fabr.

Le Staphylin à étuis bordés de jaune.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

S. niger, elytris fuſcis margine flavo.

Loc. Habitat arva.

20. S. maculatus.

Le Staphylin noir à taches jaunes.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

S. niger; thorace utrinque, ſinguloque elytro, maculâ flavâ.

Loc. Idem.

21. S. riparius. pæderus rip. fab. +

Le Staphylin rouge à tête noire & étuis bleus.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. rufus, elytris cœruleis, capite abdominiſque apice nigris.

Loc. Habitat arenam humidam.

22. S. rufus. Oxyporus Rufus fabr. +

Le Staphylin jaune à tête, étuis & anus noirs.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

S. flavus, capite, elytris abdomineque pone nigris.

Loc.

23. S. thoracicus. pæderus ruficollis +

Le Staphylin noir à corcelet rouge.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. atro-cœruleſcens, thorace rubro.

Loc.

24. S. biguttatus. Stenus biguttatus

Le Staphylin junon.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. ater, oculis prominentibus craſſis.

Varietas A. Id. elytro ſingulo puncto flavo.

Loc. Habitat arenam.

25. S. clavicornis.

Le Staphylin à antennes en demi-maſſues.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. antennis ſubclavatis.

Loc.

26. S. melanophtalmos.

Le Staphylin fauve aux yeux noirs.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. pallidus, oculis anoque nigris, antennis ſubclavatis.

Loc.

27. S. elongatus.

Le Staphylin noir à bandes de points.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. niger nitens, elytris punctatis, thorace elongato lævi, ſtriis quatuor punctatis.

Loc.

28. S. anguſtatus.

Le Staphylin à corcelet étranglé.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. niger, thorace anguſtato fulvo, pedibus fuſcis.

Loc.

29. S. variegatus.

Le Staphylin applati à étuis bigarrés.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

S. niger compreſſus, elytris poſtice pedibuſque fuſcis.

Loc.

* 30. S. arenarius.

Le Staphylin à étuis jaunes au milieu.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. ater, elytris in medio flaveſcentibus.

Loc.

* 31. S. melonocephalus.

Le Staphylin à tête noire.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. fulvus, capite anoque nigris.

Loc.

32. S. nigro-fulvus.

Le Staphylin arlequin à longues mâchoires.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. niger, thorace pedibus elytrorum abdominiſque baſi fulvis, apice nigris, maxillis longitudine capitis.

Loc.

33. S. cupreus.

Le Staphylin cuivreux.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

S. æneus punctatus, elytris veluti teſſelatis.

Loc.

ORDO SECUNDUS.

Caract. ordinis II.

Tarſorum articuli quatuor.

XLI. NECYDALIS. *LA NECYDALE.*

Antennæ filiformes.

Alæ nudæ.

1. N. punctata.

La Necydale à points jaunes.

Long. 2 lig. Larg. ½ lig.

N. elytris apice puncto flavo.

Varietas A. Necydalis elytris apice puncto flavo, thorace luteo.

B. Necydalis elytris apice puncto flavo, thorace nigro.

Loc. Habitat folia ilicis.

* 2. N. major.

La grande Necydale.

Long. 9 lig. Larg. 1 ⅔ lig.

N. elytris ferrugineis immaculatis, antennis corpore brevioribus.

Loc.

ORDO TERTIUS.

Caract. ordinis III.

Tarſorum articuli tres.

LII. FORFICULA. *Le Perce-Oreille.*

Antennæ filiformes.

Alæ tectæ.

Abdomen forficibus armatum.

1. F. auricularia. *bon*

Le grand Perce-oreille.

Long. 7 lig. Larg. 2 lig.

F. antennarum articulis quatuordecim.

Loc. Habitat hortos, gramina, flores.

2. F. minor. *bon*

Le petit Perce-oreille.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

F. antennarum articulis undecim.

Loc. Habitat arenam humidam.

ORDO QUARTUS.

Caract. ordinis IV.

Tarſorum primi & ſecundi pedum paris articuli quinque, pedum vero poſteriorum articuli quatuor.

LIII. MELOE. *LE PROSCARABÉ.*

Antennæ à medio ad baſim & apicem decreſcentes.

Alæ nullæ.

1 M. proſcarabeus.

Le Proſcarabé.

Long. 10, 11 lig. Larg. 5 lig.

Loc. Habitat hortos.

ARTICULUS TERTIUS.

Caract. articuli III.

Coleoptra mollia membranacea.

ORDO PRIMUS.

Caract. ordinis I.

Tarſorum primi & ſecundi pedum paris articuli quinque, pedum vero poſteriorum articuli quatuor.

LIV. BLATTA. *La Blatte.*

Antennæ filiformes.

Ad ani latera apendices veſiculoſi tranſverſim ſulcati.

1 B. orientalis. lin

La Blatte des cuiſines.

Long. 9 lig. Larg. 4 ½ lig.

B. ferrugineo-fuſca, elytris ſulco ovato impreſſis, abdomine brevioribus.

Loc. Habitat loca calida domorum; farinam.

2. B. Aurelianenſis. B. americana

La grande Blatte. Kakerlac

Long. 15 lig. Larg. 5 lig.

B. fuſco-flaveſcens, elytris ſulco ovato impreſſis, abdomine longioribus.

Loc. Habitat agrum Aurelianenſem.

3. B. laponica.

La Blatte jaune.

Long. 3 $\frac{1}{2}$, 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

B. flaveſcens, elytris ad angulum acutum ſtriatis.

Loc. Habitat farinam.

ORDO SECUNDUS.

Caract. Ordin. II.

Tarſorum articuli duo.

LV. TRIPS. *Le Trips.*

Antennæ filiformes.
Os rimulâ longitudinali.
Tarſi veſiculoſi.

1. T. juniperina.

Le Trips à pointe.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{6}$ lig.

T. elytris albidis, corpore nigro, abdominali ſetâ.

Loc. Habitat cortices arbor. vetuſtas.

2. T. physapus. *bon*

Le Trips noir des fleurs.

Long. $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{10}$ lig.

T. elytris glaucis, corpore atro.

Loc. Habitat flores compositos.

3. T. fasciata. *bon*

Le Trips à bandes.

T. elytris albis nigrisque fasciis, corpore atro.

Loc. Idem.

ORDO TERTIUS.

Caract. Ordin. III.

Tarsorum articuli tres.

LVI. GRYLLUS. *Le Grillon.*

Antennæ filiformes.
Cauda biseta.
Ocelli tres.

1. G. grillo-talpa. *achetta gr. fabr.*

La Courtillière ou le Gaupe-Grillon.

Long. 18 lig. Larg. 4 lig.

G. pedibus anticis palmatis.

Loc. Habitat humum recentem, horticolis infestus.

2. G. domesticus.

Le Grillon.

Long. 1 pouce. Larg. 4 lig.

G. pedibus anticis simplicibus.

Loc. Habitat loca calida domorum & arva.

LVII. ACRYDIUM. *Le Criquet.*

Antennæ filiformes corpore dimidio breviores.

Ocelli tres.

1. A. cyaneum.

Le Criquet à aîles bleues.

Long. 1 pouce. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

A. elytris fuscis, alis subcœruleis.

Loc. Habitat arva sicca.

2. A. cœrulescens.

Le Criquet à aîles bleues & noires.

Long. 1 pouce. Larg. 3 lig.

A. elytris nebulosis, alis cœruleis extimo nigro.

Loc. Habitat prata.

3. A. stridulum. Gryllus Stridulus Fabr.

Le Criquet à aîles rouges.

Long. lig. Larg. lig.

A. elytris nebulosis, alis rubris extimo nigris.

Loc. Habitat vineas.

4. A. grossum. Gryllus Grossus Fabr.

Le Criquet ensanglanté.

Long. 5, 10, 11 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$, 3 lig.

A. femoribus sanguineis, alis subfuscis reticulatis.

Loc. Habitat arva.

5. A. bi-punctatum. bon

Le Criquet à capuchon.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

A. elytris nullis, thorace producto abdomini æquali.

Loc. Idem.

6. A. ſubulatum.

Le Criquet à corcelet allongé.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

A. elytris nullis, thorace producto abdomine longiore.

Loc. Habitat arva.

ORDO QUARTUS.

Caract. Ordin. IV.

Tarſorum articuli quatuor.

LVIII. LOCUSTA. *LA SAUTERELLE.*

Antennæ filiformes corpore longiores. Ocelli tres.

1. L. viridiſſima.

La Sauterelle à ſabre.

Long. 11 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

L. caudâ enſiferâ curvâ.

Loc. Habitat arva & prata.

2. L. vermivora. *L. viridissima fabr.*
La Sauterelle à coutelas.
Long. 22 lig. Larg. 3 lig.
L. caudâ enſiferâ rectâ.
Loc. Habitat arva & prata.

ORDO QUINTUS.

Caract. Ordin. V.

Tarſorum articuli quinque.

LIX. MANTES. *La Mante.*

Antennæ filiformes.

1. M. gongylodes. *m. oratoria*
La Mante.
Long. 2 pouces. Larg. 5, 6 lig.

Loc. Habitat agrum Aurelianenſem.

SECUNDA SECTIO INSECTORUM.

INSECTA HEMIPTERA.

Caracteres ſectionis.

Alæ ſuperiores elytris accedentes.
Os ſub thorace inflexum.

LX. CICADA. *LA CIGALE.*

Articuli tarſorum tres.
Antennæ capite breviores.
Ocelli duo.
Roſtrum inflexum.
Alæ quatuor, inferiores cruciatæ.

1. C. nervoſa.
La Cigale à aîles tranſparentes.
Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.
C. fuſca, alis aqueis fuſco maculatis; nervis punctatis.
Loc. Habitat plantas & gramina.

2. C. ſpumaria.
La Cigale bedeaude.
Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. fuſca, elytris faſciâ duplici interruptâ tranſverſâ albidâ.

Loc. Habitat prata & medicaginem.

3. C. lateralis. bou

La Cygale à bordure.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{5}$ lig.

C. nigra, elytrorum lateribus albis.

Loc. Idem.

4. C. membranacea.

La Cigale à aîles membraneuſes.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. fuſco-pallida, elytris membranaceis venoſis, ſcutello maculâ duplici triangulari.

Loc. Idem.

5. C. viridis. bou

La Cigale verte à tête panachée.

Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

C. elytris viridibus, capite flavo punctis nigris.

Loc. Idem.

6. C. ſanguinea. Cercopis sanguinolenta

La Cigale à taches rouges.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

C. nigra, elytris maculis ſex rubris.

Loc. Habitat prata & medicaginem; rarior.

7. C. gibboſa.

La Cigale boſſue.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

C. fuſco-viridis reticulata, alarum baſi dilatatâ.

Loc. Id. rara.

8. C. pallida.

La Cigale pâle.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. flavo-pallida, thorace punctis ſex impreſſis.

Varietas A. Cicada flavo-pallida, oculis nigricantibus.

B. Cicada flavo-pallida, dorſi lineâ longitudinali nigrâ.

C. Cicada flavo-pallida, thoracis poſticâ, ſcutelli anticâ parte, fuſcis.

Loc. Idem.

9. C. interrupta. bon

La Cigale jaune à raies noires obliques.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. elytris flavis, lineâ abruptâ duplici longitudinali nigrâ.

Loc. Idem.

10. C. regalis.

La Cigale à diadême.

Long. 2 ½ lig. Larg. 1 ¼ lig.

C. fuſca, capitis thoraciſque faſciâ tranſverſâ flavâ.

Loc. Idem.

11. C. torquata.

La Cigale à collier jaune.

Long. 2 ½ lig. Larg. 1 ⅓ lig.

C. fuſco-nebuloſa, ſcutelli cavitate rotundâ, thorace punctis luteis impreſſis tranſverſim poſitis.

Loc. Idem.

12. C. variegata.

La Cigale à pattes bigarées.

Long. 3 ½ lig. Larg. 1 ½ lig.

C. fuſco-nebuloſa, ſcutello tranſverſim ſulcato, tibiis poſticis, elytrorumque limbo è flavo fuſcoque variegatis.

Loc. Idem.

13. C. marginata.

La Cigale à tête & bordure jaune.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. fuſco-nebuloſa; capite, thoracis anticâ parte, elytrorumque limbo flavis.

Loc. Habitat prata & medicaginem.

14. C. venoſa.

La Cigale à veines blanches.

Lon. 1 $\frac{1}{2}$, 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. fuſco-nebuloſa punctata, nervis elytrorum albidis.

Loc. Idem.

15. C. nigra.

La Cigale noire.

Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. tota nigra.

Loc. Habitat caſtaneas.

16. C. faſciolata.

La Cigale noire à bandes jaunes ſur le corcelet.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. nigra, thorace elytriſque faſciâ croceâ.

Loc. Habitat prata.

7. C. aurita.

Le grand Diable.

Long. 7 lig. Larg. 2 lig.

C. thorace obtuſe bicorni.

Loc. Habitat prata; rariſſima.

18. C. cornuta.

Le petit Diable.

Long. 4 lig. Larg. 1 ½ lig.

C. thorace acute bicorni, pone producto.

Loc. Habitat in ſylvis filicem, cirſium, ſaltator.

19. C. infernalis.

Le demi-Diable.

Long. 2 lig. Larg. ⅔ lig.

C. thorace inermi pone producto.

Loc. Rar. in agro luteciano; in Campaniâ frequens.

20. C. ſtriata.

La Cigale rayée.

Long. 1 ½ lig. Larg. ⅔ lig.

C. elytris albido nigroque ſtriatis ad angulum acutum ſuturæ dorſalis.

Loc.

21. C. trifasciata.

La Cigale à 3 bandes brunes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. fusca, elytris albidis, fasciis tribus transversis fuscis.

Variet. A. Eadem elytris unicoloribus, thorace antice punctorum nigrorum fasciâ transversâ.

Loc.

22. C. transversalis.

La Cigale à deux bandes brunes.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. flava, elytrorum fasciis duabus transversis fuscis.

Loc. Habitat arbores.

23. C. cœca.

La Cigale jaune aux yeux noirs.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. flava compressa, oculis nigris.

Loc.

24. C. flammigera.

La Cigale flamboyante.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. flava, fasciâ duplici longitudinali rubrâ undulatâ.

Loc. Habitat domos.

5. C. carpini.

La Cigale verte à points noirs.

C. viridi-flava, elytris punctis tribus nigris, apice fuscis.

Loc. Habitat folia arborum.

6. C. geographica.

La Cigale géographie.

C. viridis, elytris maculis plurimis fuscis ovatis.

Loc. Idem.

7 C. ulmi. *fou*

La Cigale moucheron verte.

C. alis viridi-luteis apicibus nigrantibus deauratis.

Loc. Habitat folia ulmi.

8. C. rosæ. *fou*

La Cigale des charmilles.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

C. flava, alis albis apicibus membranaceis.

Loc. Habitat arbores & rosam.

* 29 C. nervoptera.

La Cigale à nervures.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. fusca, thoracis margine flavo; alis aqueis nervis fuscis.

Loc.

* 30. C. acephala.

La Cigale verte à tête renfoncée.

Long. 2, 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$, 1 lig.

C. tota viridis, capite brevi lato.

Loc.

* 31. C. tristis.

La Cigale à bandes blanches.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. nigro-fusca, fasciis quatuor transversis albis, mediâ interruptâ.

Loc.

* 32. C. porrecta.

La Cigale à tête allongée.

Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

C.

C. pallida, oculis nigris, capite antice producto acuto, thorace duplo longiori.

Loc.

33. C. dilatata.

La Cigale renflée.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

C. fusca, maculis irregularibus albis, elytrorum lateribus dilatatis.

Loc.

CICADA. (1)	TETIGONIA *nostras.*
LA CIGALE.	*LA PROCIGALE.*
Antennæ capite breviores, setaceæ, articulis quinque.	Antennæ capite breviores, articulis duobus globoso & setaceo.
Ocelli tres.	Ocelli duo.
Rostrum inflexum.	Rostrum inflexum.
Alæ quatuor laterales.	Alæ quatuor, inferiores cruciatæ.
Articuli tarsorum tres.	Articuli tarsorum tres.

(1) Adduntur hic caracteres *Cicadæ veræ* Gallo-provincialis, nostræ Cicadæ *Tetigonia* vocatæ oppositi.

Annumerantur duæ præcipuæ *Cicadæ veræ* ſpecies Gallo-provinciam habitantes, quæ in muſæis noſtris frequentiſſime aſſervantur.

1. *La Cigale à bordure jaune.*

C. fuſca, thoracis & ſcutellis margine flavo, alis nervoſis.

Loc. Habitat Gallo-provinciam.

2. *La Cigale panachée.*

C. fuſca, thorace ſcutelloque flavis, variegatis, alis nervoſo-punctatis.

Loc. Habitat Gallo-provinciam.

LXI. CIMEX. *La Punaise.*

Articuli tarſorum tres.
Antennæ capite longiores articulis quatuor vel quinque.
Roſtrum inflexum.
Alæ quatuor, ſuperiores ſemi-elytra.

FAMIL. I. *Antennarum articuli quatuor.*

1. C. lectularius. *acanthia lectuaria fabr.*
La Punaiſe des lits.

C. apterus.
Loc. Habitat lecta.

2. C. ſcutellatus. *C. scarabeoïdes fabr.*
La Punaiſe cuiraſſe.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.
C. hemiſphericus nigro-æneus, ſcutello totum abdomen tegente, ampliſſimo.
Loc. Habitat viciam multifloram fontis Bellaquæi.

3. C. teſtudinarius. *C. lynceus. fabr. pentatoma morio oliv.*
La Punaiſe tortue brune.

Long. 3 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.
C. fuſcus, ſcutello totum abdomen tegente, ampliſſimo.
Loc. Habitat ſylvas.

4. C. perſonatus. *reduvius personatus fabr.*
La Punaiſe mouche.

Long. 7, 8 lig. Larg. 2 lig.

C. oblongus niger, roſtro arcuato, antennis apice capillaceis, elytris membranaceis.

Loc. Habitat domos.

5. C. annulatus.

La Punaiſe mouche à pattes rouges.

Long. 5 ½ lig. Larg. 1 ½ lig.

C. oblongus niger, roſtro arcuato, elytris membranaceis, pedibus abdomineque rubro nigroque variegatis.

Loc. Habitat ſylvas.

6. C. bidentatus.

La Punaiſe porte-épine.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

C. longus, fuſcus, roſtro arcuato, thorace ſubtùs antice bidentato.

Loc. Habitat plantas, rarus.

7. C. pellucidus.

La Punaiſe brune à étuis tranſparens.

Long. 1 lig. Larg. ½ lig.

C. oblongus, fuſco-niger, pedibus pallidis, elytris pellucidis apice fuſco.

Loc.

8. C. boopis.

La Punaiſe marbrée aux gros yeux.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, luteo nigroque marmoratus, oculis craſſiſſimis.

Loc.

9. C. leviatan.

La Punaiſe leviatan.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. planus, fuſcus, thorace elytriſque alatis, capite antice cornuto, antennis brevibus craſſis.

Loc.

10. C. eryngii.

La Punaiſe rouge à taches triangulaires.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

C. oblongus niger, thorace elytriſque rubris, elytrorum extremo maculâ triangulari nigrâ.

Loc. Habitat folia Eryngii.

11. C. apterus. lygæus apt. fabr.

La Punaiſe rouge des jardins.

Long. 3 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, rubro nigroque variegatus, elytris maculâ rotundâ, punctuloque nigris.

Loc. Habitat arborum infimam partem, multiplex.

12. C. hyoſciami. Lygæus hyos. ~~lygæus equestris fabr.~~

La Punaiſe rouge à croix de chevalier.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. oblongus, rubro nigroque variegatus, ſcutelli nigri apice rubro.

Loc. Habitat folia hyoſciami.

13. C. ſtellifer.

La Punaiſe rouge à baſe des aîles blanches.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus, rubro nigroque variegatus, centro crucis albo.

Loc. Habitat hortos.

14. C. equestris. lygaeus eq. fabr

La Punaise rouge à bandes noires & taches blanches.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

C. oblongus, rubro nigroque variegatus, elytris fasciâ nigrâ, alis fuscis maculis albis.

Loc.

15. C. nobilis.

La Punaise rouge à point noir & taches blanches.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

C. oblongus, rubro nigroque variegatus, elytris punctulo nigro, alis fuscis maculis albis.

Loc.

16. C. tessellatus.

La Punaise rouge à damier.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, thorace nigro lineis tribus rubris, elytris rubro nigroque tessellatis, limbis nigris.

Loc, In Campaniâ multiplex.

17. C. croceus. Capsus Danicus

La Punaise safranée.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. croceus, elytrorum apice rubro, alis nigris, antennarum articulo secundo clavato.

Variet. A. Cimex niger, pedibus rufis, antennarum articulo secundo clavato.

B. Cimex niger, capite, thorace pedibusque rufis, antennarum articulo secundo clavato.

Loc.

18. C. gothicus. Lygaeus Goth. Fabr.

La Punaise rougeâtre à antennes incarnat.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

C. oblongus, fusco-ruber, elytris apice sanguineis, antennarum articulo secundo longissimo incarnato.

Loc.

19. C. variegatus.

La Punaise à brocard jaune.

Long. 4 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. 2 lig.

C. oblongus niger, thoracis lateribus ſcutelloque flavis, elytris antennis pedibuſque flavo-variegatis.

Loc.

20. C. marginatus.
La Punaiſe à aîlerons.
Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.
C. oblongus, fuſcus, immaculatus, thorace utrinque obtuſe angulato, capite prope antennas externe denticulato.

Loc.

21. C. roſtratus.
La Punaiſe à bec.
Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.
C. oblongus, fuſcus, immaculatus, thorace utrinque obtuſe angulato, capite inter antennas bidentato.

Loc.

22. C. acutus.
La Punaiſe brune à corcelet pointu & liſſe.
Long. 9 lig. Larg. 2 lig.

C. oblongus rufus, immaculatus, thorace utrinque acute angulato, margine lævi.

Loc.

23. C. fimbriatus.

La Punaise brune à corcelet pointu & épineux.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, rufus, immaculatus, thorace utrinque acute angulato, margine ſpinoſo.

Loc.

24. C. chelifer. { phymata crassipes latr / Syrtis crassipes fabr.

La Punaiſe à pattes de crabes.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus fuſcus, pedibus primi paris cheliformibus.

Loc. Habitat ſylvas.

25. C. ſabuloſus.

La Punaiſe à nervures pointillées.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus, viridi-fuſcus, elytrorum nervis punctatis, antennis rufis.

Loc.

26. C. monilis.

La Punaiſe brune à antennes & pattes panachées.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. oblongus, fuſcus, antennis, pedibus abdominiſque marginibus nigro luteoque variegatis.

Loc.

27. C. cathariæ.

La Punaiſe griſe panachée de noir.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus, cinereo nigroque variegatus, alis glaucis.

Loc. Habitat labiatas, præcipue cathariam.

28. C. crucifer. Lygaeus pini

La Punaiſe griſe porte-croix.

C. oblongus niger, thorace poſtice cinereo, elytris cinereis, maculâ nigrâ, aliſque nigris.

Loc. Habitat arida loca.

29. C. apicaris.

La Punaiſe brune à pointe des étuis blanche.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus niger, thorace poſtice cinereo, elytris fuſcis apice albo.

Loc.

30. C. femoralis.

La Punaiſe verdâtre à cuiſſes pointillées.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, pallide-virideſcens, femoribus nigro-punctatis.

Loc.

31. C. conſtellaris.

La Punaiſe noire à taches fauves & aîles panachées.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus, niger, elytris antice rufis, alis albo maculatis.

Loc. Habitat cortices arborum.

32. C. fuligineus.

La Punaiſe brune ponctuée.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, atro-fuſcus punctatus, alis venoſis.

Loc.

33. C. pratenſis. Lygeus pr. fabr.

La Punaiſe gris-fauve porte-cœur.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. griſeus, ſcutello maculâ cordatâ flavâ, elytris apice puncto fuſco.

Loc.

34. C. campeſtris. Lygeus Cam. fabr.

La Punaiſe verte porte-cœur.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus, viridis, ſcutello maculâ cordatâ viridi, elytris maculâ ferrugineâ.

Varietas A. Cimex oblongus, fuſco-luteus, ſcutello maculâ cordatâ viridi, elytris faſciâ duplici fuſcâ.

Loc. Habitat flores.

35. C. cordatus.

La Punaiſe porte-cœur à taches jaunes au bout des étuis.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, fuſco-ruber, ſcutello maculâ cordatâ luteâ, elytris apice luteis.

Loc.

36. C. porrectus.

La Punaiſe jaune à antennes droites.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus, flaveſcens, thorace faſciis duabus nigris, ſcutello maculis flavis, antennis antice porrectis.

Loc.

37. C. ternatus.

La Punaiſe à trois taches.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. oblongus niger, thorace faſciis tribus flavis, ſcutello elytrorumque apice maculis luteis.

Loc.

8. C. ſtriatus. *Miris striata Fabr.*

La Punaiſe rayée de jaune & de noir.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus niger, thorace faſciis tribus flavis, ſcutello nigro, elytris flavis apice fulvo.

Loc.

9. C. nigro-punctatus.

La Punaiſe jaune à corcelet tacheté & étuis verts.

Larg. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus viridi-flavus, capite thoraceque nigro maculatis, elytris viridibus.

Loc.

10. C. virideſcens.

La Punaiſe verdâtre à tache brune.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus viridis, elytrorum maculâ fuſcâ.

Loc.

41. C. albinus.

La Punaiſe verdâtre à taches blanches.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus viridis, elytrorum apice albido, ſcutello lineolâ fuſcâ.

Loc.

42. C. elongatus.

La Punaiſe verdâtre à bande brune.

Long. 3 ½ lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus viridis, thorace ſcutelloque lineis quatuor nigris, elytris interne fuſcis.

Loc.

43. C. ærugineus. Miris pabulinus Fabr.

La Punaiſe verte aux yeux bruns.

Long. 3 lig. Larg. 1 ¼ lig.

C. oblongus, totus viridis, oculis fuſcis.

Loc.

44. C. cruentatus.

La Punaiſe verte enſanglantée.

Long. 3 ¼ lig. Larg. 1 ½ lig.

C. oblongus viridis, elytrorum lineis sanguineis.

Loc.

5. C. ruficornis.

La Punaise verte à antennes fauves.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus, pallido-viridis, antennis setaceis rufis.

Loc.

6. C. lateralis.

La Punaise blanchâtre aux yeux noirs.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. longus albidus, oculis nigris.

Loc.

7. C. recticornis.

La Punaise verte à antennes droites.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. longus totus viridis antennis antice porrectis.

Loc.

48. C. ſponſalis.

La Punaiſe pâle à tache noire ſur l'écuſſon.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. longus, albidus, oculis fuſcis ſcutello maculâ nigrâ.

Loc.

49. C. conicus.

La Punaiſe griſe conique.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

C. oblongus conicus, fuſco - cinereus, oculis prominentibus, elytris nervoſis.

Loc. Habitat hortos.

50. C. flammeus.

La Punaiſe noire à pointe des étuis rouges.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. oblongus niger, capite, elytrorum apice, genubuſque ferrugineo-rubris.

Loc.

.. C. rolandri. Lygeus Rol. fabr.

La Punaise couleur de suie à aîles jaunes.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

C. oblongus atro-fuscus, alarum maculâ flavâ.

Loc.

. C. plæsſæus.

La Punaise noire à pattes panachées.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus niger, pedibus viridi nigroque variegatis.

Loc.

3. C. atramentarius.

La Punaise toute noire.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus totus ater, alis atris.

Loc.

4. C. ater. lygeus ater fabr.

La Punaise à grosses antennes terminées par un fil.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. oblongus ater, antennis ſetâ terminatis.

Loc. Habitat ſylvas.

55. C. carthuſianus.

La Punaiſe chartreuſe.

Long. 2 lig. Larg $\frac{3}{4}$ lig.

C. oblongus, infra niger, ſupra albo-lacteus, antennis craſſis antice porrectis, capite pedibus antenniſque nigris.

Loc. Habitat Eryngium.

56. C. clavicornis. acanthia clav. fabr.

La Punaiſe tigre.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. ex albo fuſcoque cinereus, elytrorum thoraciſque margine punctato antennis ſubclavatis.

Loc. Larva flores chamædrys diſtendit.

57. C. appendiceus. Tingis cristata fabr.

La Punaiſe à fraiſe antique.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

C. antennis clavatis, thorace elytriſque corpore multo latioribus diaphanis, reticulatis, faſciâ duplici tranſverſâ.

Loc.

8. C. vagabundus.

La Punaise culiciforme.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

C. linearis pedibus anticis breviſſimis, cœteris antenniſque filiformibus longiſſimis, albo fuſcoque variis.

Loc. Habitat arbores.

59. C. lacuſtris.

La Punaise nayade.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{4}{5}$ lig.

C. linearis ſuprà niger, pedibus anticis breviſſimis.

Loc. Habitat aquarum ſtagnantium ſuperficiem.

60. C. ſtagnorum.

La Punaise aiguille.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

C. linearis nigricans compreſſus, capite cylindraceo, pedibus anticis breviſſimis.

Loc. Habitat ſtagna.

FAMIL. II. *Antennarum articuli quinque.* Pentatoma fabr.

61. C. juniperinus. bon fabr.

La Punaiſe verte.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

C. ſubrotundus viridis.

Loc. Fetidiſſimus, habitat groſſulariam.

* 62. C. tridentatus.

La Punaiſe à trois cornes.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. planus, depreſſus, atro-fuſcus, capite antice tridentato, thoracis margine ſerrato, elytris parvis.

Loc.

63. C. carminaris.

La Punaiſe verte lavée de rouge

Long. 6 lig. Larg. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

C. ovatus, thorace obtuſe angulato, è viridi rubroque nebuloſus.

Loc.

* 64. C. biclavatus.

La Punaiſe à double maſſe.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. oblongus lividus, antennarum articulo primo & extremo clavatis.

Loc.

5. C. pungens. au C. haemorrhoidalis! fabr.

La Punaiſe verte à pointes du corcelet rouges.

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

C. ſubovatus viridis, angulis thoracis acutis rubris apice nigris, abdomine ſubtus acuto.

Loc.

6. C. baccarum. bon.

La Punaiſe brune à antennes & bords panachés.

Long. 6 lig. Larg. 3 lig.

C. fuſcus, antennis abdominiſque margine nigro croceoque variegatis.

Loc. Habitat groſſulariam, fetidus.

67. C. annularis.

La Punaiſe brune à pattes panachées.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. fuſcus, pedibus abdominiſque limbo luteo fuſco variegatis.

Loc.

68. C. ſecalinus. (C. hottentotta fabr.

La Punaiſe porte-chappe brune.

Long. 5 ½ lig. Larg. 3 ½ lig.

C. nigro-ferrugineus, ſcutello ad anum uſque producto.

Loc. Habitat ſecale & gramina.

69. C. cappatus.

La Punaiſe porte-chappe noire.

Long. 5 ½ lig. Larg. 3 lig.

C. ater punctatus, ſcutello ad anum uſque producto.

Loc. Habitat domos.

70. C. italicus. { C. nigro-lineatus fabr. pentatoma nig. oliv.

La Punaiſe ſiamoiſe.

Long. 4 lig. Larg. 3 lig.

C. rotundatus ruber, ſupra faſciis longitudinalibus, infra punctis nigris, ſcutello amplo totum fere abdomen tegente.

Loc.

71.

1. C. ornatus. *bon*

La Punaise rouge du chou.

Long. 4 ½ lig. Larg. 3 lig.

C. rotundato-ovatus, nigro rubroque variegatus, capite alisque nigris.

Loc. Habitat brassicam.

2. C. carbonarius. *C. tristis*

La Punaise noire.

Long. 4 lig. Larg. 1 ⅔ lig.

C. ovatus, totus niger, alis pallidis.

Loc.

3. C. fumosus.

La Punaise brune luisante.

Long. 1 ½ lig. Larg. 1 lig.

C. ovatus, fusco-niger, alis pallidis.

Loc.

4. C. limbosus.

La Punaise noire à bordure blanche.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

C. ovatus niger, elytrorum limbo exteriore albo.

Loc.

75. C. bicolor.

La Punaise noire à quatre taches blanches.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

C. ovatus niger, thoracis lateribus, elytrorumque maculis quatuor albis.

Loc.

76. C. oleraceus.

La Punaise verte à raies & taches rouges ou blanches.

Long. 3 lig. Larg. 2 lig.

C. ovatus cœrulescenti-æneus, thorace lineolâ, scutelli apice, elytrisque puncto albo rubrove.

Loc.

77. C. cœruleus.

La Punaise verte bleuâtre.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. ovatus, viridi-cœruleus æneus.

Loc.

78. C. saltator.

La Punaise sauteuse.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

C. rotundato-ovatus niger, capite genubusque ferrugineis, pedibus saltatoriis.

Loc.

79. C. acuminatus. bou.

La Punaise à tête allongée.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. ovatus, antice attenuatus, fasciis longitudinalibus cinereo-exalbidis, antennis extremo rufis.

Loc.

LXII. NAUCORIS. *LA NAUCORE.*

Articuli tarsorum duo.

Antennæ brevissimæ infra oculos positæ.

Rostrum inflexum.

Alæ quatuor cruciatæ.

Pedes sex, primi cheliformes.

Scutellum præsens.

1. N. cimicoides. bou

La Naucore.

Long. 4, 5 lig. Larg. 3 lig.

Loc. Habitat aquam.

LXIII. NOTONECTA. *LA PUNAISE A AVIRONS.*

Articuli tarſorum duo.
Antennæ breviſſimæ infra oculos poſitæ.
Roſtrum inflexum.
Alæ quatuor cruciatæ.
Pedes ſex natatorii.
Scutellum præſens.

1. N. glauca.

La grande Punaiſe à avirons.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

N. capite luteo, elytris fuſco croceoque variegatis, ſcutello atro.

Loc. Habitat aquam.

2. N. minutiſſima.

La petite Punaiſe à avirons.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

N. cinerea anelytra.

Loc. Idem.

LXIV. CORIXA. *LA CORISE.*

Articulus tarſorum unicus.

Antennæ breviſſimæ infra oculos poſitæ.

Roſtrum inflexum.

Alæ quatuor cruciatæ.

Pedes ſex, primi cheliformes, poſtici natatorii.

Scutellum nullum.

1. C. ſtriata. bon sigara striata fabr. Walk.

La Coriſe.

Long. 5 ½ lig. Larg. 2 lig.

Loc. Habitat rivulos & ſtagna, fœtidiſſima.

LXV. HEPA. *LE SCORPION AQUATIQUE.*

Articulus tarſorum unicus.

Antennæ cheliformes.

Roſtrum inflexum.

Alæ quatuor cruciatæ.

Pedes quatuor.

1. H. linearis. Ranatra linearis Fabr.

Le Scorpion aquatique à corps allongé.

Long. 13 lig. Larg. 1 lig.

H. corpore lineari.

Loc. Habitat aquam ſtagnantem.

2. H. cinerea. Nepa Cin. Fabr.

Le Scorpion aquatique à corps ovále.

Long. 8, 9 lig. Larg. 3 lig.

H. corpore ovato.

Loc. Idem.

LXVI. PSYLLA. *La Psylle.*

Articuli tarſorum duo.
Roſtrum pectorale inter primum & ſecundum par femorum.
Alæ quatuor laterales.
Pedes ſaltatorii.
Abdomen acuminatum.
Ocelli tres.

1. P. ficûs.

La Pſylle du figuier.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

P. fuſca, antennis craſſis piloſis, alarum nervis fuſcis.

2. P. chermes buxi.

La Pſylle du buis.

Long. 2 lig. Larg. ½ lig.

P. viridis, antennis ſetaceis, alis fuſco-flaveſcentibus.

3. P. alni. bon

La Pſylle de l'aune.

P. viridis, antennis ſetaceis, alis aqueis.

4. P. fraxini.

La Pſylle du frêne.

Long. 1 ⅔ lig. Larg. ½ lig.

P. nigro luteoque variegata; alarum oris in apice fuſcis.

5. P. abietis.

La Pſylle du ſapin.

Long. 1 ⅔ lig. Larg. ½ lig.

P. pallidè flaveſcens, oculis fuſcis, alis aqueis.

6. P. pini.

La Psylle du pin.

Long. Larg.

P. lanata pini.

7. P. lapidum, seu lichenis.

La Psylle des pierres.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

P. fusca, nigro punctata, antennis corpore longioribus, alis nervosis fusco maculis.

8. P. fusca.

La Psylle brune à antennes sétacées & aîles nerveuses.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

P. fusca, antennis setaceis lævibus, alis nervosis.

9. P. rubra.

La Psylle rouge.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

P. rubra, alis nervosis.

Loc.

XVII. APHIS. *Le Puceron.*

Articulus tarſorum unicus.
Roſtrum inflexum.
Alæ quatuor erectæ vel nullæ.
Pedes ambulatorii.
Abdomen bicorne.

1. A. ulmi.
Le Puceron de l'orme.
A. ulmi.

2. A. fraxini.
Le Puceron du frêne.
A. fraxini, nigro viridique variegata.

3. A. ſambuci.
Le Puceron du ſureau.
A. ſambuci tota cœruleo-atra.

4. A. roboris.
Le Puceron du chêne.
A. quercûs atro-fuſca.

5. A. aceris.
Le Puceron de l'érable.
A. aceris, viridis, maculis nigris.

6. A. tiliæ.

Le Puceron du tilleul.

A. tiliæ, alis, antennis, pedibusque nigro punctatis.

7. A. betulæ.

Le Puceron du bouleau.

A. betulæ, marginibus incisurarum abdominis punctis nigris.

8. A. tanaceti.

Le Puceron de la tanaisie.

A. tanaceti fusca, abdomine nigro-cœruleo antice viridi.

9. A. acetosæ.

Le Puceron de l'oseille.

A. acetosæ, atra fasciâ transversâ viridi.

10. A. padi.

Le Puceron du prunier.

A. pruni.

A. burſaria.

Le Puceron du peuplier noir.

A. populi nigra lanata.

A. fagi.

Le Puceron du hêtre.

A. fagi lanata.

A. lactucæ.

Le Puceron du laiteron.

A. ſonchi caudata.

A. quercûs.

Le Puceron des écorces à longues trompes.

A. fuſca proboſcide corpore triplo longiore.

XVIII. CHERMES *Le Kermès.*

Roſtrum pectorale inter primum & ſecundum par femorum.

Alæ duæ maſculis, erectæ.

Abdomen appendicibus ſetaceis.

Fæmina folliculi formam induens.

1. C. polonicus.
Le Kermès des racines.
C. radicum purpureus.
Loc. Habitat polygoni *Knawel* radices.

2. C. heſperidum.
Le Kermès des orangers.
C. heſperidum.

3. C. clematitis.
Le Kermès de la clematite.
C. clematitis oblongus.

4. C. perſicæ.
Le Kermès oblong du pêcher.
C. perſicæ oblongus.

5. C. amygdali.
Le Kermès rond du pêcher.
C. perſicæ rotundus.

6. C. vitis.
Le Kermès de la vigne.
C. vitis oblongus.

. C. abietis.

Le Kermès du ſapin.

C. abietis rotundus.

. C. ulmi.

Le Kermès de l'orme.

C. ulmi rotundus.

9. C. tiliæ.

Le Kermès du tilleul.

C. tiliæ hemiſphæricus.

. C. coryli.

Le Kermès du coudrier.

C. coryli hemiſphæricus.

. C. quercûs.

Le Kermès rond & brun du chêne.

C. quercûs rotundus fuſcus.

. C. roboris.

Le Kermès du chêne rond & de couleur panachée.

C. quercûs rotundus, ex albo flaveſcente nigroque variegatus.

13. C. reniformis.
Le Kermès reniforme du chêne.
C. quercûs reniformis.

14. C. ſericeus.
Le Kermès ovale & cotonneux du chêne.
C. quercûs oblongus ſerico albo.

15. C. carpini.
Le Kermès cotonneux du charme
C. carpini ſerico albo.

16. C. meſpili.
Le Kermès cotonneux du neſlier.
C. meſpili ſerico albo.

17. C. linearis.
Le Kermès en écaille de moule
C. arborum linearis.

18. C. aceris.
Le Kermès ovale de l'érable.
C. aceris ovatus.

LXIX. COCCUS. *LA COCHENILLE.*

Roſtrum pectorale inter primum & ſecundum par femorum.
Alæ duæ maſculis, erectæ.
Abdomen appendicibus ſetaceis.
Fæmina inſecti formam ſervans.

1. C. adonidum. bon
La Cochenille des ſerres.
C. adonidum, corpore roſeo, farinaceo, alis ſetiſque niveis.

2. C. phalaridis. ~~[illegible]~~ bon
La Cochenille du chien-dent.
C. graminis corpore roſeo.

3. C. ulmi.
La Cochenille de l'orme.
C. ulmi, corpore fuſco, ſerico albo.

Finis primæ Partis.

ENTOMOLOGIA PARISIENSIS;

SIVE

CATALOGUS Insectorum quæ in Agro Parisiensi reperiuntur;

SECUNDUM methodum Geoffræanam in sectiones, genera & species distributus:

CUI addita sunt nomina trivialia & fere trecentæ novæ Species.

Edente A. F. DE FOURCROY, Doct. Med. Parif.; è Reg. Scientiar. Academ.; è Reg. Soc. Medic. &c.

PARS SECUNDA.

PARISIIS,

VIA ET ÆDIBUS SERPENTINEIS.

M. DCC. LXXXV.

SUB PRIVILEGIO ACADEMIÆ.

ENTOMOLOGIA PARISIENSIS.

SECTIO TERTIA.
CLASSIS INSECTORUM.

Insecta tetraptera alis farinaceis.

LXX. PAPILIO. *Le Papillon.*

Antennæ clavatæ.

Chryſalis nuda.

FAMIL. I. *Tetrapi.*

§. I.

Erucis ſpinoſis, alis anguloſis.

1. P. antiopa.

Le Morio.

Longueur 1 $\frac{1}{2}$ pouces. Largeur 3 pouces.

P. alis nigris, margine poſtico albido.

Locus. Larva habitat ſalicem.

2. P. jo.

Le Paon du jour, ou l'œil du Paon.

Long. 13 lig. Larg. 2 ½ pouc.

P. alis fulvis nigro maculatis, omnibus ocello cœruleo variegato.

Loc. Larva habitat urticam majorem.

3. P. polychloros.

La grande Tortue.

Long. 15 lig. Larg. 2 pouc. 4 lig.

P. alis fulvis nigro maculatis, primariis punctis quatuor nigris.

Loc. Larva habitat ulmum.

4. P. urticæ.

La petite Tortue.

Long. 11 lig. Larg. 2 pouc.

P. alis fulvis, nigro maculatis, primariis punctis tribus nigris.

Loc. Larva habitat urticæ majoris folia.

5. P. G album.

Le Gamma ou Robert-le-Diable.

Long. 10 lig. Larg. 22 lig.

P. alis laceris fulvis nigro maculatis, ſecundariis ſubtus G albo notatis.

Loc. Larva habitat upulum & groſſulariam.

6. P. atalanta.

Le Vulcain.

Long. 13 lig. Larg. 2 ½ pouc.

P. alis nigris albo maculatis, omnibus faſciâ arcuatâ coccineâ.

Loc. Larva habitat urticam.

7. P. cardui.

La Belle-dame.

Long. 1 pouc. Larg. 2 pouc. 5 lig.

P. alis fulvis albo nigroque variegatis, ſecundariis ocellis quinque.

Loc. Larva habitat carduum & cirſium.

§. II.

Erucis ſpinoſis, alis rotundatis.

8. P. paphia.

Le Tabac d'Eſpagne.

Long. 15 lig. Larg. 1 pouc. 7 lig.

P. alis dentatis fulvis nigro maculatis, ſubtus lineis tranſverſis argenteis.

Loc. Habitat ſylvas; larva o.

9. P. aglaia. bon

Le grand Nacré.

Long. 1 pouc. Larg. 2 pouc. 3 lig.

P. alis dentatis fulvis nigro maculatis, ſubtus maculis 21 argenteis.

Loc. Idem.

10. P. lathonia. bon

Le petit Nacré.

Long. 10 lig. Larg. 2 pouc.

P. alis dentatis fulvis nigro maculatis, ſubtus maculis 37 argenteis.

Loc. Idem.

11. P. euphroſine. bon

Le Collier argenté.

Long. 7 ½ lig. Larg. 18 lig.

P. alis dentatis fulvis nigro maculatis, ſubtus maculis 9 argenteis.

Loc. Idem.

12. P. cinxia. *bon. on a fait des 4 Var. A, B, C, D 4 Especes*

Le Damier.

Long. 6 lig. Larg. 18 lig.

P. alis dentatis fulvis nigro variegatis, ſubtus faſciis tribus flavis.

Varietas A. Papilio alis dentatis fulvis nigro maculatis, ſubtus faſciis tribus flavis. *P. cinxia*

B. Papilio alis dentatis fulvis nigro reticulatis, ſubtus faſciis tribus flavis. *P. athalia*

C. Papilio alis dentatis fulvis nigro reticulatis, & punctatis, ſubtus faſciis tribus flavis. *P. delia*

D. Papilio alis dentatis fulvis nigro reticulatis & punctatis, utrinque faſciis tribus flavis. *P. artemis*

Loc. Habitat ſylvas: larva o.

§. III.

chenilles non epineuses; pieds ant. courts, mais point en palatine

Erucis non ſpinoſis, pedibus anticis breviſſimis collare non efficientibus.

13. P. ſilene. p. hermione

Silene.

Long. 14 lig. Larg. 2 pouc. 3 lig.

P. alis rotundatis dentatis nigro-fuſcis, omnibus faſciâ albidâ, primariis ocello duplici, ſecundariis unico.

Loc. Habitat ſylvas; larva o.

14. P. hyperantus. bia

Le Triſtan.

Long. 9 lig. Larg. 18 lig.

P. alis rotundatis fuſcis, ſubtus primariis ocello triplici, inferioribus quintuplici.

Loc. Idem.

15. C. ſaltator. P. dejanira

La Bacchante.

Long. 10 lig. Larg. 13 lig.

P. alis rotundatis fuſcis, ſingulis ſubtus ocellis quinque & limbo pallidiore.

Loc. In ſylvis undèquaque volitat; larva o.

6. P. ægeria.

Le Tircis.

Long. 8 lig. Larg. 20 lig.

P. alis rotundatis dentatis fuſcis, fulvo maculatis, primariis ocello unico, ſecundariis ſuperne quadrupli.

Loc. Habitat ſylvas; larva o.

7. P. jurtina. P. janira v. α

Le Corydon.

Long. 9 lig. Larg. 21 lig.

P. alis rotundatis fuſcis, primariis ſubtus fulvis, ocello unico.

Loc. Idem.

8. P. mirtyllus. P. janira v. β

Le Mirtil.

Long. 1 pouc. Larg. 2 pouc.

P. alis rotundatis dentatis ſupra fuſcis, primariis maculâ fulvâ, infra è fulvo & fuſco undulatis, primoribus utrinque ocello.

Loc. Idem.

19. P. mœra. P. magna

Le Satyre.

Long. 11 lig. Larg. 2 pouc.

P. alis rotundatis fulvo fuſcoque nebuloſis; primariis ſeſqui-ocello, ſecundariis ſuprà tribus, infrà ſeptem ocellis.

Loc. Habitat ſylvas, hortos; larva gramen Poa dictum.

20. P. amaryllis.

L'Amarylis.

Long. 7 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 17 lig.

P. alis rotundatis fulvis oris fuſcis, primariis ocello duplici continuo, ſecundariis duobus, infrà fuſco cinereoque nebuloſis.

Loc. Habitat ſylvas; larva o.

21. P. pamphylus.

Le Procris.

Long. 5 lig. Larg. 1 pouc.

P. alis rotundatis fulvis, oris fuſcis, primariis ſubtus ocello unico, ſecundariis ſubtus albo cinereoque variegatis.

Loc. Habitat erucas; larva ſocialis gramen filo intricato obveſtit.

22.

22. P. cephalus. P. arcanius

Le Céphale.

Long. 7 lig. Larg. 17 lig.

P. alis rotundatis, ſuperioribus fulvis oris fuſcis, ſubtus ocello unico; ſecundariis ſuprà fuſcis, infrà cinereis, faſciâ albâ ocelliſque quinis.

Loc. Habitat ſylvas; larva o.

FAMIL. II. *Hexapi pedibus ſex unguiculatis, chryſalide horiſontali in medio filo ſuſpenſâ.* les Chevaliers

§. I.

Caudiferi majores.

3. P. machaon. bon

Le grand Papillon à queue de fenouil.

Long. 28 lig. Larg. 3 pouc.

P. alis flavo nigroque variegatis, ſecundariis angulo ſubulato maculâque fulvâ.

Loc. Habitat ſylvas; larva fœniculum & umbelliferas.

24. P. flammæus. *P. podalyrius*

Le Flambé.

Long. 18 lig. Larg. 3 pouc. 4 lig.

P. alis pallidè flavis, rivulis tranſverſis nigris, ſecundariis angulo ſubulato maculâque croceâ.

Loc. Habitat ſylvas.

§. II.

Caudiferi minores.

25. P. piſorum. *hesperia boetica*

Le Porte-queue bleu ſtrié.

Long. 7 lig. Larg. 15 lig.

P. ſuprà cœruleus, ſubtus lineis undulatis fuſcis & albicantibus ſtriatus, alis ſecundariis infrà faſcià albâ, maculâ duplici, nigro-auratâ, & in imo caudatis.

Loc. Habitat ſylvas; larva coluteam, piſos, legumina.

26. P. quercûs. *bon*

Le Porte-queue bleu à une bande blanche.

Long. 7 lig. Larg. 15 lig.

P. ſupra cœruleus ſubtus fuſcus, lineâ undulatâ tranſverſâ albicante, alis ſecundariis infrà maculâ duplici fulvâ, & in imo caudatis.

Loc. Habitat ſylvas, larva quercûs folia.

27. P. betulæ.

Le Porte-queue fauve à deux bandes blanches.

Long. 9 lig. Larg. 17 lig.

P. ſupra fuſcus maculâ flavâ, ſubtus fulvus lineâ duplici tranſversâ albidâ, alis ſecundariis in imo caudatis.

Loc. Habitat ſylvas, larva betulam.

28. P. pruni.

Le Porte-queue brun à deux bandes de taches blanches.

Long. 7 lig. Larg. 15 lig.

P. fuſcus, maculâ fulvâ, ſubtus faſciâ duplici tranſverſâ macularum albicantium, alis ſecundariis lunularum ferrugineearum ſerie & in imo caudatis.

Varietas A. Papilio fuſcus, ſupra puncto albido, ſubtus lineâ tranſverſâ albâ, alis ſecundariis margine fulvo angulato, & in imo caudatis.

Loc. Larva habitat prunum, ulmum.

§. III.

Ocelliferi. hespenies

29. P. jris. bon

Le Mars.

Long. 14 lig. Larg. 2 pouc. 10 lig.

P. alis ſubangulatis, ſupra nigro violaceis; albo faſciatis, ſubtus fulvo, fuſco albidoque variis, ſingulis ocello nigro cœruleo.

Loc. Habitat hortos.

30. P. argus. bon

L'Argus bleu.

Long. 6 lig. Larg. 14 lig.

P. alis rotundatis integerrimis cœruleis, ſubtus ocellis numeroſis.

Loc. Habitat prata, larva frangulam.

31. P. ſemi-argus.

Le Demi-Argus.

Long. 5 lig. Larg. 14 lig.

P. alis rotundatis integerrimis cœruleis; ſubtus ocellorum faſciâ ſolitariâ.

Loc. Habitat prata, larva frangulam.

32. P. fuſciolus. hesperia argus

L'Argus brun.

Long. 6 lig. Larg. 14 lig.

P. alis rotundatis integerrimis nigro-fuſcis, faſciâ marginali fulvâ, ſubtus cinereis ocellis numeroſis.

Loc. Id. rarior.

33. P. rubi. hesperia phoeas

L'Argus myope.

Long. 6 lig. Larg. 13 lig.

P. alis rotundatis integerrimis nigro fuſcis fulvo maculatis, ſubtus ocellis numeroſis.

Loc. Id. rarior; larva habitat rubum.

34. P. cæcus. hesperia rubi

L'Argus vert, ou l'Argus aveugle.

Long. 6 lig. Larg. 14 lig.

P. alis rotundatis integerrimis, ſubtus viridibus im̃maculatis.

Loc. Idem.

35. P. virgaureæ. hesperia Virga aureæ
Le Bronzé. ou plutot hesp. phlaeas?

Long. 5 lig. Larg. 13 lig.

P. alis rotundatis fulvis, utrinque punctis nigris.

Loc. Habitat prata.

36. P. ſpeculifer. hesperia aracinthus
Le Miroir.

Long. 6 lig. Larg. 15 lig.

P. nigro-fuſcus nitens, alis ſubtus limbo dentato fulvo, ſecundariis maculis duodecim albis.

Loc. Habitat ſylvas.

§. IV. hesperies

Divaricati.

37. P. divaricatus. hesperia Comma
La Bande noire.

Long. 5 lig. Larg. 1 pouc.

P. alis divaricatis fulvis, limbo nerviſque nigris, primariis maculâ oblongâ nigrâ.

Loc. Habitat prata.

38. P. malvæ. bon

Le Plein-chant.

Long. 5 lig. Larg. 14 lig.

P. alis divaricatis denticulatis nigris, albo punctatis.

Loc. Larva habitat carduum fullonum & malvam.

39. P. tages. hesperia tages

Le Papillon griſette.

Long. 5 lig. Larg. 1 pouc.

P. alis divaricatis cinereis, punctorum alborum ſerie duplici tranſverſâ.

Loc. Idem.

§. V. papillons Danaïde

Braſſicarii.

40. P. braſſicæ. bon

Le grand Papillon blanc du chou.

Long. 1 pouc. Larg. 2 pouc. 4 lig.

P. alis rotundatis albis, primariis bimaculatis, apice nigris, major.

Loc. Habitat hortos; larva braſſicam.

41. P. rapæ.

Le petit Papillon blanc du chou.

Long. 11 lig. Larg. 23 lig.

P. alis rotundatis albis, primariis bimaculatis, apice nigris, minor.

Loc. Larva habitat rapam, braſſicam, cardamindum.

42. P. napi.

Le Papillon blanc veiné de vert.

Long. 7 lig. Larg. 19 lig.

P. alis rotundatis albis, inferioribus ſubtus faſciis vireſcentibus.

Loc. Idem.

43. P. cratægi.

Le Gaſé.

Long. 13 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ pouc.

P. alis rotundatis albis; venis nigris.

Loc. Larva habitat cratægum, pomum ſylveſtrem, padum.

44. P. cardamines. *bou*

L'Aurore.

Long. 8 lig. Larg. 19 lig.

P. alis rotundatis albis, secundariis subtus viridi-nebulosis, primariis lunulâ nigrâ, masculis maculâ croceâ.

Loc. Larva habitat thlaspim.

45. P. luctuosus. (*cest un satyre*)

Le Deuil. *P. Sibilla*

Long. 9 lig. Larg. 23 lig.

P. alis dentatis, supra nigris, subtus fusco-rubris, utrinque maculis albis fasciatim positis.

Loc. Habitat sylvas.

6. P. leucomelanos. *P. galathea* (*idem*)

Le demi-Deuil.

Long. 10 lig. Larg. 22 lig.

P. alis rotundatis albis, lineis maculisque nigris pulchrè tessellatis.

Loc. Idem.

7. P. rhamni. *bou*

Le Citron.

Long. 1 pouc. Larg. 2 pouc. 2 lig.

M v

P. alis angulatis flavis, puncto ferrugineo.

Loc. Larva habitat rhamnum.

48. P. croceus. P. hyale

Le Souci.

Long. 9 lig. Larg. 21 lig.

P. alis luteis limbo nigro, primariis maculâ nigrâ, secundariis fulvâ.

Varietas A. Papilio alis croceis limbo nigro immaculato, primariis maculâ nigrâ, secundariis fulvâ.

B. Papilio alis croceis limbo nigro flavo maculato, primariis maculâ nigrâ, secundariis fulvâ.

C. Papilio alis sulphureis, primariis limbo nigro fasciâ flavâ maculato, maculâque nigrâ, secundariis fulvâ.

Loc.

LXXI. SPHINX. *Le Sphinx.*

Antennæ priſmaticæ.
Chryſalis in puppa.

FAMIL. I. *Antennæ priſmaticæ ubique fere æquales, elingues.*

1. S. ocellata.

Le Demi-Paon.

Long. 17 lig.

S. elinguis alis angulatis, ſuperioribus fuſcis, inferioribus rubris ocello cœruleſcente.

Loc. Larva ſalicem habitat.

2. S. tiliæ.

Le Sphinx du tilleul.

Long. 1 pouce.

S. elinguis, alis laceris ſuperioribus cinereo-vireſcentibus, faſciâ obſcuriore tranſversâ inæquali, inferioribus fuſco-aurantiis.

Loc. Larva habitat tiliam.

3. S. populi.

Le Sphinx à aîles dentelées.

Long. 1 pouce.

S. elinguis, alis ſerratis, cinereo-fuſcis; ſuperioribus faſciis obſcurioribus tranſverſis, inferioribus baſi maculâ fulvâ.

Loc. Larva habitat populum.

4. S. bombyciformis.

Le Sphinx mouche.

Long. 5 lig.

S. elinguis, alis lanceolatis vitreis venis nigris, ſuperioribus maculâ limboque nigris, fulvoque nebuloſis.

Loc.

FAMILIA II. *Antennæ priſmaticæ ubique fere æquales, ſpirilingues.*

5. S. fuciformis.

Le Sphinx vert à aîles tranſparentes.

Long. 10 lig.

S. ſpirilinguis viridis alis vitreis pellucidis, venis limboque fuſco-ferrugineis.

Loc.

6. S. ſtellarum.

Le Moro-Sphinx.

Long. 13 lig.

S. ſpirilinguis, alis ſuperioribus fuſcis nebuloſis, inferioribus ferrugineis.

Loc. Larva habitat gallium.

7. S. liguſtri.

Le Sphinx du troëne.

Long. 22 lig.

S. ſpirilinguis, alis ſuperioribus fuſcis, inferioribus abdominèque faſciis tranſverſis rubris.

Loc. Larva habitat liguſtrum.

8. S. atropos.

Le Sphinx à tête de mort.

Long. 2 pouc. $\frac{1}{3}$. Larg. 9 lig.

S. ſpirilinguis, alis ſuperioribus fuſco-nebuloſis, inferioribus abdomineque faſciis tranſverſis luteis, thorace maculis caput mortuum referentibus.

Loc.

9. S. convolvuli.

Le Sphinx à cornes de bœuf.

Long.* 2 pouces.

S. ſpirilinguis alis omnibus fuſcis, faſciis dentatis obſcurioribus, abdomine faſciis tranſverſis rubris.

Loc. Larva habitat convolvulum.

10. S. elpenor.

Le Sphinx de la vigne.

Long. 16 lig.

S. ſpirilinguis, alis viridi purpureoque faſciatis, faſciis linearibus tranſverſis.

Loc. Larva habitat vitem.

11. S. euphorbiæ.

Le Sphinx du tithymale.

Long. 17 lig.

S. ſpirilinguis, alis viridi fulvo purpureoque varie faſciatis & maculatis ſubtus purpureis.

Loc. Larva habitat tithymalum.

2. S. porcellus. *bon*

Le Sphinx à bandes rouges dentelées.

Long. 1 pouce.

S. ſpirilinguis, alis viridi purpureoque faſciatis faſciis ſerratis tranſverſis.

Loc. Idem.

FAMILIA III. *Antennæ priſmaticæ in medio craſſiores, ſpirilingues.* *Zygæna.* *Larva villoſo, non cornigera.*

3. S. filipendulæ. *Zygaena filip.*

Le Sphinx belier.

Long. 8 $\frac{1}{2}$ lig.

S. ſpirilinguis, alis ſuperioribus ſubcœruleis punctis ſex rubris, inferioribus rubris.

Varietas A. Sphinx ſpirilinguis, alis rubris, ſuperioribus limbo maculiſque ſex nigris.

Loc. Larva habitat filipendulam, gramen,

LXXII. PTEROPHORUS. *LE PTEROPHORE.*

Antennæ filiformes.
Lingua ſpiralis.
Alæ ramoſæ, ramis piloſis.
Chryſalis nuda, horizontalis.

1. P. pentadactyla. *bon*
Le Pterophore blanc.
Long. 1 pouce.
P. albus, alis ſuperioribus bipartitis, inferioribus tripartitis.
Loc.

2. P. didactyla. *bon*
Le Pterophore brun.
Largeur 10 lig.
P. fuſcus, alis ſuperioribus, apice bipartitis, inferioribus tripartitis.
Loc. Larva habitat convolvulum.

3. P. hexadactyla. *bon*
Le Pterophore en éventail.
Larg. 6 lig.

P. cinereus, fuſco maculatus, alis ſuperioribus octo partitis, inferioribus quadripartitis.

Loc. Larva habitat lonyceram periclymenum.

XXIII. PHALŒNA. *LA PHALENE.*

Antennæ à baſi ad apicem decreſcentes.
Chryſalis in puppa.
Larva nuda.

FAMIL. I. *Pectinicornes.*

§. I.

Elingues alis reflexis.

1. P. pavonia major. bombyx pav. major
Le grand Paon de nuit.

Larg. 5 $\frac{1}{2}$ pouc. Long. 2 pouc.

P. pectinicornis elinguis, alis cinereo-fuſcis, planiuſculis, ſingulis ocello, major.

Loc. Larva habitat prunum, malum armenam.

2. P. pavonia media.
Le Paon moyen.

P. pectinicornis elinguis, alis cinereo fuſcis planiuſculis, ſingulis ocello, minor.

Loc. Larva habitat prunum, malum armenam.

3. P. pavonia minor.
Le petit Paon.

Larg. 2 pouc. 5 lig. Long. 11 lig.

P. pectinicornis elinguis alis planiuſculis ferrugineo fluteoque variis, ſingulis ocello faſciâque fuſcâ. *Maſc.*

P. pectinicornis elinguis, alis planiuſculis cinereis in medio albidis, ſingulis ocello faſciâque fuſcâ. *Fæmina.*

Loc. Larva habitat rubum & roſam.

4. P. coſſus.
Le Coſſus.

Long. 15 lig.

P. pectinicornis, elinguis, alis albo-cinereis, ſtriis tranſverſis nebuloſis nigris, abdomine annulis albis.

Loc. Larva habitat lignum ſalicis.

5. P. vinula.
La Queue fourchue.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis albidis diaphanis, vasis obscuris.

Loc. Larva habitat salicem & populum.

P. purpurata. bombyx purpurea

L'Ecaille mouchetée.

Larg. 23 lig. Long. 10 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis, superioribus flavis, inferioribus rubris, nigro maculatis.

Loc. Larva habitat ranunculum.

P. villica. bombix villica

L'Ecaille marbrée.

Long. 1 pouce.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis, superioribus atris, areis flavescentibus, inferioribus luteis nigro maculatis, abdomine rubro.

Loc. Larva habitat ulmum.

P. caja. Bombyx caja

L'Ecaille martre ou hérissone.

Long. 1 pouce.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis; ſuperioribus fuſcis, rivulis albis inferioribus purpureis, punctis ſex nigris.

Loc. Larva habitat ulmum.

9. P. monacha. bombyx hebe

L'Ecaille couleur de roſe.

Long. 10 lig.

P. pectinicornis elinguis alis deflexis; ſuperioribus albis, rivulis tranſverſis nigris, inferioribus roſeis, maculâ triplici nigrâ.

Loc.

10. P. teſtudinaria. bombyx plantaginis

L'Ecaille brune.

Long. 8 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis, ſuperioribus fuſcis, maculis luteis, inferioribus rubris maculis quatuor nigris.

Loc.

11. P. quercifolia. Bombyx querc.

La Feuille-morte.

Long. 15 lig.

P. pectinicornis elinguis, tota rufa, alarum margine ſerrato.

Loc. Larva habitat gramen.

P. criſtata.

La Crête de coq.

Long. 8 lig.

P. pectinicornis elinguis, pallido-rufâ criſtâ dorſali nigrâ.

Loc.

P. quercûs. Bombyx quercus

Le Minime à bande.

Long. 1 pouce 9 lig.

P. pectinicornis elinguis rufa, alis rotundatis faſciâ pallidiore, ſuperioribus puncto albo.

Loc. Larva habitat fol. quercûs, ulmi, corni, ribeſiæ.

P. diſpar. bombyx dispar

Le Zig-zag.

Long. 1 pouce.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis albis, faſciâ quadruplici tranſversâ nigrâ, acute undulatâ.

Loc. Larva habitat ulmum.

15. P. pudibunda. bombyx pud.
La Patte étendue.

Long. 1 pouce.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis, cinereo-undulatis, fasciis transversis obscurioribus, capite inter pedes porrectos.

Loc. Larva habitat prunum, &c.

16. P. annularis. bombyx neustria
La Livrée.

Long. 8 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis pallidis, fasciâ alarum transversali saturatiore.

Loc. Larva truncos arborum habitat, abundans.

17. P. palladia. bombyx gramica
La Phalène chouette.

Long. 5, 7 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis, superioribus fasciis pallido flavis nigrisque alternis longitudinalibus, inferioribus croceis fasciâ marginali nigrâ.

Loc.

8. P. mori. *Bombyx mori*

Le Ver-à-soie.

P. pectinicornis elinguis tota alba, alis reflexis, bombix dicta.

Loc. Habitat provincias meridionales.

9. P. salicis. *B. salicis*

L'Apparent.

Long. 11 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis albis, pedum annulis antennisque nigris.

Loc. Larva habitat salicem.

10. P. chrysorrhæa. *B. chry.*

La Phalène blanche à cul brun.

Long. 9 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis albis, fœminæ ano piloso ferrugineo.

Loc. Larva habitat arbores quascumque.

11. P. lubricipeda. *B. lubr.*

La Phalêne tigre.

Long. 9 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis albidis, punctis nigris; abdomine ordinibus quinque punctorum.

Loc. Larva habitat pomiferas arbores.

22. P. vernalis.

La Printaniere.

Long. 11 lig.

P. pectinicornis elinguis albida nigro punctata, alis deflexis, ſuperioribus faſciâ duplici fuſcâ dentatâ nigro terminatâ.

Loc.

23. P. antiqua. Bombyx antiqua

L'Etoilée.

Long. 7 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis rotundatis fuſco-ferrugineis ſuperioribus maculâ albâ anguli ani; fœminâ apterâ.

Loc. Larva habitat prunum.

24. P. pomona.

La Phalêne jaune à aîles vertes.

Long. 6 lig.

P.

P. pectinicornis elinguis, antennis & corpore luteis, alis deflexis viridibus.

Loc.

25. P. rosea.

La Rosette.

Long. 6 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis roseis, superioribus punctorum arcuumque ordine duplici.

Loc.

26. P. libatrix. Noctuella libatrix

La Découpure.

Long. 10 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis cinereo flavoque rufis margine laceris.

Loc.

27. P. cœruleo-cephala. Bombyx Cœrul...

Le Double-Oméga.

Long. 10 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis fuscis maculâ duplici albido flavescente geminatâ.

Loc. Larva habitat pyrum, cerasum, &c.

N

28. P. bucephala. Bombyx buce....

La Lunule.

Long. 11 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis tectiformibus, ſuperioribus cinereis, faſciâ duplici ferrugineâ, & extremo circulariter pallefcente, ſubtus omnibus flaveſcentibus, faſciâ undulatâ fuſcâ.

Loc. Larva habitat tiliam & ulmum.

29. P. venoſa. B. Zig-zag

Le Bois veiné.

Long. 7 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis exterioribus fuſcis, venis plurimis, faſciâ circulari, & marginis interioris appendice nigricantibus; inferioribus albidis limbo lineari fuſco.

Loc.

30. P. achatæa.

La Phalêne agathe.

Long. 9 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis ſuperioribus cinereis fuſco marmoratis, inferioribus cinereis.

Loc.

31. P. bi-punctata.

Le Double point.

Long. 8 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis cinereis, limbo nigro punctato, superioribus fasciâ duplici nigro luteâ, maculâque duplici albâ puncto nigro insignitâ.

Loc.

32. P. jaspoides. p. Syringaria

La Phalêne jaspée.

Long. 9 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis margine sinuatis, fulvo nigro fusco roseoque marmoratis, singulis subtus puncto nigro, superioribus extremo dilatato recurvis.

Loc.

33. P. glauca.

La Phalêne-verdelet.

Long. 6 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis viridibus; limbo maculâque anguli ani cinereo fuſcis.

Loc. Larva habitat ilicem

34. P. ſanguinolenta.

L'Enſanglantée.

Long. 6 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis luteo rubris, faſciâ duplici tranſverſâ ſanguineâ.

Loc. Larva habitat acetoſam.

35. P. minutella.

La Mignonette.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

P. pectinicornis elinguis cinerea, alis ciliatis.

Loc.

* 36. P. ſubrubeſcens.

La Phalène briquetée.

Long. 8 lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis den-

tatis ſanguineo fuſcis, faſciis pallidioribus, interioribus angulo ani nigricante.

Loc.

37. P. inordinata.

La Griffonnée.

Long. 7 $\frac{1}{2}$ lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis cinereis, lineis tranſverſis nigris acute undulatis, faſciis alternatim pallidioribus.

Loc.

38. P. obſcura.

L'Obſcure.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

P. pectinicornis elinguis, alis deflexis nigro-fuſcis, ſuperioribus poſtice maculâ duplici fulvâ.

Loc.

39. P. areolata.

La Bordure à plaques.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

P. pect. el., alis def. albis, maculâ inæquali transversâ margineque interrupto fuscis.

Loc.

* 40. P. punctata.

La Nervure picotée.

Long. 6 lig.

P. pect. el., alis def. fusco-cinereis, nervis nigro punctatis.

Loc.

41. P. zona.

La Zone.

Long. 8 lig.

P. pect. el., alis patentibus angulatis fusco-luteis, fasciâ duplici transversâ.

Loc. Larva habitat ilicem.

42. P. angulata. P. amatoria

L'Anguleuse.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

P. pect. el., alis pat. angulatis cinereis, fasciâ duplici transversâ, punctoque obscuriore, atomis cinerascentibus.

Loc.

43. P. bicincta.

La Double ceinture.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

P. pect. el., alis pat. flavis, lineis ſuperne tribus, inferne duabus tranſverſis fuſcis.

Loc.

44. P. monilifera.

La Phalène à bracelets.

Long. 5 lig.

P. pect. el., alis pat. cinereo-fuſcis punctis lineiſque tranſverſis nigris, pedibus albo nigroque interſectis.

Loc.

45. P. ſimplex.

La Griſonnette.

Long. 6 lig.

P. pect. el., alis pat. cinereo-pallidis, punctis lineiſque tranſverſis nigris, pedibus albidis.

Loc.

§. II.

Linguatæ alis deflexis.

46. P. vulpinaria.

La Bordure enſanglantée.

Long. 10 lig.

P. pectinicornis ſpirilinguis, alis deflexis pallido luteis limbo roſeo, ſuperioribus maculâ, inferioribus faſciâ duplici fuſcâ.

Loc.

47. P. ſtuticus.

La Turquoiſe.

Long. 6 lig.

P. pect. ſp. viridi-cœrulea nitens, alis inferioribus fuſcis.

Loc.

48. P. triſtis.

Le Phalène brune à aîles inférieures blanches.

Long. 7 lig.

P. pect. sp. alis deflexis nigro fuscoque undulatis, inferioribus albis.

Loc.

49. P. domialla.

La Damerette.

Long. 4 ½ lig.

P. pect. sp. triangularis, alis deflexis nigro-roseis, fasciis transversis nigricantibus.

Loc.

50. P. frontana.

Le Toupet-tanné.

Long. 5 lig.

P. pect. sp., corniculis cristatis, alis deflexis ochroleucis, lineâ duplici transversâ saturatiore.

Loc.

§. III.

Linguatæ alis planis.

51. P. lactea. p. lactearia

La Laiteuse.

Long. 3 lig. Larg. 7 lig.

P. pect. sp. alis patentibus rotundatis niveis, corpore flavo.

Loc.

52. P. fulvicans.

La Phalêne striée fauve.

Long. 5 lig. Larg. 1 pouce.

P. pect. sp., alis pat. albido-luteis, omnibus fulvo transversim dense striatis.

Loc.

53. P. cinerata.

Le Damas cendré.

Long. 4 lig. Larg. 8 lig.

P. pect. sp. alis pat. cinereis, superiorum margine exteriore maculâ triplici nigro-fuscâ.

Loc.

54. P. inæqualis.

La Bande inégale.

Long. 7 lig. Larg. 13 lig.

P. pect. sp., alis pat. cin., fusco nebulosis, lineis transversis inæqualibus.

Loc.

55. P. artriosa.

La Bande rouge.

Long. 6 lig. Larg. 13 lig.

P. pect. sp., alis pat. luteis, fasciâ transversâ rubrâ.

Loc.

56. P. marginalis.

La Bande à point marginal.

Long. 5 lig.

P. pect. sp., alis pat. cinereo-obscuris, lineâ fasciâque alarum transversâ obscuriore, puncto marginali nigro.

Loc.

57. P. picta.

La Rayure jaune picotée.

Long. 5 lig.

P. pect. sp. alis pat. flavescentibus, fasciis plurimis transversis, nonnullis connexis atomisque fuscis.

Loc.

58. P. Bandevillæa.

La Grisaille.

Long. 11, 12, 14 lig.

P. pect. ſp., alis pat. cinereis, atomis maculiſque nigris.

Loc.

* 59. P. fimbriata.

La Frange pourprée.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

P. pect. ſp., alis pat. angulatis flaveſcentibus, faſciis tribus connexis fuſcis, limboque rubro, ſubtus punctatis.

Loc.

* 60. P. nayas.

La grande Nayade.

Long. 6 lig.

P. pect. ſp. alis pat. aqueo-viridibus, lineâ duplici tranſversâ albâ, antennis niveis.

Loc.

* 61. P. Malletina.

La Bordure maculée.

Long. 5 lig.

P. peƈt. ſp. alis pat. cinereis, ſuperiorum margine extremo maculis quatuor oblongis fuſcis, limbo fuſco.

Loc.

* 62. P. atomifera.

Le Damas blanc.

Long. 5 ½ lig.

P. peƈt. ſp., alis pat. albis, faſciis tribus atomiſque luteſcentibus, oculis nigris.

Loc.

* 63. P. geminata.

La Bimaculée.

Long. 7 lig.

P. peƈt. ſp., alis pat. cinereis faſciis tranſverſis obſcurioribus, punƈtiſque nigris.

Loc.

* 64. P. virginalis.

La Virginale.

Long. 5 ½ lig.

P. peƈt. ſp., alis pat. albis inferioribus punƈto nigro.

Loc.

* 65. P. carthesiana.

La Piqûure.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig.

P. pect. sp., alis pat. fuscis atomis obscuris.

Loc.

* 66. P. nitidula.

La Brillante.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig.

P. pect. sp., alis pat. albis nitentibus; atomis cinereis punctoque superiorum nigro.

Loc.

* 67. P. miliata.

La Pointillée.

Long. 3 lig.

P. pect. sp., alis pat. cinereis, fuscis margineque nigro punctatis.

Loc.

68. P. immutata.

Les Atomes à une bande.

Long. 6 lig.

P. peꝺ. ſp., alis pat. albidis, atomis cinerascentibus, & fasciâ undulatâ ferrugineâ.

Loc.

FAMIL. II. *Antennis filiformibus.*

§. I.

Linguatæ alis planis.

69. P. microcoſma.

La Rayure blanche picotée.

Long. 5 lig. Larg. 13 lig.

P. ſeticornis, ſpirilinguis alis patentibus cinereis, faſciis plurimis tranſverſis nonnullis connexis, atomiſque fuſcis.

Loc.

70. P. clathrata. l.w

Les Barreaux.

Long. 5 lig. Larg. 11 lig.

P. ſet. ſp., alis pat. fuſcis, utrinque maculis albis quadranguli teſſelatis.

Loc.

71. P. hortulana. p. urticata

La Queue jaune.

Long. 7 lig.

P. ſet. ſp. alis pat. albo fuſcoque nebuloſis, ano flavo.

Loc. Larva habitat urticam.

72. P. glyphica. Noctuella Glyp.

La Doublure jaune.

Long. 6 lig.

P. ſet. ſp., alis pat. ſupra fuſcis pone ſubtuſque flaveſcentibus.

Loc.

73. P. groſſulariata. bon

La Mouchetée.

Long. 8 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ pouce.

P. ſet. ſp., alis pat. albis, maculis inæqualibus nigris plurimis, faſciâque tranſverſâ luteâ.

Loc. Larva habitat groſſulariam.

74. P. papilionaria.

Le Celadon.

Long. 9 lig. Larg. 21 lig.

P. ſet. ſp., alis pat. ſinuatis, pallido-glaucis, faſciâque tranſverſâ obſcuriore.

Loc. Larva habitat ilicem.

75. P. ſambucaria. bon

La Souffrée à queue.

Long. 10 lig.

P. ſet. ſp. alis pat. ſulphureis, lineâ duplici tranſverſâ obſcuriore, inferioribus caudatis.

Loc. Larva habitat ſambucum.

76. P. luteola. p. crataegata

La Citronelle rouillée.

Long. 7 lig. Larg. 15 lig.

P. ſet. ſp., alis pat. luteis, duplici punctorum cinereorum ordine, ſuperioribus maculis duabus & rachi croceo-ferrugineis.

Loc.

77. P. marginata. bon

La Bordure entrecoupée.

Long. 6 lig. Larg. 11 lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. albis, margine undique interrupte fuſcis.

Loc.

78. P. panthera.

La Phalêne panthère.

Long. 5 lig. Larg. 1 pouce.

P. ſet. ſpiril., alis pat. flavis, maculis numeroſis fuſcis.

Loc.

79. P. atomoſa.

Les Atômes à deux bandes.

Long. 5 ½ lig. Larg. 1 pouce.

P. ſet. ſpiril., alis pat. albidis, atomis cineraſcentibus, & faſciâ duplici undulatâ ferrugineâ.

Loc.

* 80. P. herbacea.

L'Herbacée.

Long. 4 lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. viridibus dentatis, lineâ duplici tranſversâ albâ.

Loc.

81. P. bolonienſis.

La Phalêne blanche à tache & bande noires.

Long. 4 lig. Larg. 9 lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. albis, ſuperioribus maculâ nigrâ & faſciâ duplici in extremo undulatâ.

Loc.

2. P. interſecta.

La Bande interrompue.

Long. 4 ½ lig. Larg. 8 lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. niveis, omnibus pone faſciâ undulatâ fuſcâ, ſuperiorum margine externo maculis nigris.

Loc.

83. P. ſtratiolata.

La Phalêne griſe à lignes brunes & point noir.

Long. 3 ½ lig. Larg. 9 lig.

P. ſet. ſp. alis pat. cinereis, faſciis linearibus fuſcis; punctoque nigro.

Loc. Larva aquatica habit. ſtratiot. & Potomageton.

84. P. ſtrigata.

La Phalêne blanche à lignes brunes ſans points.

Long. 5 lig. Larg. 1 pouce.

P. ſet. ſpiril., alis pat. albis, lineâ duplici undulatâ ſubfuſcâ.

Loc.

85. P. brocatella.

La Brocatelle d'or.

Long. 5 lig. Larg. 11 lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. luteis, lineolis fuſcis & albidis undulatis limbo dentato.

Loc. Larva habitat ilicem & ulmum.

86. P. alabaſtrina.

La Brocatelle d'argent.

Long. 5 lig. Larg. 10 lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. albis, lineolis faſciiſque plurimis undulatis fuſcis, limbo ſubdentato.

Loc.

87. P. fuſcata.

La Brocatelle brune.

Long. 4 lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. cinereis, faſciis plurimis fuſcis undulatis tranſverſis, limbo ſubdentato.

Loc.

88. P. circulifera.

Les quatre Omicrons.

Long. 4 lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. albis, ſingulis faſciâ undulatâ ſerratâ, & omicro albis.

Loc.

89. P. plebeia.

La Nervure brune.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. cinereis, margine exteriore fuſco, punctoque alarum nigro.

Loc.

90. P. virgata.

La Phalêne à bandes vertes.

Long. 5 lig. Larg. 11 lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. viridi fuſcoque variegatis, faſciâ triplici undulatâ obſcuriore.

Loc.

91. P. alternata.

La Veinée.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. faſciis tranſverſis albis fuſciſque alternis.

Loc.

92. P. hieroglyphica.

L'Hyéroglyphe.

Long. 4 lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. dentatis cinereis, ſuperioribus litteris duabus & margine fuſcis.

Loc.

93. P. unduloſa.

L'Ondoyante.

Long. 3 lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. albido-glaucis, faſciis arcuatis obſcurioribus.

Loc.

94. P. ſyrene.

La petite Nayade.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. è viridi glaucis, faſciâ duplici albidâ.

Loc.

5. P. humeralis.

L'Humérale.

Long. 5 lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. albis, humeris faſciâque tranſversâ nigro fulvis.

Loc.

6. P. piloſellæ.

L'Auripeau.

Long. 5 ½ lig.

P. ſet. ſpiril., alis. pat. flaveſcentibus, faſciis inæqualibus obſcuris punctoque nigro.

Loc.

97. P. aurantiaca.

La Bande orangée.

Long. 6 lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. flaveſcentibus, faſciis aurantiis, circumflexis.

Loc.

98. P. lunularis.

La Phaléne en croiſſant.

Long. 4 lig.

P. ſet. ſpiril. alis pat. cinereis nitentibus, ſuperiorum puncto nigro, faſciâque marginali arcuatâ albâ.

Loc.

99. P. prolongata.

L'Apoſtrophe.

Long. 3. $\frac{1}{2}$ lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. albis, ſuperioribus puncto prolongato atro.

Loc.

100. P. aſparagi.

La Damaſſée à points.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

P. ſet. ſpiril. alis pat. albidis nitentibus ſingulis puncto nigro, faſciiſque undulatis obſcuris.

Loc.

101. P. cordigera.

La Ceinture brune.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. albidis, faſciis obſcuris ſingulis puncto nigro faſciâque latâ undulatâ fuſcâ.

Loc

102. P. eremitica.

La Zone blanche.

Long. 3 lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. nigris, maculis faſciàque tranſverſâ arcuatâ albâ, margine alarum albido.

Loc.

103. P. albeola.

La Blanchette à points.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

P. ſet. ſpiril., alis pat. albidis, ſingulis punctulo nigro.

Loc.

§. II.

Linguatæ, alis deflexis.

104. P. plantaginis. Bombyx hera

La Phaléne chinée.

Long. 11 lig.

P. ſet. ſpiril., alis deflexis, ſuperioribus atris rivulis flavis, inferioribus rubris maculis nigris.

Loc. Larva habitat plantaginem.

105. P. jacobeæ. Bombyx Jac.

La Phaléne carmin du ſéneçon.

Long. 8 lig.

P. ſet. ſpiril. alis ſuperioribus fuſcis, lineâ punctiſque duobus rubris, inferioribus rubris.

Loc. Larva habitat ſenecionem & jacobæam.

106. P. pronuba. Noctuella pro.

La Phaléne hibou.

Long. 1 pouce.

P. ſet. ſpiril., alis incumbentibus, exterioribus cæſiis nebuloſis, inferioribus luteis faſciâ atrâ marginali.

Loc. Larva habit. thlaſp. & cruciferas.

107. P. altica.

La Phaléne brune à tache jaune aux aîles inférieures.

Long. 5 lig.

P. ſet. ſpiril., alis deflexis, ſuperioribus nebuloſo-fuſcis, inferioribus nigris, maculâ margineque luteis.

Loc.

c8. P. triplicata.

La Rayure à huit lignes.

Long. 8 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. cinereis, faſciis tranſverſis fuſcis e triplici lineâ compoſitis.

Loc.

09. P. rubricollis. Bombyx rubr.

La Veuve.

Long. 8 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. nigricantibus, collari purpureo, abdomine flavo.

Loc.

10. P. leucormelas. noctuella ?autographa

L'Alchymiſte.

Long. 10 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. undulato nigris, inferioribus baſi albis.

Loc.

11. P. chryſitis.

Le Vert doré.

Long. 8 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. ferrugineo-fuſcis faſciâ duplici tranſversâ viridi-aureâ.

Loc.

112. P. pacta.

La Likenée rouge.

Long. 18 lig.

P. ſet. ſpiril. alis def. ſuperioribus cinereo fuſcoque nebuloſis, inferioribus rubris, faſciâ duplici tranſversâ nigrâ.

Loc. Larva habitat arbores.

113. P. fraxini.

La Likenée bleue.

Long. 2 pouc.

P. ſet. ſpiril., alis def., ſuperioribus cinereo fuſcoque undulatis, inferioribus nigris, faſciâ tranſversâ cœruleâ.

Loc. Larva habitat fraxin. rariſſima.

114. P. meticuloſa.

La Meticuleuſe.

Long. 10 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def., margine eroſis, cinereo-fuſcis, ſuperioribus triangulo marginali fuſceſcente incarnatum includente; thorace gibbo.

Loc. Larva habit. pimpriſellam, abſinthium, &c.

115. P. mediata.

L'Aîle brune à baſe fauve.

Long. 7 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. fuſcis, ſuperioribus lineis rufis, baſique maculâ fulvâ.

Loc.

116. P. fluctuans.

Le Flot.

Long. 1 pouce.

P. ſet. ſpiril., alis def. cinereo-fuſcis, ſuperioribus faſciâ undoſâ triplici, punctoque obſcuro marmoratis.

Loc.

117. P. tripartita.

La Phaléne blanchâtre à deux bandes brunes.

Long. 7 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. albo-flaveſcentibus, faſciâ duplici tranſversâ fuſcâ.

Loc.

118. P. inchoata.

La Tache marginale.

Long. 5 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. albido-flaveſcentibus, faſciâ marginali oblongâ fuſcâ.

Loc.

119. P. quatrilis.

La Phalène jaune à quatre points.

Long. 6 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. flaveſcentibus, ſuperioribus ſingulis punctis duobus fuſcis.

Loc. Larva habitat ulmum.

120. P. decolorata.

La Décolorée.

Long. 7 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. albido fulvis immaculatis.

Loc.

121. P. pſi. noctuella psi

Le Pſi. ⚴.

Long. 9 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. canis, maculis pſiformibus nigris.

Loc. Larva habitat poma.

122. P. gamma. noct. gamma

Le Lambda.

Long. 9 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. exterioribus fuſcis, lambda græco inſcriptis.

Loc. Larva habitat acetoſellam, &c.

123. P. omicron. Noct. chi

L'Omicron nébuleux.

Long. 11 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def., ſuperioribus cinereo fuſcoque nebuloſis, lineis undulatis & omicro nigris, inferioribus cinereis.

Loc. Larva habitat ilicem, betulam, &c.

124. P. graphica. noc. persicaria

L'Omicron géographique.

Long. 7 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. ſuperioribus fuſcis, lineis undulatis & omicro albis, inferioribus cinereis.

Loc.

125. P. iota. Noctuella absinthii

L'Iota.

Long. 9 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. albido-cinereis, lineis longis nigris.

Loc. Larva habitat abſinthium, abrotanum, ſantolinam.

126. P. verbaſci. Noc. Ver.

La Striée brune de verbaſcum.

Long. 9 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def., fuſco-cinereis, ſuperioribus fuſcis longitudinaliter ſtriatis.

Loc. Larva habitat verbaſcum, ſcrophulariam, amygdalum.

* 127. P. zonata.

La Double zone.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. luteſcentibus, faſciâ duplici tranſverſâ fuſcâ.

Loc.

128. P. herminata.

La Phalêne petit gris.

Long. 6 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. fuſco-nebuloſis, ſuperioribus maculis irregularibus albis.

Loc.

129. P. navicularis. noctuella pyramidea

La Brunette à aîles inférieures rougeâtres.

Long. 11 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def., ſuperioribus fuſcis, lineis tranſverſis undulatis nigris, inferioribus ferrugineis.

Loc.

130. P. ſerrata.

La Dent de ſcie.

Long. 8 lig.

P. ſet. ſpiril., alis ſubdeflexis, exterioribus cœſio purpureis, faſciis tranſverſis undulatis, interioribus pallidis, omnibus margine ſerrato.

Loc. Larva habitat humum.

131. P. bimaculata.

La Double tache.

Long. 8 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def., ſuperioribus ferrugineo cinereis, maculâ duplici longâ rotundâque nigrâ, inferioribus albidis.

Loc.

132. P. teſſellata.

La Frange bigarrée.

Long. 7 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. fuſco-nebuloſis, limbo teſſellato, ſuperioribus maculâ duplici punctoque albis.

Loc. Larva habitat linariam.

133. P. xi.

L'Ix.

Long. 6 lig.

P. ſet. ſpiril. alis def. cinereis, ſuperioribus faſciâ decuſſatâ fuſcâ, puncto nigro, lineiſque tranſverſis albidis.

Loc.

134. P. aſtroites.

La Phalène noire à une tache blanche ſur chaque aîle.

Long. 6 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. atris, ſingulis maculâ albâ.

Loc.

135. P. conſtellata.

La Phalène noire à deux taches blanches ſur chaque aîle.

Long. 7 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. nigris, ſingulis duabus maculis, & lineis undulatis albis.

Loc.

136. P. funebris.

La Phalene noire à lignes blanches.

Long. 6 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. nigris, lineis punctis albis.

Loc.

137. P. bifaſciata.

La Phalêne brune à deux bandes blanches.

Long. 3 ½ lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. fuſcis, ſuperioribus faſciâ duplici obliquâ albâ.

Loc.

138. P. nacarata. Noctuella Delphinii

Le Nacarat.

Long. 6 lig.

P. ſet. ſpiril., alis roſeo purpureoque variegatis, ſuperioribus maculâ duplici marginali albâ.

Loc. Larva habitat ulmum.

139. P. incarnata.

L'Incarnat.

Long. 7 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. roſeis, ſuperioribus faſciâ duplici limboque albidis.

Loc.

140. P. areolata. p. palustrata

La Plaque dorée.

P. ſet. ſpiril., alis def. nigro fuſcis, maculis plurimis albido-flaveſcentibus.

Loc. Larva habitat braſſicam.

141. P. forficalis. crambus forficatus fabr.

La Bande eſquiſſée.

Long. 6 lig.

P. ſet. ſpiril. triangularis, alis deflexis flavis, lineis duabus ferrugineis obliquis.

Loc. Larva habitat braſſicam.

142. P. inverſa. p. verticalis

La Bande à l'envers.

Long. 7 lig.

P. ſet. ſpiril. triangularis, alis def. albo-vireſcentibus, ſubtus lineis duabus tranſverſis nigris.

Loc.

143. P. erecta.

La Phalêne à ventre relevé.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

P. ſet. ſpiril. triangularis, alis ſuperioribus fuſco-purpureis, faſciâ tranſverſâ albido-ferrugineâ, abdomen ſuprà protendens.

Loc.

144. P. lemopicta.

La Phalêne quadrille.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

P. ſet. ſpiril., alis def., ſuperioribus nigris, punctis quatuor albis, inferioribus flavis fuſco marginatis.

Loc.

145. P. virginea.

L'Albâtre.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

P. ſet. ſpiril. alba, oculis nigris, antennis pedibuſque ſubflaveſcentibus.

Loc.

146. P. verrucoſa.

Le Toupet à points.

Long. 6 lig.

P. ſet. ſpiril., corniculis magnis criſtatis alis fuſco-fumoſis, medietate poſticâ albidiore, punctis verrucoſis eminentibus.

Loc.

147. P. argyrata.

La Phalêne à trois bandes argentées.

Long. 1 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. nigris, faſciis tribus argenteis tranſverſis, tertiâ interruptâ.

Loc. Larva habitat cerefolium ſylveſtre.

148. P. cappata.

La Chappe brune.

Long. 4 lig.

P. ſet. ſpiril., humeris latis, ferrugineo-fuſca, faſciis tribus tranſverſis ſaturatioribus.

Loc.

149. P. umbratilis.

La Chappe à bande & tache brune.

Long. 4 lig.

P. ſet. ſpiril., humeris latis, aurato-flaveſcens, alarum faſciâ tranſversâ maculâque duplici fuſcâ.

Loc.

150. P. denſata.

La Chappe brune au ſautoir.

Long. 4 lig.

P. ſet. ſpiril., humeris latis, alis anticè pallidis faſciâ obliquâ fuſcâ, pone fuſcis faſciâ maculâque cinereis.

Loc. Larva habitat acerem.

151. P. anguloſa.

La Chappe jaune à bande brune.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

P. ſet. ſpiril., hum. latis, flava, faſciâ tranſverſâ fuſcâ.

Loc.

52. P. nitens.

La Chappe bronzée.

Long. 3 lig.

P. ſet. ſpiril., hum. latis, fuſco-aurea, faſciâ duplici auratâ, maculâ purpureâ.

Loc.

53. P. flavipes. pyralis viridana

La Chappe verte.

Long. 4 lig.

P. ſet. ſpiril., hum. latis, antennis flaveſcentibus, alis dilute vireſcentibus.

Loc. Larva habitat folia ilicis.

54. P. nacellaris. pyr. prasinana

La Chappe verte à bande.

Long. 9 lig.

P. ſet. ſpiril., hum. latis, alis viridibus, lineâ duplici tranſverſâ albidâ.

Loc. Idem.

55. P. fulvicornis.

La Phalêne verte ondée.

Long. 7 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. viridibus, faſciâ duplici tranſversâ ſaturatiore.

Loc.

156. P. culiciformis. aleyrodes chelidonii

La Phalêne culiciforme de l'éclaire.

Long. 2, 3 lig.

P. ſet. planilinguis, corpore roſeo alis rotundatis planiuſculis niveis, ſingulis puncto cinereo.

Loc. Larva habitat chelidonium majus.

* 157. P. duplicata.

La Phalêne à nervures noires.

Long. 7, 8 lig.

P. ſet. ſpiril. alis def. albis inferne nervis nigris.

Loc.

* 158. P. hilaris.

La Coquette.

Long. 13 lig.

P. ſet. ſpiril., denſe villoſa alis albis, maculis nigro-cœruleis conſperſa.

Loc.

159. P. irregularis.

La Clair-obſcure.

Long. 7 lig.

P. ſet. ſpiril., alis ſuperioribus maculis irregularibus nigro fuſcis, limbo pallido; inferioribus fuſcis, macularum albidarum ſerie duplici tranſversâ.

Loc.

160. P. fuſcoptera.

La Phalêne à trois points.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

P. ſet. ſpiril., corpore flavo, oculis nigris, alis fuſcis ſuperioribus punctis tribus albis, inferioribus baſi flavis.

Loc.

161. P. dianæa.

La Lunaire.

Long. 9 lig.

P. ſet. ſpiril., alis cinereis, margine interiore, & exteriore fuſcis, interne lunulâ.

Loc.

* 162. P. circulata.

Le Cerceau pointillé.

Long. 9 lig.

P. ſet. ſpiril., alis fuſco-cinereis punctis nigris faſciatim diſpoſitis, & maculâ circulari.

Loc.

* 163. P. heſperidea.

L'Orangère.

Long. 6 lig.

P. ſet. ſpiril., alis aurantiis, inferioribus baſi faſciâque nigrâ.

Loc.

* 164. P. graminea.

Le Lampas vert.

Long. 5 ½ lig.

P. ſet. ſpiril., alis virideſcentibus, faſciis irregularibus albis nigro terminatis.

Loc.

* 165. P. uſta.

La Phaléne brûlée.

Long. 1 lig.

P. ſet. ſpiril., alis cinereo-nigris, & veluti deuſtis.

Loc.

56. P. milleſima.

La Millerage.

Long. 7 lig.

P. ſet. ſpiril., alis albis, nervis longitudinalibus luteſcentibus denſis.

Loc.

67. P. heraclitæa.

Le Funéraire.

Long. 6 lig.

P. ſet. ſpiril. fuſca, alis ſuperioribus maculis albidis longitudinaliter & tranſverſim poſitis.

Loc.

168. P. pulchella.

La Mignogne.

Long. 4 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. albis, lineis undulatis nigris, maculâ triplici obſcurâ, pedibus nigro interſectis.

Loc.

* 169. P. marina.

La Phalène ondée.

Long. 6 lig.

P. ſet. ſpiril. alis def. fuſcis, faſciâ latâ tranſversâ, punctoque obſcuriore.

Loc.

* 170. P. chryſo-pallida.

La Damaſſée jaune.

Long. 4 lig.

P. ſet. ſpiril., alis pallidis, faſciis undulatis luteis, mediâ latiore fuſcâ, puncto nigro.

Loc.

* 171. P. antrorum.

La Damaſſée brune.

Long. 7 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. fuſcis, faſciis undulatis albis, ſubtus puncto nigro.

Loc.

72. P. nocturna.

La Nocturne.

Long. 5 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. fuſcis, ſupra lineis quatuor undulatis obſcurioribus.

Loc.

73. P. mandarina.

La Mandarine.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. fuſcis, omnibus inferne, inferioribus ſupra faſcià tranſversâ croceâ.

Loc.

74. P. ocularis.

L'Oculaire.

Long. 4 lig.

P. ſet. ſpiril., alis corporis circumvolutis cinereis, albicantibus, maculâ internâ connexâ fulvâ.

Loc.

* 175. P. pomacea.

L'Omicron vert.

Long. 8 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. fuſcis ſuperic ribus maculâ albâ faſciis undulatis omicro viridibus inferioribus cinereis

Loc.

* 176. P. columbina.

La Gorge de Pigeon.

Long. 7 lig.

P. ſet. ſpiril. alis def. albido-roſeis nitentibus faſciis undulatis fuſcis.

Loc.

* 177. P. littorea.

La Brunette à taches en bordure.

Long. 4 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. fuſcis, parte anticâ obſcuriore, poſticâ maculâ duplici fuſcâ.

Loc.

178. P. multicolor.

La Marbrure brune.

Long. 5 lig.

P. ſet. ſpiril., alis deflexis, ſuperioribus fuſco fulvo albidoque marmoratis, inferioribus fuſcis.

Loc.

179. P. feneſtralis.

Le Grillage.

Long. 3 ½ lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. fuſcis antice faſciis tranſverſis confertis albidis.

Loc.

180. P. donzella.

La Donzelle.

P. ſet. ſpiril., capite nigro, alis def. pallidis, ſuperioribus faſciis albis ſtriiſque luteſcentibus minute marmoratis.

Loc.

181. P. pretioſa.

Le Jaſpe brun.

Long. 6 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. cinereis, fuſco nigroque marmoratis nitentibus.

Loc.

* 182. P. opalæa.

L'Opale.

Long. 6 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. cinereo-fuſcis, limbo albido faſciâ latâ ſinuatâ ſubcœruleâ nitente.

Loc.

* 183. P. focorum.

Le Bord enfumé.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. albidis, ſubflaveſcentibus margine infimo fuceſcente.

Loc.

* 184. P. vinoſa.

La Vineuſe.

Long. 4 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. antice albidis, poſticè rubeſcentibus, maculâ albicante punctoque nigro.

Loc.

185. P. pellicea.

L'Herminée.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. fuſcis, maculis latis albis numeroſis connexis.

Loc.

186. P. doliata.

La Phalêne à cerceaux jaunes.

Long. 3 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. fuſcis, faſciis tranſverſis flavis nonnullis connexis.

Loc.

187. P. franciſcana.

La Brunette à ceinture.

Long. 3 lig.

P. ſect. ſpiril. alis def. fuſcis, ſuperioribus maculis aliquot obſcuris, inferioribus tranſverſâ flavâ.

Loc.

188. P. ferruginea.

La Rouillée.

Long. 6 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. fuſcis, ſuperioribus maculis obſcuris ſubferrugineis.

Loc.

* 189. P. arcuata.

La Griſette à zig-zag.

Long. 6 lig.

P. ſet. ſpiril., oculis nigris, antennis fulvis, alis deflexis albidis, faſciis arcuatis nigricantibus.

Loc.

* 190. P. Kermeſina.

Le Velours cramoiſi.

Long. 7 lig.

P. ſet. ſpiril. alis def., ſuperioribus rubeſcentibus, inferioribus rubris, puncto margineque nigris.

Loc.

* 191. P. hiſpana.

La Doublure brune.

Long. 4 ½ lig.

P. ſet. ſpiril. alis def. infra fuſcis, ſupra lineis undulatis fuſcis.

Loc.

192. P. citrella.

La Jonquille.

Long. 5 lig.

P. ſet. ſpiril. alis def. flavis; areis pallidioribus.

Loc.

193. P. ſinuoſa.

La Sinuée.

Long. 4 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. utrinque flavis, lineis undulatis fuſcis.

Loc.

194. P. mediata.

La Ceinture griſe.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

P. ſet. ſpiril. alis def. fuſcis, medietate poſticâ cidereâ, margine fuſco.

Loc.

* 195. P. ovata.

La Tache brune.

Long. 4 lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. flaveſcentibus, maculâ ovatâ fuſcâ.

Loc.

* 196. P. modeſta.

La Modeſte.

Long. 5 ½ lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. albidis lineis tranſverſis maculâque duplici externâ oblongâ fuſcis.

Loc.

* 197. P. circumſcripta.

L'Agathe brune.

Long. 6 ½ lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. fuſco-nigricantibus, alarum ſuperiorum baſi & apice pallidioribus, lineâ duplici circumſcriptis.

Loc.

198. P. auriculata.

La Phalêne à panaches.

Long. 6 ½ lig.

P. ſet. ſpiril., alis def. ſubrubeſcentibus, faſciâ tranſversâ luteſcente, margine alarum externo interſecto.

Loc.

199. P. roſacea.

La Chappe couleur de roſe.

Long. 3 ½ lig.

P. ſet. ſpiril., humeris latis, alis roſeis, maculâ externâ margineque flavis.

Loc.

200. P. anglica.

La Chappe griſe.

Long. 3 ½ lig.

P. ſect. ſpiril. humeris latis, cinerea; penicillis plurimis alarum elevatis.

Loc.

* 201. P. bidella.

La Chappe bedeaude.

Long. 4 lig.

P. ſet. ſpiril., humeris latis, alis anticè albis, poſtice fulvis.

Loc.

LXXIV. TINEA. *LA TEIGNE.*

Antennæ filiformes à baſi ad apicem decreſcentes.

Frons prominula.

Larva involucro tecta.

Chryſalis in involucro larvæ.

1. T. hirondinella.

La Teigne à queue d'hirondelle.

Long. 3 ½ lig. Larg. 2 lig.

T. corniculis duobus ſubulatis recurvis, cinerea, alis maculâ fuſcâ.

Loc.

2. T. radiata.

La Teigne à bandes rayonnées.

Long. 5 lig.

T. corniculis duobus ſubulatis, alis flaveſcentibus nitidis, ſtriarum albidarum ordine duplici tranſverſo.

Loc.

3. T. corniculata.

La Teigne à rayure d'argent.

Long. 4 lig.

T. cinerea, corniculis duobus criſtatis, faſciâ alarum longitudinali argenteâ.

Loc.

4. T. evonymella. bou

La Teigne blanche à points noirs.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

T. alis ſuperioribus albis punctis nigris inferioribus fuſcis.

Loc. Larva ſocialis habitat folia pomorum.

5. T. arlequinetta.

L'Arlequinette jaune.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

T. alis flavis faſciis maculiſque nigris.

Loc.

6. T. pellionella. *bma*

La Teigne commune.

Long. 2 lig.

T. plumbæa nitida, puncto nigro in medio alarum.

Loc. Larva habitat vestes laneas.

7. T. plumbæa.

La Teigne plombée nébuleuse.

Long. 2 lig.

T. atro-plumbea, alis superioribus fusco-nebulosis.

Loc.

8. T. melanopis.

La Teigne blanche.

Long. 2 ½ lig.

T. tota alba oculis nigris.

Loc.

9. T. marginatella.

La Teigne à bordure de points.

Long. 3 ½ lig.

T. cinerea, alarum margine inferiore punctis nigris.

Loc.

10. T. crucifera.

La Teigne à croix de S. André.

Long. 2 $\frac{3}{4}$ lig.

T. aurata, alis ſuperioribus cruce decuſſatâ fuſco rubrâ.

Loc.

11. T. granella.

La Teigne brune à tête blanchâtre.

Long. 3 $\frac{2}{3}$ lig.

T. tota fuſco-nebuloſa, capite albido.

Loc. Larva habitat domos.

12. T. equeſtris.

La Teigne à croix de Chevalier.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

T. fuſca, cruce dorſi decuſſatâ albâ.

Loc.

13. T. tapetzella. pyralis trapezana

La Teigne bedeaude à tête blanche.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra capite niveo, alis pone albidis.

Loc. Larva lanam, pennas avium devorat, muſæis infeſta.

14. T. bidella. pyralis traperana

La Teigne bedeaude à tête brune.

Long. 4 lig.

T. fuſca capite fuſco, alis pone albidis.

Loc.

15. T. bicolorata.

La Teigne bedeaude à trois triangles.

T. nigra, alis ponè albidis, maculâ triplici triangulari nigrâ.

Loc. Larva habitat glandes.

16. T. quadratella. pyralis dorsella

La Teigne à quarrure.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

T. alis nigris, ſuperioribus maculâ quadratâ albâ ex quatuor lineolis albis tranſverſis compoſitâ.

Loc. Larva habitat ſylvas.

17. T. inverſella.

La Teigne à quadrille.

Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig.

T. nigra, alis antice albidis, maculis quatuor nigris; pone nigris, maculis duabus albis.

Loc.

18. T. monilifera.

La Teigne à deux rangs de points blancs.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

T. alis atris, punctorum alborum lineâ duplici transversâ.

Loc.

19. T. nebulosella.

La Teigne marbrée à plaques brunes.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig.

T. cinerea, alarum maculis nigro-nebulosis.

Loc. Larva habitat domos.

20. T. undulatella.

La Teigne à quatre bandes brunes ondulées.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

T. alis delute cinereis, faſciis tribus fuſcis tranſverſis undulatis.

Loc.

21. T. circumvoluta.

Le Manteau à points.

Long. 8 lig.

T. alis argenteis, corpori circumvolutis faſciâ duplici tranſversâ punctorum nigrorum.

Loc.

22. T. ochrocephala.

Le Manteau à tête jaune.

Long. 7 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

T. alis albis corpori circumvolutis, capite collarique flavis.

Loc.

23. T. viridella.

Le Manteau à bandes verdâtres.

Long. 6 $\frac{1}{2}$ lig.

T. alis corpori circumvolutis albido-roſeis, faſciis tribus obſcurè vireſcentibus.

Loc.

24. T. crocella.

Le Manteau jaune.

Long. 7 lig.

T. alis corpori circumvolutis croceis, oculis pedibusque nigris.

Loc.

25. T. rosella.

Le Manteau couleur de rose.

Long. 7 lig.

T. alis corpori circumvolutis abescentibus margine roseo.

Loc.

26. T. rhomboidella.

Le Lozange cendré.

Long. 3 lig.

T. fusco-cinerea, alarum maculâ rhomboideâ albidâ oblongâ.

Loc.

27. T. nervosa.

La Teigne à nervures.

Long. 5 lig.

T. alis cinereis, ſuperioribus nitentibus nervis multifidis fuſcis.

Loc.

28. T. Reaumurella. aluita fl.

La Teigne noire bronzée.

Long. 3 ½ lig.

T. nigra, alis exterioribus deauratis, antennis corpore duplo longioribus.

Loc. Larva habitat arbores.

29. T. de Geerella. aluita deg.

La Coquille d'or.

Long. 4 ½ lig.

T. nigra, alis ſuperioribus lineis longitudinalibus, faſciâ latâ tranſversâ infernèque radiis plurimis, antennis corpore triplo longioribus.

Loc. Larva habitat ſalicem.

30. T. intermediata.

L'Entre-ligne.

Long. 5 lig.

T. alis flaveſcentibus, lineis duabus &

maculâ intermediâ fuſcis in extremo ſuperiorum.

Loc.

31. T. bimaculoſa.

La Teigne à deux taches jaunes en bordure.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

T. fuſco-rubra, alarum ſuperiorum margine exteriore maculis duabus flavis.

Loc.

32. T. funigera. T. podella

La Teigne Cordelière.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, faſciâ tranſversâ albâ.

Loc.

33. T. mays.

La Teigne à deux taches blanches en bande.

Long. 3 lig.

T. fuſco-rubra, alis ſuperioribus maculis duabus croceis tranſverſim poſitis.

Loc. Larva habitat ſemina mays.

34. T. marmorella.

La Teigne à marbrure.

Long. 5 lig.

T. nigro-fuſca, rivulis flaveſcentibus marmorata.

Loc.

34. T. xiloſtella.

La Teigne à bandelette blanche.

Long. 3 lig.

T. cinerea, dorſo vittâ longitudinali albâ.

Loc.

36. T. trifaſciata.

La Teigne griſe à trois ſautoirs bruns.

Long. 3 ½ lig.

T. cinerea, alarum faſciâ triplici obliquâ undulatâ fuſcâ.

Loc.

37. T. thoracica.

La Teigne à corcelet rayé.

Long. 4 lig.

T. capite thoraceque flavo lineis longitudinalibus fuſcis, alis albo-flaveſcentibus, faſciis tranſverſis fuſcis.

Loc.

38. T. intermittens.

La Teigne à bande interrompuë.

Long. 2 ½ lig.

T. albo flaveſcens, faſciis duabus obliquis ferrugineis, poſteriore interruptâ.

Loc.

36. T. ternatella.

La Teigne à triangle marginal.

Long. 3 ½ lig.

T. alba margine alarum exteriore maculis tribus fuſcis, triangulum referentibus.

Loc.

40. T. quinnata.

La Teigne blanche à cinq bandes brunes.

Long. 1 ⅔ lig.

T. alba, alis ſuperioribus lineis quinque tranſverſis fuſcis.

Loc. Larva habitat ſepes.

41. T. herminata.

La Teigne à bordure herminée.

Long. 2 lig.

T. fuſca, lineâ duplici tranſversâ flavâ, margine alarum undique flavo interſecto.

Loc. Larva habitat lichenem ſcriptum.

42. T. annulifera.

La Teigne à bande dorée & anneau blanc aux antennes.

Long. 2 $\frac{3}{4}$ lig.

T. alis ſuperioribus nigris, faſciâ longitudinali maculiſque duabus aureis, antennis medio albis.

Loc.

43. T. Merianella. bon

La Teigne dorée à bandes d'argent.

Long. 1 lig.

T. nigro-aurata, lineis argenteis tranſ-
verſis tribus antennis extremo albis.

Varietas A. T. Wilkella.

Long. 1 ¾ lig.

T. nigro-aurata, lineis argenteis tranſ-
verſis quatuor, antennis nigris.

Loc. Habitat folia ulmi.

44. T. Malletella.

La Teigne dorée à bande & toupet jaunes.

Long. 2 ¾ lig.

T. nigra, alis exterioribus deauratis,
capitis vertice alarumque faſciâ tranſ-
versâ flavis.

Loc.

45. T. Linnæanella.

La Teigne dorée à quatre points d'argent.

Long. 2 ½ lig.

T. flavo-aurata, punctis quatuor argen-
teis, antennarumque apice albo.

Loc.

46. T. plumbæa.

La Teigne crayonnée.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

T. crocea, lineis tranſverſis fuſco-argenteis interruptis, alarum medio maculâ albâ punctiſque plumbeis.

Loc.

47. T. mucoſa.

La Teigne moiſie.

Long. 4 lig.

T. albida, lineis longitudinalibus reticulatis fuſcis, involucro villoſo-abeſcente.

Loc. Larva habitat gramen.

48. T. pedifera.

La Teigne à fourreau en croſſe.

Long. 4 lig.

T. alis cinereis, lineis albis faſciâque longitudinali fuſcâ, involucro fuſco pediformi.

Loc. Larva habitat ilicem.

9. T. lamellifera.

La Teigne à fourreau à deux lames.

Long. 3 lig.

T. nigro-cinerea, involucro fuſco recurvo lamina duplici folioſâ tectâ.

Loc. Larva habitat folia arborum.

o. T. palearis.

La Teigne à fourreau de paille ſimple.

T. involucro palearam ordine unico tecto.

Loc. Idem.

1. T. faſciculifera.

La Teigne à fourreau de paille composé.

T. involucro palearum longitudinalium ordine multiplici compoſito.

Loc. Larva habitat herbam pratorum.

2. T. graminifera.

La Teigne à fourreau de pailles tranſverſes.

T. involucro ex paleis tranſverſis compoſito.

Loc. Larva habitat herbam pratorum.

53. T. lichenoſa.

La Teigne des pierres à fourreau rond en capuchon.

T. lapidum, involucro conico recurvo.

Loc. Larva habitat lichenem parietinum.

54. T. lapidoſa.

La Teigne des pierres à fourreau triangulaire à pans.

T. lapidum, involucro triangulari.

Loc. Idem.

* 55. T. cincta.

La Teigne d'or à anneaux.

Long. 4 lig.

T. fuſca, alis ſuperioribus flavis; punctis margine externo, circuloque infra croceis.

Loc.

* 56. T. punctulata.

La Teigne à points noirs.

Long. 3 lig.

T. cinerea, alis ſuperioribus punctorum nigrorum tribus paribus.

Loc.

* 57. T. atratella.

La Teigne jaune.

Long. 2 lig.

T. tota atra.

Loc.

* 58. T. virgata.

La Teigne à bande noire.

Long. 2 lig.

T. fuſco-cinerea, faſciâ tranſversâ piliſque flavo-aureis.

Loc.

59. T. vittata.

La Teigne à ceinture blanche.

Long. 2 lig.

T. nigro-fuſca, faſciâ tranſversâ albâ.

Loc.

* 60. T. ſignatella.

La Teigne brochée d'or.

Long. 5 lig.

T. alba, ſignaturis fulvis aureiſque marmorata, margine alarum externo albo interſecto.

Loc.

* 61. T. lucidula.

La Mine de plomb.

Long. 3 ½ lig.

T. fulva, fuſco lineiſque plumbeis marmorata punctis plumbeis.

Loc.

* 62. T. radiatella.

Le Manteau rayone.

Long. 5 lig.

T. fuſca, alis corpori circumvolutis fuſcis, faſciis longitudinalibus radiatis albis,

Loc.

* 63. T. ſcapulata.

La Teigne à mantelet.

Long. 2 ½ lig.

T. cinerascens, fasciis transversis fuscis, capite collarique albo, oculis nigris.

Loc.

64. T. turcica.

L'Ottomane.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig.

T. nigra, alarum basi maculâ duplici lunulari albâ.

Loc.

65. T. crassicornis.

La Teigne à grosses antennes.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, antennis crassis, alarum basi, fasciâque transversâ luteâ.

Loc.

66. T. purpuratella.

La Purpurine.

Long. 4 lig.

T. nigro-violacea, alis antice-flavis postice maculâ marginali flavâ, lineis cœruleis nitentibus, pedibus annulis albis.

Loc.

* 67. T. cinerata.

Le Manteau cendré.

Long. 4 lig.

T. alis corpori circumvolutis albidis, margine cinereo.

Loc.

* 68. T. antennulata.

La Lozange jaune.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

T. atra, alarum basi maculâ longitudinali, margine externo puncto medio, maculâ rhomboidæâ flavis, antennis medio albis.

Loc.

* 69. T. citrinella.

La Citrine.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

T. alis superioribus flavis, maculis aliquot aurantiis.

Loc.

* 70. T. pallidula.

La Paillette.

Long. 4 lig.

T. corpore fuſco, oculis nigris, alis pallido-flavis.

Loc.

71. T. tan.

Le Tan.

Long. 4 lig.

T. cinereo fuſcoque marmorata, alarum apice lineâ albâ acutè circumflexâ.

Loc.

72. T. argentinetta.

La Teigne brochée d'argent.

Long. 3 $\frac{1}{3}$ lig.

T. fuſco-violacea, lineis punctiſque argenteo-violaceis.

Loc.

73. T. ſtellata.

La Tache de neige.

Long. 3 lig.

T. crocea ſubviolacea, margine externo maculâ albidiſſimâ.

Loc.

* 74. T. aurantiaca.

La Teigne orangée.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

T. corniculis duobus criſtatis nigro-cœrulea, alarum parte ſuperiore maculiſque duabus flavis.

Loc.

SECTIO QUARTA

CLASSIS INSECTORUM.

Insecta tetraptera alis nudis.

ARTICULUS PRIMUS.

Tarsorum articuli tres.

LXXV. LIBELLULA. *LA DEMOISELLE.*

Ce genre est divisé en 3 par fabr. Il est conservé par olivier.

Antennæ brevissimæ.

Os maxillosum.

Cauda masculis forcipata.

Ocelli três ante aut inter oculos.

FAMILIA I. *Alis erectis.*

agrion fabr.

1. L. ludovicea. agrion Virgo fabr.
La Louise.

Long. 21 lig.

L. corpore viridi cœruleo nitido, alis medio cœruleſcentibus, baſi & apice albidis margine immaculato.

Loc. Habitat prata & ſtagnorum ripas.

2. L. virgo. Var. de l'agrion virgo Fabr.

L'Ulrique.

Long. 20 lig.

L. corpore viridi ſericeo, alis ſubfuſcis puncto marginali albo.

Loc. Idem.

3. L. puella. Var. de l'agrion puella Fabr.

L'Amélie.

Long. 14 lig.

L. corpore cœruleo cinereoque alterno, alis puncto marginali nigro.

Loc. Idem.

4. L. dorothæa. Var. de l'agrion puella Fabr.

La Dorothée.

Long. 14 lig.

L. corpore infra cœruleo-viridi ſupra fuſco, thorace faſciis fuſcis cœruleſcentibuſque alternis, puncto alarum marginali nigro.

Varietas A. L. corpore infra fulvo, ſupra nigro, thorace fulvo fuſcoque variegato, puncto alarum marginali fuſco.

Loc. Habitat prata & ſtagnorum ripas.

5. L. ſophia. Var. de l'agrion puella

La Sophie.

Long. 16 lig.

L. corpore viridi pallide incarnato, thorace faſciis tribus longitudinalibus nigris, alis puncto marginali fuſco.

Loc. Idem.

6. L. adelais.

L'Adélaide.

Long. 17 lig.

L. corpore viridi ſericeo, alis albis; puncto marginali.

Loc. Idem.

FAMILIA II. *Alis patentibus.*

7. L. quadrimaculata. bon

La Françaiſe.

Long. 19 lig.

L. alis maculâ duplici marginali.

Loc. Id. rariſſima.

8. L. flaveola.

L'Eléonore.

Long. 16 lig.

L. alis albis, baſi luteis abdomine luteſcente.

Loc. Habitat amnium ripas.

9. L. philintha.

La Philinthe.

L. alis albis, baſi luteis; abdomine ſupra pulvere cinereo-cœruleſcente conſperſo.

Loc. Idem.

10. L. ſylvia.

La Sylvie.

Long. 2 pouces.

L. thorace viridi nitido, lineis flavis; alis albis abdomine nigro cœruleſcente.

Loc. Idem.

11. L. Ænea.
L'Aminthe.
Long. 18 lig.
L. viridi-inaurata, alis pallidis, pedibus nigris.
Loc. Habitat amnium ripas.

12. L. vulgatiſſima.
La Juſtine.
Long. 17 lig.
L. lateribus flava, alis albis.
Loc. Idem.

13. L. grandis.
La Julie.
Long. 28 lig.
L. fulva alis flaveſcentibus, thoracis lateribus lineis duabus flavis, fronte flaveſcente, caudâ diphyllâ.
Loc. Idem.

14. L. forcipata.
La Caroline.
Long. 23 lig.

L. thorace luteo virefcente lineis nigris, abdomine nigricante caracteribus flavis.

Loc. Habitat amnium ripas.

15. L. cecilia.

La Cécile.

L. thorace virefcente abdomine fufco caracteribus flavis.

Loc. Idem.

16. L. victoria.

La Victoire.

Long. 15 lig.

L. corpore flavo, abdomine cylindrico, alarum bafi flavicante.

Loc. Idem.

LXXVI. PERLA. *La Perle.*

Antennæ filiformes.
Alæ incumbentes, cruciatæ æquales.
Os tentaculis quatuor.
Cauda bifeta.
Ocelli tres.

1. P. bicaudata. *b. bic. Fabr.*

La Perle brune à raies jaunes.

Long. 8 lig.

P. fuſca, capite thoraceque lineâ longitudinali flavâ alis fuſco reticulatis.

Loc. Habitat amnium ripas.

2. P. flavipes.

La Perle brune à pattes jaunes.

P. fuſca, abdominis lateribus pedibuſque pallido flavis, alis fuſco-venoſis.

Loc. Idem.

3. P. nebuloſa.

La Perle brune à aîles pâles.

Long. 5 ½ lig.

P. nigro-fuſca, alis ſubcinereis pallidis, caudæ ſetis truncatis.

Loc. Idem.

4. P. flava.

La Perle jaune.

Long. 2 lig.

P. flava, alis albis oculis nigris.

Loc. Idem.

ARTICULUS SECUNDUS.

Tarſorum articuli quatuor.

LXXVII. RAPHIDIA. *LA RAFIDIE.*

Antennæ filiformes.
Alæ incumbentes.
Os tentaculis quatuor.
Cauda nauda.
Ocelli tres.

1. R. ophiopſis.
La Rafidie.
Long. 6 lig.
Raphidia.
Loc. Habitat ſylvas, rara.

ARTICULUS TERTIUS.

Tarſorum articuli quinque.

LXXVIII. EPHEMERA. *L'EPHÉMÈRE.*

Antennæ breviſſimæ.
Alæ inferiores multo breviores.
Cauda ſetoſa.
Ocelli tres magni ante oculos.

1. E. vulgata.

L'Ephémère à trois filets & aîles tachetées.

Long. 8, 9 lig.

E. alis nebuloſo-maculatis, caudâ triſetâ.

Loc. Habitat rivulorum ripas.

2. E. reticulata.

L'Ephémère à trois filets & aîles réticulées.

Long. 5 lig.

E. lutea, alis albis reticulatis, caudâ triſetâ.

Loc. Idem.

3. E. virideſcens.

L'Ephémère à trois filets & aîles brunes.

E. luteo-fuſca, alis fuſco-viridibus, caudâ triſetâ.

Loc. Idem.

4. E. nigra.

L'Ephémère noire à trois filets.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

E. nigra, caudâ triſetâ.

Loc.

5. E. lutea.

L'Ephémère jaune à deux filets & aîles réticulées.

Long. 4 lig.

E. lutea, alis albis reticulatis; caudâ biſetâ.

Loc.

6. E. culiciformis.

L'Ephémère à deux filets & aîles blanches.

Long. 2 lig.

E. fuſca, caudâ biſetâ, alis albis.

Loc.

7. E. bioculata.

L'Ephémère à deux filets & aîles brunes.

E. thorace fuſco, abdomine albo, caudâ biſetâ, alis fuſcis ſtriatis.

Loc. Habitat aquatica prata.

8. E. horaria.

L'Ephémère à deux filets & aîles marginées.

Long. 3 lig.

E. alis albis, margine craſſiore, nigricantibus, caudâ biſetâ.

Loc. Habitat domos.

XXIX. PHRYGANEA. *LA FRIGANE.*

Antennæ filiformes.

Alæ laterales, tectiformes, pone aſſurgentes.

Os tentaculis quatuor.

Cauda nuda.

Ocelli tres.

1. P. ſtriata.

La Frigane de couleur fauve.

Long. 11 lig.

P. alis teſtaceis, nervoſo-ſtriatis.

Loc. Habitat amnium ripas.

2. P. rhombica.

La Frigane panachée.

Long. 7 lig.

P. alis deflexo compressis flavescentibus maculâ rhombeâ laterali albâ.

Loc. Habitat amnium ripas.

3. P. vulgata.

La Frigane brune à aîles fauves.

Larg. 5 lig.

P. nigro-fusca, alis pedibusque testaceis.

Loc. Idem.

4. P. plumbea.

La Frigane plombée à aîles fauves.

Long. 4 ½ lig.

P. atra, alis plumbeis pedibus fulvis.

Loc. Idem.

5. P. intersecta.

La Frigane à antennes panachées.

Long. 4 ½ lig.

P. cinereo-fusca, suturâ alarum maculâ albâ, antennis albo fuscoque intersectis corpore duplo longioribus.

Loc. Idem.

6. P. maculata,

La Frigane à aîles tachetées & courtes antennes.

Long. 4 lig.

P. alis ſuperioribus nebuloſis, antennis longitudine corporis.

Loc. Habitat amnium ripas.

7. P. longicornis.

La Frigane à aîles tachetées & longues antennes.

Long. 3, 3 ½ lig.

P. alis ſuperioribus nebuloſis nigro-punctatis, antennis corpore triplo longioribus.

Loc. Idem.

8. P. venoſa.

La Frigane noire à aîles pâles & veinées.

Long. 5 lig.

P. atra, pedibus albis, alis pallidis venoſis.

Loc. Idem.

9. P. viridis.

La Frigane verte.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

P. viridis, oculis nigris, alis niveis.

Loc. Habitat amnium ripas.

10. P. ſex-punctata.

La Frigane à aîles ponctuées.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

P. fuſca, alis albis fuſco maculatis.

Loc. Idem.

11. P. funerea.

La Frigane mouche en deuil.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

P. tota atra, corpore rotundiore, antennis corpore brevioribus.

Loc. Idem.

12. P. muſciformis.

La Frigane-mouche de couleur pâle.

P. fuſca, corpore rotundiore, antennis corpore brevioribus, alis pallidis venoſis.

Loc. Habitat amnium ripas.

3. P. variegata.

La Frigane marbrée à pattes panachées.

Long. 8 lig. Larg. 2 lig.

P. nigro-fuſca, maculis cinereis, pedibus nigro cinereoque interſectis.

Loc. Idem.

14. P. lugubris.

La Frigane enfumée.

Long. 2 ½ lig. Larg. ½ lig.

P. tota atra, alis fuſcis, venis nigris.

Loc. Idem.

15. P. nervoſa.

La Frigane à nervures.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

P. pallida, alis albis, nervis fuſco punctatis.

Loc. Idem.

16. P. atra.

La Frigane ſavoyarde.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

P. tota atra oblonga, alis nigris.

Loc. Habitat amnium ripas.

17. P. gallata.

La Frigane demi-deuil.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

P. nigra, faſciâ duplici albâ interruptâ, antennis albo interſectis.

Loc. Idem.

LXXX. HEMEROBIUS. *L'HÉMEROBE.*

Antennæ filiformes.
Alæ ſæpe æquales.
Os prominens tentaculis quatuor.
Cauda nuda.
Ocelli nulli.

1. H. perla.

Le Lion des puccrons.

Long. 6 lig.

H. luteo-viridis, alis aqueis vaſis viridibus.

Loc. Habitat arbores, roſam.

12. H. chryſops.

L'Hémerobe à aîles ponctuées.

Long. 3 lig.

H. luteus, alis aqueis, vaſis fuſco punctatis.

Loc. Habitat hortos.

13. H. flavilater.

L'Hémerobe aquatique.

Long. 7 lig.

H. ater, alis fuſcis nigro-reticulatis, margine exteriore dilatato.

Loc. Habitat rivulorum ripas.

LXXXI. FORMICALEO. *LE FOURMILION.*

Antennæ breves, clavatæ, craſſæ.
Alæ æquales.
Os prominens tentaculis quatuor.
Cauda nuda.
Ocelli nulli.

1. F. noſtras.

Le Fourmilion.

Long. 12 lig.

Loc. Habitat arenam.

LXXXII. PANORPA. *La Mouche-Scorpion.*

Antennæ longæ filiformes.

Alæ æquales.

Roſtrum corneum cylindraceum.

Cauda chelifera forficibus armata.

Ocelli tres.

1. P. communis.

La Mouche-Scorpion.

Long. 7, 8 lig.

Loc. Habitat prata ad amnes.

LXXXIII. CRABRO. *Le Frélon.*

Antennæ clavatæ.
Alæ inferiores breviores.
Os maxilloſum.
Aculeus ani dentatus.
Abdomen ubique æquale thoraci connatum.
Ocelli tres.

1. C. humeralis.
Le Frélon à épaulettes.
Long. 10 lig. Larg. 3 lig.
C. niger, ſubhirſutus, fronte, thorace ſuperne, abdomineque flavis, ſegmento 1°, 2° & 4° ex parte nigris.
Loc.

2. C. maculatus.
Le Frélon à échancrure & ventre jaune.
Long. 10 lig. Larg. 3 lig.
C. niger, abdomine flavo, ſegmentis tribus ſuperioribus nigris maculis flavis.
Loc.

3. C. lunulatus.

Le Frélon noir à échancrure.

Long. 1 pouc. Larg. 3 ½ lig.

C. totus niger, abdominis ſegmento primo ovatim margine inciſo lunul[a] flavâ.

Loc.

* 4. C. annulatus.

Le Frélon à anneau noir.

Long. 10 lig. Larg. 3 ½ lig.

C. ferrugineus, thorace ſuperne abdominiſque ſegmento primo nigris.

Loc.

LXXXIV. UROCERUS. *L'Urocere*

Antennæ filiformes.

Alæ inferiores breviores.

Os maxilloſum.

Aculeus ani dentatus prominens co[r]niculo tectus.

Abdomen ubique æquale thoraci cor[]natum.

Ocelli tres.

1. U. gigas.

L'Urocère.

Long. 13 lig. Larg. 3 lig.

Loc.

LXXXV. TENTHREDO. *La Mouche-a-scie.*

Antennæ filiformes.

Alæ inferiores breviores.

Os maxillosum.

Aculeus ani dentatus non prominens.

Abdomen ubique æquale thoraci connatum.

Ocelli tres.

FAMIL. I. *Antennis novem-nodiis.*

1. T. hebraica.

La Lettre hébraïque verte.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

T. viridis, capite thoraceque ſupra caracteribus nigris.

Loc. Habitat flores.

2. T. crocea.

La Mouche-à-ſcie ſafranée.

Long. 3 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

T. crocea, antennis oculiſque nigris.

Loc. Habitat flores.

3. T. melanocephala.

La Mouche-à-ſcie ſafranée à tê noire.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. crocea, capite, pedibus, thoraciſq apice nigris.

Loc. Idem.

4. T. roſæ.

La Mouche-à-ſcie du roſier.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

T. crocea; capite thorace ſupra, alaru que margine exteriore nigris.

Loc. Habitat roſam.

5. T. ochroptera.

La Mouche-à-ſcie noire à aîles jaunes.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

T. nigro-cœruleſcens, pedibus, tibiis aliſque exterioribus croceis, maculâ marginali fuſcâ.

Loc.

6. T. maculata.

La Mouche-à-ſcie noire, à ventre jaune noir en haut & en bas.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, thorace maculis flavis, abdomine luteo baſi & apice nigro, pedibus variegatis.

Loc.

7. T. unifaſciata.

La Mouche-à-ſcie à une bande jaune.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, thoracis apice flavo, ſegmentis abdominalibus quarto & quinto luteis.

Loc.

8. T. punctata.

La Mouche-à-ſcie noire marquée de jaune ſur le premier & dernier anneau du ventre.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. nigro-cœrulea, alis pedibuſque flavis, ſegmentis abdominalibus primo & ultimo maculâ luteâ.

Loc.

9. T. bifaſciata.

La Mouche-à-ſcie à deux bandes jaunes.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, ſegmentis abdominalibus primo & quinto luteis.

Loc. Habitat plantas umbelliferas.

10. T. trifaſciata.

La Mouche-à-ſcie à trois bandes jaunes.

Larg. 4 $\frac{2}{3}$ lig. Long. 1 lig.

T. nigra, pedibus abdominiſque ſegmentis primo, quinto, ſexto & ultimo margine flavis.

Loc.

11. T. ruſtica.

La Mouche-à-ſcie à quatre bandes jaunes.

Long. 5 ½ lig. Larg. 1 ½ lig.

T. nigra, ſegmentorum abdominalium marginibus, excepto ſecundo, tertio & ſexto, flavis, pedibus ferrugineis.

Loc. Habitat ſalicem.

12. T. virgata.

La Mouche-à-ſcie à deux bandes noires ſur le ventre.

Long. 5 lig. Larg. 1 ½ lig.

T. nigra, pedibus ſegmentorumque abdominalium marginibus, excepto ſecundo, tertio & quinto, flavis.

Loc.

13. T. ſcrophulariæ.

La Mouche-à-ſcie de la ſcrofulaire.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, ſegmentorum abdominalium marginibus, excepto ſecundo & tertio, flavis.

Loc. Habitat ſcrophulariam.

14. T. multi-faſciata.

La Mouche-à-ſcie à ventre rayé.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

T. nigra, ſegmentorum abdominalium omnibus flavis.

Loc.

15. T. cordata.

La Mouche-à-ſcie porte-cœur.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig Larg. 1 lig.

T. nigra, thoracis apice maculis albis, pedibus anticis abdominiſque poſticâ parte ferrugineis.

Loc.

16. T. bimaculata.

La Mouche à-ſcie à deux taches blanches au corcelet.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

T. nigra, thoracis apice maculis albis, pedibus anticis abdominiſque medio ferrugineis.

Loc.

27. T. ſtellata.

La Mouche-à-ſcie noire à ventre bordé de taches jaunes.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, thoracis apice maculâ flavâ, ſegmentis abdominalibus utrinque maculis luteis.

Loc.

28. T. labiata.

La Mouche-à-ſcie noire à pattes & corcelet variés de jaune.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, thoracis maculis tribus abdominiſque apice flavis, pedibus flavo nigroque variis.

Loc.

19. T. multicolor.

La Mouche-à-ſcie noire à pattes rouges & bandes du ventre fauves.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, thoracis abdominiſque apice maculis flavis, abdominis medio fulvo, pedibus rubris.

Loc.

20. T. ſalicis.

La Bedeaude du ſaule.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

T. flava, capite thoraceque ſupra nigro.

Loc. Habitat ſalicem.

21. T. litterata.

La Mouche-à-ſcie à ventre & pattes fauves & corcelet panaché.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

T. capite thoraceque nigro caracteribus flavis, pedibus abdomineque ferrugineis.

Loc.

22. T. albicornis.

La Mouche-à-ſcie à antennes blanches au bout.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, antennarum apice albo, abdominis baſi maculâ utrinque albâ, apice fulvo.

Loc.

23. T. albipes.

La Mouche-à-ſcie noire à pattes argentées.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra pedibus albo variegatis.

Loc.

24. T. liguſtrina.

La Mouche-à-ſcie à pattes argentées & milieu du ventre fauve.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

T. nigra, femoribus maculis albis, abdominis medio ferrugineis.

Loc.

25. T. atra.

La Mouche-à-ſcie noire à pattes fauves.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, pedibus ferrugineis.

Loc.

26. T. flavipes.

La Mouche-à-ſcie noire à pattes jaunes & milieu du ventre fauve.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, pedibus flavis, abdominis medio ferrugineis.

Loc.

27. T. rufipes.

La Mouche-à-ſcie noire, à pattes & milieu du ventre fauves.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

T. nigra, pedibus abdominiſque medio ferrugineis.

Loc.

28. T. dumetorum.

La Mouche-à-ſcie noire, à points de devant jaunes & milieu du ventre fauve.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

T. nigra, pedibus quatuor anticis flavis, femoribus poſticis abdominiſque medio ferrugineis.

Loc.

29. T. annulata.

La Mouche-à-ſcie noire, avec le milieu du ventre fauve.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

T. nigra, abdominis medio ferrugineo.

Loc.

30. T. cœruleſcens.

La Mouche-à-ſcie noire bleuâtre.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

T. tota nigro-cœrulea, alis nigricantibus, margine exteriore nigro.

Loc.

31. T. geniculata.

La Mouche-à-ſcie noire à genoux fauves.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

T. nigra, geniculis ferrugineis.

Loc.

32. T. ceraſi.

La Mouche-à-ſcie noire à pattes jaunes.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

T. nigra, pedibus flavis.

Loc.

33. T. pectinicornis.

La Mouche-à-ſcie noire, à antennes pectinées.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

T. nigra, antennis uno verſu pectinatis, tibiis tarſiſque flavis.

Loc.

34. T. cordigera.

La Mouche-à-ſcie cordelière.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, ſegmento abdominali quinto albo, pedibus pallidis, genubus albis.

Loc.

35. T. Aſtroites.

L'Etoile d'or.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, humeris, thoracis apice, tibiiſque luteis.

Loc.

36. T. palmata.

La Mouche-à-ſcie aux pieds blancs.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

T. nigra, humeris thoraciſque apice flavis, pedibus abdominiſque medio ferrugineis, palmis poſticis albis.

Loc.

37. T. perlata.

La Mouche-à-ſcie perlée.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

T. nigra, thoracis apice flavo, pedibus abdominiſque medio ferrugineis, palmis poſticis albo maculatis.

Loc.

38. T. apicaris.

La Mouche-à-ſcie fauve à point jaune.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

T. ferruginea, thoracis apice flavo, oculis nigris.

Loc.

39. T. thoracica.

La Mouche à-ſcie à pattes fauves & taches blanches.

Long. 5 ½ lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, thoracis apice maculis albis, pedibus ferrugineis.

Loc.

FAMILIA II. *Antennis undecimnodiis.*

40. T. vernalis.

La Mouche-à-ſcie noire à corcelet rouge.

Long. 2 ½ lig. Larg. ¾ lig.

T. nigra, thorace rubro.

Loc.

1. T. viridefcens.

La Mouche-à-fcie noire à ventre bordé de vert.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, pedibus, lateribus thoracis abdominifque viridefcentibus.

Loc.

FAMIL. III. *Antennis octodecim-nodiis.*

42. T. cynofbati.

La Mouche-à-fcie à jambes variées.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

T. nigra, pedibus ferrugineis, tibiis pofticis albo nigroque annulatis.

Loc.

43. T. rubi.

La Mouche-à-fcie à point jaune au corcelet & milieu du ventre fauve.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, puncto thoracis luteo, pedibus abdominifque medio ferrugineis.

Loc.

44. T. longicornis.

La Mouche-à-ſcie à longues antennes.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

T. nigra, ſegmentis abdominalibus margine flavis, antennis duas tertias corporis partes æquantibus.

Loc.

45. T. longicollis.

La Mouche-à-ſcie à col allongé.

Long. 10 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

T. nigra, utrinque luteo-maculata, collo elongato.

Loc.

46. T. ſertifera.

La Mouche-à-ſcie à bouquet.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

T. nigra, antennis utrinque pectinatis, pedibus flavis. *Maſc.*

Long. 3 $\frac{1}{2}$, 4, 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1, 1 $\frac{1}{2}$ lig.

T. tota ferruginea, antennis nigris thorace brevioribus ſubſerratis. *Femin.*

Loc.

47. T. prolongata.

La Mouche-à-scie à prolongement.

Long. 5, 6 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

T. nigra, pedibus abdominisque medio fulvis collo elongato.

Loc.

LXXXVI. CYNIPS. *Le Cinips.*

Antennæ cylindraceæ fractæ.

Alæ inferiores breviores.

Os maxillosum.

Aculeus ani conicus intra valvas abdominis.

Abdomen subovatum ad latera compressum, subtus acutum, petiolo thoraci connexum.

Ocelli tres.

Famil. I. *Antennarum articuli undecim.*

1. C. bedeguaris.

Le Cinips doré à queue, du bedeguar lisse.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. thorace viridi-æneo, abdomine aureo, ſetis ani corpore longioribus.

Loc. Habitat tumorem roſæ *Bedeguar* dictum, & gallam quercinam.

2. C. viridis.

Le Cinips doré ſans queue.

C. thorace viridi æneo, abdomine aureo, ſetis ani non exſertis.

Loc. Idem.

3. C. auratus.

Le Cinips porte-or.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig.

C. punctatus ſericeo-auratus, ſetis ani corpore brevioribus.

Loc.

4. C. fungoſus.

Le Cinips de la galle fongueuſe du chêne.

Long. $\frac{1}{2}$ lig.

C. nigro-viridis, tibiis flavis, gallæ fungoſæ quercûs.

Loc. Habitat gallam quercinam.

5. C. pomaceus.

Le Cinips de la galle liſſe & ronde du chéne.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. nigro-cupreus, pedibus fuſcis, gallæ rotundæ, glabræ, duræ, foliorum quercûs.

Loc. Habitat minorem gallam foliorum quercûs, ſolitarius.

6. C. punctatus.

Le Cinips noirâtre à point marginal.

C. nigro-cupreus, pedibus fuſcis alarum puncto fuſco.

Loc.

7. C. foliaceus.

Le Cinips de la galle du chéne qui vient de la ſubſtance même de la feuille.

Long. 1 lig.

C. viridi-ſericeus, abdomine aurato, pedibus albis, gallæ intra foliorum quercûs ſubſtantiam deliteſcentis.

Loc. Habitat gallam intra foliorum quercûs laminas quaſi inſufflatam.

8. C. gemmæ quercûs.

Le Cinips de la galle en roſe du chêne.

Long. 1 lig.

C. nigro-cupreus, pedibus fuſcis, gallæ imbricatæ quercûs.

Loc. Habitat gallam quercûs in roſæ formam expanſam & extùs diſſectam.

9. C. baccarum quercûs.

Le Cinips de la galle en chapeau du chêne.

C. niger, pedibus fulvo flavis, gallarum fungiformium quercûs.

Loc. Habitat gallam quercûs pediculo foliis inhærentem, fungiformem.

10. C. fimbriatus.

Le Cinips de la galle platte & frisée du chêne.

Long. 1 lig.

C. nigro-aureus, pedibus fusco-variegatis, gallæ planæ rubræ fimbriatæ quercûs.

Loc. Habitat gallam quercûs compressam, orbicularem, & fimbriatam.

11. C. racemosus.

Le Cinips de la galle en grappe du chêne.

C. fuscus nitens, capite nigro, abdominis apice villoso, gallæ racemosæ quercûs.

Loc. Habitat gallam quercûs duram in racemos super foliorum pediculis dispositam.

12. C. minutus.

Le Cinips de la galle tête d'épingle du chêne.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. viridis nitens, pedibus pallidis gallæ globosæ vix sensibilis foliorum quercûs.

Loc. Habitat gallam acutam & minutissimam quercûs.

13. C. scaber.

Le Cinips de la galle raboteuse des feuilles de chêne.

C. gallæ scabræ foliorum quercûs.

Loc. Insectum incognitum, Galla sola noscitur.

14. C. tuberculatus.

Le Cinips de la galle à tubercules du chêne.

C. gallæ tuberculatæ quercûs.

Loc. Idem.

15. C. numismalis.

Le Cinips de la galle en écusson de chêne.

C. gallæ numismatis quercûs.

Loc. Idem.

16.

16. C. pedunculi quercûs.

Le Cinips de la galle en pomme des extrémités des branches du chêne.

C. gallæ pomiformis extremitatis ramorum quercûs.

Loc. Insectum incognitum, Galla sola noscitur.

17. C. radicum.

Le Cinips de la galle ligneuse des racines.

C. gallæ ligneæ radicum.

Loc. Idem.

18. C. salicis strobili.

Le Cinips de la galle des feuilles de saule.

C. nigro-viridis nitens, pedibus pallidis, gallæ foliorum salicis.

Loc. Habitat gallam salicis folia vestientem.

19. C. graminis.

Le Cinips de la galle à filets du chiendent.

C. gallæ graminis filamentosæ.

Loc. Habitat gallam capillarem, quæ circà basim foliorum graminis nascitur.

20. C. glechomæ.

Le Cinips de la galle du lierre terrestre.

C. totus fuscus, thorace subvilloso, gallæ hederæ terrestris.

Loc. Habitat gallam duram & orbicularem folia glechomæ hederaceæ occupantem.

21. C. aurantii.

Le Cinips fauve & le sauteur de l'oranger.

Long. 1 ½ lig.

C. aurantii, ferrugineus, alarum basi albâ puncto nigro, antennis nigris, pedibus saltatoriis.

Loc.

22. C. saltator.

Le Cinips sauteur noir.

Long. ⅔ lig.

C. niger nitens, pedibus saltatoriis.

Loc.

23. C. cruciatus.

Le Cinips sauteur noir à pieds fauves.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

C. ater, pedibus saltatoriis fulvis.

Loc.

24. C. pupparum.

Le Cinips des chrysalides de papillons.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

C. viridi-sericeus, abdomine aureo, pedibus pallidis, chrisalidum papilionum.

Loc. Habitat puppas papilionis brassicæ.

. C. ovulorum.

Le Cinips des œufs des insectes.

Long. $\frac{1}{3}$ lig.

C. niger, pedibus pallidis, ovorum insectorum.

Loc. Larva habitat ova papilionum, &c.

26. C. aphidum.

Le Cinips de l'ichneumon des pucerons.

Long. $\frac{2}{3}$ lig.

C. niger nitens, pedibus pallidis, ichneumonum aphidum.

Loc. Larva habitat aphides & ichneumonem aphidum.

* 27. C. bifasciatus.

Le Cinips à bandes sur les aîles.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

C. nigro-viridis nitens, pedibus fuscis, alarum fasciis duabus transversis nigris.

Loc.

FAMIL. II. *Antennarum articuli septem.*

28. C. foliorum.

Le Cinips des feuilles sans galle.

Long. $\frac{3}{4}$ lig.

C. foliorum sine gallâ, totus nigro-viridis nitens.

Loc. Larva vel chrysalis foliis adhæret.

29. C. gregarius.

Le Cinips du roſier, ſans galle.

Long. $\frac{2}{3}$ lig.

C. roſæ, ſine gallâ, totus niger.

Loc. Chryſalis fol. roſæ ſubtus adhæret.

30. C. circularis.

Le Cinips du chêne, ſans galle.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

C. quercûs ſine gallâ, totus viridi-aureus pedibus flavis.

Loc. Chryſalis fol. ilicis ſubtus adhæret.

31. C. eulophus.

Le Cinips à antennes rameuſes, ſans galle.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

C. viridis nitens, antennis ramoſis pallidis.

Loc. Chryſalis foliis tiliæ ſubtus adhæret.

32. C. tripunctatus.

Le Cinips à aîles pointillées.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

C. nigro-viridis nitens, alis punctis tribus nigris.

Loc.

33. C. antiquus.

Le Cinips vert bronzé à pattes blanches.

Long. $\frac{2}{3}$ lig.

C. viridis nitens, pedibus albido flavis.

Loc.

34. C. albipes.

Le Cinips noir à pattes blanchâtres.

Long. 1 lig.

C. nigro nitens, pedibus pallidis.

Loc.

35. C. crassipes.

Le Cinips brun à grosses cuisses.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

C. fuscus, femoribus clavatis.

Loc.

LXXXVII. DIPLOLEPIS. *LE DIPLOLÈPE.*

Antennæ filiformes longæ articulis quatuordecim.

Alæ inferiores breviores.

Os maxillosum.

Aculeus ani conicus intra valvas abdominis.

Abdomen ovatum, ad latera compressum, subtus acutum, petiolo brevi thoraci connexum.

1. D. quercus.

Le Diplolèpe de la galle ronde & dure du chêne.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

D. fuscus, gallæ, globosæ, glabræ & duræ foliorum quercûs.

Loc. Habitat gallam rotundam & glabram inferioris foliorum quercûs superficiei.

2. D. rosæ.

Le Diplolèpe du bedeguar.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

D. bedeguaris niger, abdomine ferrugineo apice nigro, pedibus rufis.

Loc. Habitat bedeguarem rofæ.

3. D. bedeguaris.

Le Diplolèpe de la galle fongueufe & liffe du rofier.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

D. bedeguaris levis fungofi, fufcus oculis nigris.

Loc. Idem.

4. D. niger.

Le Diplolèpe noir à ventre brun & antennes noires.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{5}$ lig.

D. niger, abdomine fufco lucido, pedibus rufis, antennis nigris.

Loc.

5. D. fufcus.

Le Diplolèpe brun à ventre luifant & antennes brunes.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

D. fuſcus, abdomine lucido, pedibus rufis, antennis fuſcis.

Loc.

6. D. flavipes.

Le Diplolèpe à pattes jaunes.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

D. totus niger, pedibus flavis.

Loc.

LXXXVIII. ICHNEUMON. *L'ICHNEUMON.*

Antennæ filiformes, longæ vibratiles.
Alæ inferiores breviores.
Os maxilloſum.
Aculeus ani triplex.
Abdomen petiolo tenui longo thoraci connexum.
Ocelli tres.

1. I. globatus.

L'Ichneumon à coton blanc.

Long. 1 lig.

I. ſerico conglobato albo.

Loc. Habitát ſericum album herbis pratorum inhærentem.

2. I. glomeratus.

L'Ichneumon à coton jaune.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig.

I. ſerico conglobato flavo.

Loc. Habitat larvam papilionis braſſicæ.

3. I. alveariformis.

L'Ichneumon à coques en forme de rayons de ruche.

I. ſerico alveari-formi.

Loc. Habitat ſericum alveariformem.

4. I. aphidum.

L'Ichneumon des pucerons.

Long. 1 lig.

I. aphidum.

Loc. Larva aphides perforat & occidit, ipſam cynips terebrat.

5. I. manifeſtator.

L'Ichneumon à longue queue.

Long. 10 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

I. ater, pedibus rufis, ſetis ani corpore duplo longioribus.

Loc. Habitat ſylvas.

6. I. ſetoſus.

L'Ichneumon noir à queue de la longueur du corps & ventre liſſe.

Long. 7 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

I. ater, pedibus rufis, ſetis ani longitudine corporis, abdomine lævi.

Loc. Habitat arbores.

7. I. tuberculatus.

L'Ichneumon à queue de la longueur du corps & ventre à tubercules.

Long. 6 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. ater, pedibus rufis, ſetis ani longitudine corporis, abdomine tuberculis lateralibus.

Loc. Idem.

8. I. compunctor.

L'Ichneumon à pattes fauves & courte queue.

Long. 6 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. ater, pedibus rufis, ſetis ani corpore triplo brevioribus, abdomine fere ſeſſili.

Loc. Habitat chryſalides papilionum.

9. I. petiolatus.

L'Ichneumon à pattes fauves & ventre en filet.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. ater, pedibus rufis, ſetis ani corpore triplo brevioribus, abdominis baſi tenui longa petiolatu.

Loc.

10. I. frontalis.

L'Ichneumon noir à pattes fauves & devant de la tête jaune.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, pedibus rufis, fronte flava.

Loc.

11. I. femoralis.

L'Ichneumon noir à pattes brunes & groſſes cuiſſes.

Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, pedibus ferrugineis, femoribus posticis crassis globosis.

Loc. Habitat vitra domorum.

12\. I. ruspator.

L'Ichneumon à pattes brunes & grosses cuisses dentelées.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, pedibus ferrugineis, femoribus posticis crassis denticulo armatis.

Loc.

13\. I. geniculatus.

L'Ichneumon noir à pattes fauves & genoux blancs.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, pedibus rufis, genibus annulo albo.

Loc.

14\. I. inguinalis.

L'Ichneumon noir à pattes fauves & point blanc à la base des cuisses.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, pedibus rufis, femorum basi puncto albo.

Loc.

15. I. albipes.

L'Ichneumon noir à pattes blanchâtres.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. niger, pedibus albidis, alarum puncto nigro.

Loc. Habitat flores cirsii.

16. I. jaculator.

L'Ichneumon tout noir à pattes postérieures très-longues & grosses.

Long. 6 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. totus niger, tibiis posticis clavatis abdomine longo, tenui, falcato.

Loc.

17. I. annularis.

L'Ichneumon noir à pattes postérieures grosses & milieu du ventre fauve.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, tibiis poſticis clavatis, abdomine tenui falcato circa medium fulvo.

Loc.

18. I. craſſipes.

L'Ichneumon noir à pattes fauves très-groſſes & tachetées.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, femoribus poſticis craſſiſſimis fulvis puncto albido.

Loc.

19. I. falcatus.

L'Ichneumon noir à pattes fauves, à cuiſſes poſtérieures groſſes & ventre en faucille.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. niger, tibiis rufis, femoribus poſticis clavatis, abdomine longo falcato.

Loc.

20. I. crocatus.

L'Ichneumon jaune à tête & corcelet noirs avec la pointe jaune.

Long. 10 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

I. luteus, capite thoraceque fuſco apice flavo.

Loc.

21. I. luteus.

L'Ichneumon jaune à ventre en faucille.

Long. 10 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

I. luteus totus.

Loc.

22. I. melanocephalos.

L'Ichneumon à tête & corcelet noirs, & à ventre jaune en faucille.

Long. 9 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. capite thoraceque nigris, antennis pedibus abdomineque falcato, luteis.

Loc.

23. I. ramidulus.

L'Ichneumon jaune à corcelet noir en deſſous & extrêmité du ventre noire.

Long. 8 lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

I. luteus, oculis, thorace infra, abdominisque falcati apice nigris.

Loc.

24. I. pugillator.

L'Ichneumon noir à pattes & milieu du ventre citron.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, abdomine falcato, pedibus abdominisque medio flavis.

Loc.

25. I. virgatus.

L'Ichneumon jaune à corcelet rayé.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

I. luteus, thoracis fasciis tribus longitudinalibus fuscis.

Loc. Habitat ilicem.

26. I. obscurus.

L'Ichneumon brun à tête & bout du ventre noirs.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. fuscus, capite adominisque apice nigris.

Loc.

27. I. apicarius.

L'Ichneumon jaune à pointe du co. celet noire.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. flavo-ferrugineus, apice thoracis nigr

Loc.

28. I. ſcutellatus.

L'Ichneumon fauve à taches noire & pointe du corcelet jaune.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

I. flavo, rufo, nigroque variegatus, tho racis apice flavo.

Loc. Habitat larvas papilionum.

29. I. melanopteros.

L'Ichneumon brun à taches noire & aîles noirâtres.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. fuſcus, nigro maculatus, alis nigris

Loc.

30. I. linearis.

L'Ichneumon fauve à taches noires & aîles croisées.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

I. linearis rufus nigro maculatus, alis albis cruciatis.

Loc.

31. I. punctatus.

L'Ichneumon noir à petites taches jaunes.

Long. 7 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, fronte punctisque humerorum flavis.

Loc.

32. I. citratus.

L'Ichneumon noir à ventre tacheté de citron sur les côtés.

Long. $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. atro-cœrulescens, abdominalibus segmentis utrimque maculâ flavâ.

Loc.

33. I. binarius.

L'Ichneumon noir chagriné à pattes fauves & deux taches jaunes sur le ventre.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. ater, punctatus, pedibus rufis, abdominis basi utrinque maculâ flavâ.

Loc.

34. I. tertiarius.

L'Ichneumon noir à cuisses postérieures fauves & deux taches blanches sur le ventre.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, femoribus posticis rufis abdominis medio utrinque maculâ albâ.

Loc.

35. I. multicolor.

L'Ichneumon noir à pattes rougeâtres, à corcelet & ventre tacheté de blanc.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, pedibus rufis, thoracis basi linea, apice puncto, albis abdominis segmento 1°. punctis duobus, 2°. margine albis.

Loc.

36. I. globulifer.

L'Ichneumon noir à plaque de poils bruns sur le ventre.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

I. ater, alis extremo fuscis, abdominis apice villoso ferrugineo.

Loc. Habitat larvas phalænarum.

37. I. bifasciatus.

L'Ichneumon noir à deux bandes sur les aîles.

Long. 3 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, alis fasciâ duplici transversâ nigrâ.

Loc.

38. I. niger.

L'Ichneumon tout noir.

Long. 1 lig.

I. totus niger.

Loc.

39. I. comitator.

L'Ichneumon noir à anneaux blancs aux antennes.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

I. totus niger, antennis medio albis.

Loc. Larva habitat nidum vefparum.

40. I. funereus.

L'Ichneumon noir, avec la pointe du corcelet & le milieu des antennes blancs.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

I. niger, thoracis apice antennarumque medio albis.

Loc.

41. I. dumetorum.

L'Ichneumon noir à cuiffes rougeâtres & anneau blanc aux antennes.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. ater, femoribus teſtaceis, antennis medio albis.

Loc. Habitat dumeta.

. I. ſpiralis.

L'Ichneumon noir à pattes rougeâtres & anneau blanc aux antennes.

Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. ater, pedibus rufis, tibiis poſticis apice nigris, antennis medio albis.

Loc.

. I. punctulatus.

L'Ichneumon à points.

Long. 6 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 lig.

I. niger, pedibus abdominiſque anticâ parte ſuperne rufis, antennis medio albis.

Loc.

. I. tibialis.

L'Ichneumon noir à pattes rougeâtres, à taches blanches ſur les jambes & anneau blanc aux antennes.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, pedibus rufis, tibiis antennisqu
medio albis.

Loc.

45. I. tarsosus.

L'Ichneumon à pattes rougeâtr
avec le milieu des tarses & de
antennes blanc.

Long. 4 lig.

I. niger, pedibus rufis, tarsis postic
antennisque medio albis.

Loc.

46. I. articulatus.

L'Ichneumon noir, à pattes rou
geâtres, avec les genoux & l
milieu des antennes blancs.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, pedibus rufis, geniculis anten
narumque medio albis.

Loc.

47

47. I. abdominalis.

L'Ichneumon noir à ventre & jambes fauves, & anneau blanc aux antennes.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, abdomine toto ferrugineo antennis annulo albo.

Loc.

48. I. ani.

L'Ichneumon noir à ventre fauve vers le bas & anneau blanc aux antennes.

Long. 6 $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, abdomine pone ferrugineo antennis medio albis.

Loc.

49. I. upſalienſis.

L'Ichneumon noir à pattes fauves & anneau blanc aux antennes.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, abdomine ferrugineo apice nigro, antennis annulo albo.

Loc.

50. I. tripunctatus.

L'Ichneumon noir à bande fauve sur le ventre avec la pointe du corcelet & anneau des antennes blancs.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

I. niger, abdomine antice ferrugineo, postice nigro punctis tribus albis, thoracis apice annuloque antennarum albo.

Varietas A. I. femoribus omnibus nigris.

B. I. femoribus nigris, tibiisque omnibus basi albis, apice nigris.

Loc. Habitat sylvas.

51. I. dictator.

L'Ichneumon noir à ventre fauve en devant & à anneaux blancs aux pattes & aux antennes.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, abdomine ferrugineo, apice nigro, tibiis antennisque annulo albo.

Loc.

52. I. peregrinator.

L'Ichneumon noir à ventre fauve en devant, noir postérieurement & terminé de blanc, & à anneau blanc aux antennes.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. abdomine ferrugineo, pone nigro, apice albo; antennis medio albis.

Loc.

53. I. vorax.

L'Ichneumon panaché de noir & citron à anneau blanc aux antennes.

Long. 7 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

I. niger, thoracis apice, abdominis medio pedibusque flavo variegatis, antennis medio albis.

Loc.

54. I. palmarius.

L'Ichneumon à pointe du corcelet blanche & pattes panachées de blanc.

Long. 7 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, fronte, thoracifque apice albis, tibiis palmifque albo variegatis.

Loc.

55. I. conftellatus.

L'Ichneumon noir à pointe du corcelet & taches du ventre blanches.

Long. 6 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

I. niger, pedibus ferrugineis, thorac apice maculifque abdominis quauc albis, antennarum medio albo.

Loc.

56. I. fufcipes.

L'Ichneumon noir à pieds rouge tres & pointe du corcelet bla che.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, pedibus ferrugineis, apice tl racis albo.

Loc.

57. I. ſcirpi.

L'Ichneumon noir à pointe du corcelet & bout du ventre blancs.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, pedibus ferrugineis, thoracis abdominiſque apice albo.

Loc. Larva habitat ſcirpum paluſtrem.

58. I. junci.

L'Ichneumon noir à pointe du corcelet jaune avec les pattes & le milieu du ventre fauves.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

I. niger, fronte thoraciſque apice flavis, pedibus abdominiſque medio ferrugineis.

Loc. Larva habitat juncum.

59. tiphæ.

L'Ichneumon noir à antennes pattes & milieu du ventre fauves.

Long. 5 lig.

I. niger, fronte flavâ, antennis pedibus abdominiſque medio ferrugineis.

Loc. Larva habitat tipham.

60. I. compreſſus.

L'Ichneumon noir à pointe du corcelet, partie des pattes & milieu du ventre fauves.

Long. 4 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, fronte, thoracis apice, tibiis ex parte abdominiſque medio flavis.

Loc.

61. I. marginalis.

L'Ichneumon noir à pointe du corcelet jaune & partie antérieure du corcelet fauve.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, thoracis apice flavo, humeris pedibuſque ferrugineis, ſegmentis abdominalibus margine albidis.

Loc.

62. I. interſectus.

L'Ichneumon arlequin.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, fronte, thoracis apice pedibus abdomineque ſupra flavis, thorace flavo maculato.

Loc.

63. I. curtatus.

L'Ichneumon noir à ventre fauve en devant & court pédicule.

Long. 5 ½ lig. Larg. 1 lig.

I. niger, abdomine antice fulvo, petiolo brevi.

Loc.

63. I. Friſchii.

L'Ichneumon noir à ventre fauve en devant & à long pédicule.

Long. 10 lig. Larg. 1 ¼ lig.

I. niger, abdomine fulvo, poſtice nigro petiolo longiſſimo.

Loc.

65. I. conſtrictus.

L'Ichneumon noir à ventre fauve en devant & tarſes antérieurs blancs.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, abdomine antice rufo, poſtice nigro, palmis anticis albis.

Loc.

66. I. nemoralis.

L'Ichneumon noir à ventre fauve au milieu & pieds de derrière blancs.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, abdominis medio pedibuſque anterioribus rufis, palmis poſticis albis.

Loc.

67. I. trochantericus.

L'Ichneumon noir à pattes & milieu du ventre fauves, & pieds de derrière noirs.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

I. niger, abdominis medio, pedibuſque rufis, palmis poſticis nigris.

Loc.

68. I. ſcanicus.

L'Ichneumon noir à pattes poſtérieures panachées.

Long. 3 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, pedibus ferrugineis, tibiis posticis albo nigroque variegatis.

Loc. Habitat sylvas.

69. I. Plæsseus.

L'Ichneumon à anneaux du ventre rougeâtres & pattes postérieures panachées.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. niger, pedibus segmentorumque abdominis margine ferrugineis, tibiis posticis albo nigro fulvoque variegatis.

Loc.

70. I. coccineus.

L'Ichneumon noir à ventre couleur de cerises.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, abdomine coccineo.

Loc. Habitat sylvas.

71. I. rubicundus.

L'Ichneumon noir à corcelet & ventre rouges.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, thorace abdomineque rubris.

Loc.

72. I. cruentatus.

L'Ichneumon à corcelet tacheté de rouge en devant.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger punctatus, capite thoraceque antice rubro maculatis, pedibus fuscis.

Loc.

73. I. fumosus.

L'Ichneumon noir à pattes & corcelet en devant de couleur brune.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. niger lævis, thorace antice pedibusque fuscis.

Loc. Larva devorat ova aranearum.

74. I. sessilis.

L'Ichneumon noir avec les deux anneaux antérieurs du ventre rougeâtres & les aîles noires.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. ater, abdomine subsessili segmentis duobus anticis rufis, alis nigricantibus.

Loc.

75. I. viaticus.

L'Ichneumon noir avec les trois anneaux antérieurs du ventre rougeâtres & les aîles noires.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

I. ater, abdomine ſubſeſſili ſegmentis tribus anticis rufis, alis nigricantibus.

Loc. Habitat larvas papilionum quas in terram deponit.

76. I. ochrocephalos.

L'Ichneumon noir à ventre & tête jaunes.

Long. 2 $\frac{3}{4}$ lig Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. nigro, abdomine capiteque flavis alis nigricantibus.

Loc.

77. I. poſticus.

L'Ichneumon noir à pattes & partie ſupérieure du ventre rougeâtres.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. niger, pedibus abdominiſque poſticâ parte ferrugineis.

Loc.

78. I. anticus.

L'Ichneumon noir à pattes & partie antérieure du ventre rougeâtres.

Long. $\frac{3}{4}$ lig.

I. niger, pedibus abdominiſque anticâ parte ferrugineis.

Loc.

79. I. labialis.

L'Ichneumon noir à ventre & pattes fauves & lèvre jaune.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger fronte flavâ, pedibus ferrugineis, abdomine rufo apice nigro.

Loc.

80. I. teniola.

L'Ichneumon noir à long filet, pattes & partie antérieure d ventre fauves.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger fronte flavâ, pedibus ferrugineis, abdomine rufo, poſtice nigro, petiolo tenui longo.

Loc.

81. I. inculcator.

L'Ichneumon noir à pattes & ventre fauves.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

I. niger, pedibus abdomineque ferrugineis.

Loc.

82. I. urticæ.

L'Ichneumon noir à antennes, pattes & ventre fauves.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, antennis pedibus abdomineque ferrugineo-fuſcis, ſetis ani corpore paulo longioribus.

Loc.

83. I. cepæ.

L'Ichneumon noir à pattes & milieu du ventre fauves.

Long. 3 lig.

I. niger, pedibus abdominiſque medio ferrugineis.

Loc Habitat cepam, porrum, allia.

84. I. pupparum.

L'Ichneumon noir à pattes antérieures pâles, poſtérieures & milieu du ventre fauves.

Long. 2 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. ater, pedibus anticis pallidis, femoribus poſticis abdominiſque medio ferrugineis.

Loc. Habitat puppas papilionum.

85. I. inverſus.

L'Ichneumon noir à pattes antérieures citronnées & ventre fauve en deſſous.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

I. niger, pedibus quatuor anticis luteis, abdomine ſubtus fulvo.

Loc.

86. I. cinctus.

L'Ichneumon à deux bandes sur les aîles.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. niger, alis albis, fasciâ duplici nigrâ, posteriore majore.

Loc. Habitat vitra domorum.

87. I. extensor.

L'Ichneumon brun à filet.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

I. linearis, antennis longitudine corporis tentaculis setaceis, femoribus clavatis.

Loc. Idem.

88. I. albus.

L'Ichneumon blanc.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. linearis albus, fusco maculatus, abdominis petiolo tenui longo.

Loc. Habitat folia quercûs, rarus.

89. I. acicularis.

L'Ichneumon à aiguillette.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{6}$ lig.

I. linearis fuſcus, capite abdominiſque apice nigris, antennis corpore longioribus.

Loc.

90. I. aranearum.

L'Ichneumon à anneaux ſur le ventre & femelle ſans aîles.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

I. niger, pedibus abdominiſque annulo duplici ferrugineis. *Maſc.*

I. apterus fulvus, capite antennarum apice abdominiſque faſciâ duplici tranſversâ nigris. *Femina.*

Loc. Habitat nidos aranearum.

91. I. carpini.

L'Ichneumon à pattes variées de fauve & femelle ſans aîles.

Long. 1 lig.

I. niger, pedibus rufis geniculis fuſcis; fæminâ apterâ.

Loc. Habitat dumeta.

92. I. apterus.

L'Ichneumon noir à pattes & baſe des antennes fauves & femelle ſans aîles.

Long. 2 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

I. niger, pedibus antennarumque baſi ferrugineis; fæminâ apterâ.

Loc.

93. I. bedeguaris.

L'Ichneumon du bedeguar.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

I. bedeguaris niger, pedibus abdominiſque medio ferrugineis.

Loc. Habitat bedeguarem roſæ.

94. I. vittatus.

L'Ichneumon à bande jaune.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. fulvus, antennis pedibuſque nigris, alis atris faſciâ tranſverſâ luteâ.

Loc.

* 95. I. rusticus.

L'Ichneumon à pattes fauves & pieds noirs.

Long. 6 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig

I. niger, pedibus rufis, setis ani corpore duplo brevioribus, tibiis posticis nigris.

Loc.

* 96. I. quadripes.

L'Ichneumon chaussé de blanc.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. niger, abdomine falcato, palmis quatuor anticis albis.

Loc.

* 97. I. basilaris.

L'Ichneumon basilaire.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, humeris thoracis apice pedibus abdominisque basi flavo maculatis; antennis medio albis.

Loc.

* 98. I. poplitæus.

L'Ichneumon à jarretières.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, abdomine ferrugineo, pedibus geniculis albis, antennis annulo albo.

Loc.

99. I. cœleſtis.

L'Ichneumon céleſte étoilé.

Long. 7 ½ lig. Larg. 1 ½ lig.

I. niger, abdomine ferrugineo baſi nigrâ, tibiis fulvis thoracis apice antennarumque medio albis.

Loc.

100. I. flavipes.

L'Ichneumon à ventre fauve & pattes jaunes.

Long. 4 lig. Long. 1 lig.

I. niger, abdomine ferrugineo pedibus flavis.

Loc.

101. I. arlequinatus.

L'Ichneumon à pattes arlequinées.

Long. 3 ½ lig. Larg. ⅔ lig.

I. niger, ſegmentis abdominalibus margine fulvis, pedibus ferrugineis annulis albis.

Loc.

* 102. I. ſignatus.

L'Ichneumon à raies blanches.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

I. fulvus, capite thoraceque ſupra nigris, albis ſetis corpus æquantibus.

Loc.

* 103. I. ſegmentoſus.

L'Ichneumon à baſe du ventre rouge.

Long. 4, 5 lig. Larg. $\frac{3}{4}$, 1 lig.

I. ater, alis nigris ſegmentis abdominalibus 1°, 2° & 3° rubris margine luteis.

Loc.

* 104. I. petiolatus.

L'Ichneumon à bande transverſe.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

I. fulvo fuſcoque variegatus, abdominis petiolo tenui, alis faſciá tranſversâ fuſcâ.

Loc.

* 105. I. faſciatus.

L'Ichneumon faſcié.

Long. 9 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

I. ater, antennis pedibusque flavis, segmentis abdominalibus margine luteis.

Loc.

106. I. bipartitus.

L'Ichneumon à ventre mi-parti.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

I. niger, antennarum medio, thoracisque apice flavis, pedibus fulvis, abdomine antice fulvo fasciâ nigrâ, postice nigro fasciâ flavâ.

Loc.

LXXXIX. VESPA. *La Guepe.*

Antennæ fractæ, articulo primo longiore.

Alæ inferiores breviores.

Os maxillosum, lingua membranacea inflexa.

Aculeus ani simplex subulatus.

Abdomen petiolo brevissimo thoraci connexum.

Ocelli tres.

Corpus glabrum.

1. V. crabro.

La Guêpe-frelon.

Long. 1 pouce. Larg. 4 lig.

V. thorace nigro, antice rufo immacu-
lato, abdominis incisuris puncto nigr
duplici contiguo.

Loc. Nidificat in truncis cavis arborum.

2. V. vulgaris.

La Guêpe commune.

Long. 8 lig. Larg. 2 ½ lig.

V. thorace lineolis trium parium differen-
tium flavescentium *

* Punctis incisurarum nullis. *Masc.*

* Punctis nigris inci-
surarum liberis.
Fœmina.

Varietas A. V. thorace lineolis triu-
parium differentium fl-
vescentium, punctis n-
gris incisurarum co-
nexis.

B. V. thorace lineolis quatu-
parium differentium fl-
vescentium, punctis n-
gris incisurarum co-
nexis.

C. V. thorace lineolis quinque parium differentium flavescentium, punctis nigris incisurarum connexis.

D. V. thorace lineolis duorum parium differentium flavescentium, punctis nigris incisurarum connexis.

Loc. Habitat domos.

3. V. arvensis. V. diversa

La Guêpe à anneaux bordés de noir.

Long. 5 ½ lig. Larg. 1 ½ lig.

V. nigra, abdomine flavo, segmentis margine nigris.

Varietas A. V. nigra, thorace punctis octo luteis, singulis segmentis abdominalibus fasciis transversis luteis, primis interruptis.

B. V. nigra, thorace puncti decem luteis, singuli segmentis abdominali bus fasciis transvers luteis.

C. V. nigra, thoracis basi li neolis duabus flav apice lineâ flavâ, sin gulo segmento abdom nali fasciâ transver luteâ, secundâ & te tiâ interruptâ.

D. V. nigra, thoracis basi l neolis duabus flavi apice lineâ flavâ, si gulo segmento abdom nali fasciâ transversâ l teâ, quatuor primis i terruptis.

E. V. nigra, thoracis basi l neolis duabus flavi apice lineâ flavâ, si gulo segmento abdon nali excepto 1° & fasciâ transversâ lut

Loc. Habitat arva.

4. V. fafciata. V. limbata

La Guêpe à anneaux bordés de jaune.

Long. 5 lig. Larg. $1 \frac{1}{2}$ lig.

V. nigra, fegmentis abdominalibus margine flavis.

Loc. Habitat flores in hortis.

5. V. bimaculata. V. gallica

La Guêpe à anneaux bordés de jaune, & deux taches jaunes.

Long. $5 \frac{1}{2}$ lig. Larg $1 \frac{1}{3}$ lig.

V. nigra, thoracis maculis quindecim flavis, fegmentis abdominalibus margine luteis, fecundo maculâ utrinque flavâ.

Loc. Habitat alveos confertim petiolis arborum adhærentes.

6. V. longicornis. bon

La Guêpe à longues antennes, & quatre bandes noires fur le ventre.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

V. thorace nigro maculis flavis, abdomine flavo, faſciis quatuor nigris, antennis longis.

Loc.

7. V. infundibuliformis.

La Guêpe à premier anneau du ventre en poire & trois bandes jaunes.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

V. nigra, abdomine faſciis tribus flavis, tertiâ remotiſſimâ, primo articulo infundibuliformi.

Loc.

8. V. globuloſa.

La Guêpe à premier anneau du ventre en poire & cinq bandes jaunes.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

V. nigra, abdomine faſciis quinque flavis, primo articulo infundibuliformi.

Loc.

9. V. parietum.

La Guêpe à cinq bandes jaunes ſur le ventre, la première éloignée des autres.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

V. nigra, abdomine faſciis quinque flavis, primâ remotiſſimâ.

Loc. Habitat parietes.

10. V. coarctata.

La Guêpe à premier anneau du ventre en poire, & le ſecond en cloche.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

V. nigra, abdominis articulo primo infundibuliformi, ſecundo campanulato maximo.

Loc. Habitat nidum terreum ericis inhærentem.

11. V. ordinata.

La Guêpe noire à raies de points jaunes ſur le ventre.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

V. nigra, abdomine punctorum flavorum ordine quadruplici longitudinali.

Loc.

12\. V. quadri-punctata. V. 4 guttata

La Guêpe noire à premier anneau du ventre bordé de jaune avec deux points ſur le ſecond & le troiſième.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

V. nigra, abdominis ſegmento primo margine flavo, ſecundo & tertio puncto duplici luteo.

Loc.

13\. V. guttata. V. quadrum

La Guêpe noire à quatre points blancs ſur le ventre.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

V. nigra, abdominis ſegmentis primo & ſecundo utrinque puncto albo, pedibus ferrugineis.

Loc.

14. V. pratenſis.

La Guêpe noire à lèvre ſupérieure & baſe du corcelet jaunes.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

V. nigra, fronte, thoraciſque baſi flavis.

Varietas A. V. nigra, fronte flava.

Loc. Habitat flores.

15. V. femoralis.

La Guêpe noire à cuiſſes poſtérieures fort groſſes.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

V. nigra, femoribus poſticis globoſis ſerratis, tibiis arcuatis alarum, baſi genubuſque flavis.

Loc. Idem.

16. V. dearticulata.

La Guêpe deginguendée.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig.

V. femoribus poſticis craſſis, globoſis, ſerratis, denticulo donatis; abdominis globoſi petiolo tenui longo.

Loc. Habitat aquatica loca.

17. V. nigra. *bon*

La Guêpe noire.

Long. 3 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

V. tota nigra cœrulefcens.

Loc.

18. V. rubra. *bon*

La Guêpe rouge à bandes noire[s] fur le corcelet & points jaune[s] fur le ventre.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

V. rubra, thorace lineolis longitudina[-]libus nigris, abdomine maculis flavi[s]

Loc.

19. V. finuata.

La Guêpe finuée.

Long. 7 lig. Larg. 2 $\frac{1}{3}$ lig.

V. nigra, pedibus flavis, thoracis ba[...] lineâ viridi, abdomine fafciis quatu[or] undulatis viridibus, primâ interrupt[â]

Loc.

20. V. interſecta.

La Guêpe entrecoupée.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

V. nigra, pedibus flavis, thorace faſciis quatuor baſi & apice lineis flavis, abdomine faſciis ſeptem undulatis flavis interruptis.

Loc.

21. V. petiolata.

La Guêpe à cordons.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

V. nigra, thoracis baſi & apice flavis, abdomine petiolato faſciis tribus luteis, tertiâ remotiſſimâ.

Loc.

22. V. fulvipes.

La Guêpe à pattes fauves.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

V. nigra, pedibus flavis, thorace punctis quatuor luteis, ſegmentis abdominalibus faſciis luteis, primis duabus interruptis.

Loc.

23. V. capitata.

La Guêpe à groſſe tête.

Long. 6 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

V. nigra, pedibus flavis, abdomine faſciis luteis, capite quadrato thorace latiori.

Loc.

24. V. carbunculus.

La Guêpe dorée à corcelet mi-parti de rouge & de vert.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

V. viridi-cœrulea, abdomine thoraciſque anticâ parte ruberrimis.

Loc.

25. V. ignita.

La Guêpe dorée à corcelet vert & derniers anneaux du ventre épineux.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

V. thorace viridi cœruleo, abdomine inaurato, pone cupreo dentato.

Loc. Habitat lapidum intervalla.

26. V. aurata.

La Guêpe dorée à corcelet vert & derniers anneaux du ventre lisses.

Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

V. thorace viridi-cœruleo, abdomine aurato-cupreo, pone inermi.

Loc. Idem.

27. V. cuprea.

La Guêpe dorée bleue.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

V. cœrulea nitens.

Loc.

28. V. viridis.

La Guêpe dorée verte.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

V. viridis nitens.

Loc.

29. V. rufescens.

La Guêpe dorée cuivreuse à ventre fauve & noir.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

V. capite thoraceque rubro cupreo, abdomine rufo pone nigro.

Loc.

XC. APIS. *L'Abeille.*

Antennæ fractæ articulo primo longiore.

Alæ inferiores breviores.

Os maxillosum, linguâ membranaceâ inflexâ.

Aculeus ani simplex subulatus.

Abdomen petiolo brevissimo thoraci connexum.

Ocelli tres.

Corpus villosum.

Familia I. *Corpore villoso, apis proprie dicta.*

1. A. mellifera.

L'Abeille domestique ou des ruches.

Long. 6 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

A. gregaria.

Loc.

2. A. nitida.

L'Abeille brune à ventre liſſe & pattes velues.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

A. ſubhirſuta fuſca, abdomine nitido pedibus villoſis.

Loc.

3. A. manicata.

L'Abeille à cinq crochets.

Long. 7 lig. Larg. 2 $\frac{2}{3}$ lig

A. abdomine faſciis flavis interruptis; apice ſpinâ quintuplici recurvâ armato.

Loc. Habitat flores.

4. A. parietina.

L'Abeille maçonne à poils roux.

Long. 7 lig. Larg. 2 $\frac{2}{3}$ lig.

A. nigra, thorace abdominiſque baſi ſuperne lanâ rufâ.

Loc. Habitat parietes euro oppoſitos.

5. A. centuncularis.

L'Abeille charpentière à ventre velu & roux en deſſous.

Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

A. nigra, abdomine ſupra lineis albis ſubtus lanâ flavâ.

Loc. Habitat lignum, arbores exæſas.

6. A. hirta.

L'Abeille fauve à ventre cuivreux.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

A. nigra, hirſutie-flava, abdomine ſupra glabro nitente cupreo.

Loc.

7. A. fodiens.

L'Abeille mineuſe à corcelet roux & velu.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

A. nigra, thorace hirſuto fulvo, abdomine glabro inciſuris albis.

Loc. Terram fodit.

8. A. cinerea.

L'Abeille griſe.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

A. nigra hirſutie cinerea.

Loc. Habitat terræ ſectiones verticales.

9. A. inciſa.

L'Abeille griſe à lèvre jaune & à houppe aux pattes du milieu.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

A. nigra, hirſutie cinerea, fronte flavâ inciſuris abdominalibus albis.

Loc.

10. A. longicornis. Eucera long. & 2-tuberculata } Walk.

L'Abeille à longues antennes.

Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

A. hirſutie flaveſcens, fronte flavâ, antennis articulatim compreſſis corpus æquantibus.

Loc.

11. A. terreſtris.

L'Abeille à lèvre jaune & anneaux du ventre blanchâtres.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

A. ſubhirſuta cinerea, abdomine nigro, ſegmentis albidis, fronte flaveſcente.

Loc. Terram fodit horiſontaliter.

12. A. agreſtis.

L'Abeille à lèvre & pattes jaunes & anneaux du ventre fauves.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

A. hirſutie cinerea, pedibus labioque ſuperiore flaveſcentibus; abdomine glabro nigro inciſuris rufis.

Loc.

13. A. hortenſis.

L'Abeille à pattes jaunes & anneaux du ventre blancs.

Long. 7 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

A. hirſuta, pedibus croceis, abdomine nigro, inciſuris albis.

Loc. Habitat flores in hortis.

14. A. crocipes.

L'Abeille à pattes jaunes & ventre un peu cuivreux.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. nigra, pedibus croceis, abdomine leviter cupreo.

Loc. Idem.

15. A. cuprea.

L'Abeille verdâtre & cuivreuſe.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

A. tota viridi-cuprea.

Loc.

16. A. muraria.

L'Abeille bleuâtre à aîles nébuleuſes.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

A. nigro - cœruleſcens, alis nebuloſis, fronte femoribuſque poſticis hirſutie flavis.

Loc. Nidificat in vetuſtis muris.

17. A. rufeſcens.

L'Abeille noire à ventre brun & liſſe.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

A. nigra, abdomine rufo nitido, apice nigro.

Loc.

18. A. obſcura.

L'Abeille noire à ventre brun & anneaux noirs.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

A. nigra, abdomine rufo nitido, incisuris nigris.

Loc.

* 19. A. interrupta.

L'Abeille à houppes blanches.

Long. 4 lig. Larg. 1 ½ lig.

A. nigra, segmentis abdominalibus fasciis albis, pilosis interruptis, alis nigris punctis albis.

Loc.

FAMILIA II. *Corpore hirsutissimo, apis bombilius.*

20. A. violacea.

L'Abeille perce-bois.

Long. 10 lig. Larg. 3 ½ lig.

A. hirsuta atra, alis violaceis.

Loc. Habitat ligna exæsa.

21. A. subterranea.

L'Abeille noire à ventre brun vers l'extrêmité.

A. hirsuta atra, ano fusco.

Loc. Terram fodit.

22. A. lapidaria.

L'Abeille noire avec les derniers anneaux du ventre fauves.

A. hirſuta atra, ano fuſco.

Loc. Habitat lapidem.

23. A. coronata.

L'Abeille noire à couronne du corcelet citron, & extrémités du ventre fauves.

Long. 6 lig. Larg. 2 ½ lig.

A. nigra, fronte baſique thoracis flavis, ano fulvo.

Loc.

124. A. regalis.

L'Abeille noire à couronne du corcelet & haut du ventre citron & l'extrémité du ventre fauve.

Long. 6 lig Larg. 2 ½ lig.

A. nigra, thoracis abdominiſque baſi flavâ, ano fulvo.

Varietas. A. flava, abdominis medio nigro, ano fulvo.

Loc.

25. A. virginalis.

L'Abeille à couronne du corcelet & haut du ventre citron, & l'extrémité du ventre blanche.

Long. 7 lig. Larg. 4 lig.

A. nigra, thoracis abdominiſque baſi flavâ, ano fulvo.

Loc.

26. A. hypnorum.

L'Abeille à couronne & extrêmités du corcelet & haut du ventre citron, & l'extrémité du ventre blanche.

Long. 7 lig. Larg. 3 lig.

A. nigra, thoracis baſi & apice, abdominiſque baſi flavis, ano albo.

Loc.

27. A. veſtalis.

L'Abeille à couronne du corcelet citron & extrémité du ventre mi-partie de citron & de blanc.

Long. 10 lig. Larg. 4 lig.

A. nigra, thoracis baſi flavâ, ano ſupra flavo, apice albo.

Loc.

28. A. ruſtica.

L'Abeille noire à ventre fauve.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 lig.

A. nigra, abdomine fulvo.

Loc.

29. A. muſcorum.

L'Abeille fauve à ventre jaune & extrémité fauve.

Long. 5 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

A. thorace fulvo, abdomine fulvo, ano fulvo.

Loc. Nidum pilis intus paleis extus ædificat.

XCI. FORMICA. *La Fourmi.*

Antennæ fractæ, articulo primo longiore.

Alæ inferiores breviores, neutris nullæ.

Os maxilloſum.

Abdomen petiolo brevi thoraci connexum cum ſquamâ intermediâ.

Ocelli tres.

1. F. fuſcoptera.

La grande Fourmi à aîles à moitié brunes.

Long. 7 lig. Larg. 1 lig.

F. nigra, alarum dimidio fuſco.

Loc. Habitat ſylvas.

2. F. flavipes.

La Fourmi noire à antennes & pattes jaunes.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

F. nigra, antennis pedibuſque flavis.

Loc. Habitat hortos.

3. F. maculata.

La Fourmi brune à pattes fauves.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

F. fuſca, pedibus rufis, thorace maculâ flavâ.

Loc. Idem.

4. F. rufa.

La Fourmi brune à corcelet fauve.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

F. fuſca, thorace fulvo.

Loc. Idem.

5. F. fuſca.

La Fourmi toute brune.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

F. fuſca.

Loc.

6. F. nigra.

La Fourmi toute noire.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

F. atra.

Loc.

SECTIO QUINTA.

INSECTA DIPTERA.

XCII. OESTRUS. *L'Oestre.*

Antennæ ſetaceæ è globulo prodeuntes.

Os nullum, puncta tantum tria.

Ocelli tres.

1. O. hæmorrhoidalis.

L'Oeſtre du fondement des chevaux.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

O. villoſus, pallido-flaveſcens, abdominis medio cingulo nigro, apice fulvo.

Loc. Larva habitat inteſtinum rectum equi.

2. O. ovis.

L'Oeſtre des moutons.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

O. cinereus, nigro maculatus & punctatus.

Loc. Larva habitat ſinum frontalem ovium.

3. O. bovis.

L'Oestre des bœufs.

O. thorace flavo, cingulo nigro; alis nigrâ fasciâ, pedibus pallidis.

Loc. Larva habitat cutem boum.

CIII. TABANUS. *Le Taon.*

Antennæ setaceo conicæ è quatuor partibus.

Os proboscide dentibusque connive ventibus.

Ocelli tres.

1. T. bovinus.

Le Taon à ventre jaunâtre & taches triangulaires blanches.

Long. 11 lig. Larg. 4 lig.

T. thorace cinereo; abdomine flavescente segmentis singulis triangulo albo.

Loc. Idem.

2. T. triangularis.

Le Taon gris à taches blanches triangulaires sur le ventre.

Long. 7 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

T. cinereus thorace fasciis longitudinalibus albis, abdominis segmento singulo triangulo maculisque albis.

Loc. Habitat prata.

3. T. albipes.

Le Taon brun à jambes blanchâtres.

Long. 7 lig. Larg. 3 lig.

T. fuscus, tibiis albido-pallidis.

Loc. Idem.

4. T. dichotomus.

Le Taon noir à antennes fourchues.

Long. 7 lig. Larg. 3 lig.

T. totus niger, antennis diochotomis.

Loc. Idem.

5. T. pluvialis.

Le Taon à aîles brunes piquées de blanc.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. fuscus, alis cinereis punctis minutissimis albis.

Loc. Idem.

6.

6. T. interſectus.

Le Taon noir à anneaux du ventre bordés de blanc.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

T. niger, thorace lineis duabus longitudinalibus cinereis, abdominis ſegmentis limbo cinereo.

Loc. Habitat ſylvas.

7. T. bromius.

Le Taon gris à jambes fauves.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. cinereus, tibiis flavis.

Loc.

8. T. cœcutiens.

Le Taon brun à côtés du ventre jaunes & aîles tachetées de noir.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

T. fuſcus, abdominis lateribus pedibuſque flavis, alis maculis flavis.

Loc.

9. T. lateralis.

Le Taon brun à côtés du ventre jaunes & aîles blanches.

T. fuſcus, abdominis lateribus pedibuſque flavis, alis immaculatis albis.

Loc.

10. T. biſaſciatus.

Le Taon à deux bandes noires ſur les aîles.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

T. fuſcus abdomine antice luteo, alarum margine exteriore, faſciiſque duabus tranſverſis nigris.

Loc. Habitat ſylvas humidas.

11. T. marmoratus.

Le Taon à une ſeule bande panachée.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

T. cinereus, abdomine flavo maculis triangularibus nigris, alarum margine exteriore, faſciâque tranſversâ marmoratâ fuſcâ.

Loc. Habitat prata.

XCIV. ASILUS. *L'Asile.*

Antennæ ſetaceo-conicæ quadripartitæ.

Os roſtro ſubulato acuto.

Ocelli tres.

1. A. lanigerus. Bombylius Major

Le Bichon.

Long. 4, 5 lig. Larg. 2 lig.

A. lanigerus, alarum baſi fuſcâ.

Loc. Habitat flores.

2. A. fulvus.

L'Aſile velu de couleur.

Long. 9 lig. Larg. 3 lig.

A. hirſutus ferrugineus, alis fulvis femoribus nigris.

Loc. Habitat prata.

3. A. crabroniformis.

L'Aſile brun à ventre à deux couleurs.

Long. 1 pouce. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

A. ferrugineus, abdominis articulis tribus prioribus atris, posterioribus quatuor flavis.

Loc. Habitat prata humida.

4. A. gilvus.

L'Asile noir à tache fauve sur le ventre.

Long. 10 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

A. niger, abdominis segmentis tribus à tergo rufis.

Loc. Idem.

5. A. ater.

L'Asile tout noir.

Long. 8 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

A. totus niger, subhirsutus, alis atris.

Loc. Habitat ripas amnium.

6. A. undulatus.

L'Asile noir velu à pattes & balanciers fauves & aîles noires ondées.

Long. 7 lig. Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

A. niger hirſutus, tibiis halteribuſque ferrugineis, alis nigro undulatis.

Loc. Habitat prata.

7. A. marmoratus.

L'Aſile noir liſſe, à antennes, cuiſſes & balanciers fauves & aîles ondées de brun.

Long. 7 ½ lig. Larg. 1 ½ lig.

A. niger glaber, antennis, femoribus, halteribus, tibiiſque ſecundi & poſtici paris rufis, alis fuſco undulatis.

Loc. Habitat Fontem-Bellaquæum.

8. A. ælandicus.

L'Aſile noir liſſe à pattes & balanciers fauves, & aîles toutes noires.

Long. 6 ½ lig. Larg. 1 lig.

A. niger glaber, femoribus halteribuſque ferrugineis, alis nigris.

Loc. Habitat ſylvas humidas.

9. A. venofus.

L'Afile noir liffe, à pattes & balanciers fauves & aîles blanches veinées.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

A. niger glaber, femoribus halteribufque ferrugineis, alis albis venis nigris.

Loc. Habitat hortos.

10. A. tarfofus.

L'Afile noir liffe, à pattes fauves & tarfes noirs.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. niger glaber, femoribus tibiifque rufis, alarum puncto marginali nigro.

Loc. Idem.

11. A. marginatus.

L'Afile noir liffe à balanciers blancs & aîles bordées de noir.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{5}$ lig.

A. niger glaber, halteribus albis, alis fubrotundis obfcuris margine nigro.

Loc. Idem.

12. A. gibbofus.

L'Afile à antennes en maffue & aîles brunes.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

A. antennis capite longioribus clavatis acuminatis, nigro rufoque varius, glaber, fegmentis abdominalibus fecundo & tertio margine flavis, alis fufco nebulofis.

Loc. Habitat prata.

13. A. clavicornis.

L'Afile à antennes en maffue, & aîles brunes bordées de blanc.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

A. antennis capite longioribus clavatis acuminatis, nigro rufoque varius, glaber, fegmentis abdominalibus omnibus margine flavis, alis fufcis margine albo.

Loc. Idem.

14. A. Schæfferi.

L'Afile panaché de fauve & de noir à aîles noires.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

A. antennis capite brevioribus clavatis ſetoſis, nigro rufoque varius, glaber, alis nigris, oris aculeo in medio incurvato.

Loc. Habitat prata.

15. A. armatus.

L'Aſile noir liſſe à pattes & devant de la tête fauves.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

A. niger glaber, fronte pedibuſque rufis, oris aculeo in medio incurvato.

Loc. Idem.

16. A. forcipatus.

L'Aſile cendré.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

A. cinereus hirſutus.

Loc. Habitat arva & prata.

17. A. tipuloïdes.

L'Aſile à pattes fauves allongées.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. lividus, thoracis lineis dorſalibus tribus nigris.

Loc. Idem.

18. A. reticulatus.

L'Aſile fauve à aîles réticulées.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

A. pallido-fulvus, thorace lineis dorſalibus tribus nigris, alis incumbentibus reticulatis.

Loc. Habitat arva & prata.

19. A. viridis.

L'Aſile vert doré.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. viridis nitens pedibus albis.

Loc. Habitat flores.

20. A. craſſipes.

L'Aſile noir à pieds de devant en maſſue.

Long. $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

A. niger, pedibus anticis articulo tarſi primo craſſo clavato.

Loc. Idem.

21. A. lacrymoſus.

L'Aſile larmoyant.

Long. 6 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

A. thorace nigro lineis cinereis, abdomine fulvo, maculis nigris longitudinaliter poſitis.

Loc.

* 22. A. fulvopterus.

L'Aſile à aîles fauves.

Larg. 5 lig. Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

A. niger, thorace lineis cinereis, alis fuſcis baſi fulvis.

Loc.

XCV. STRATIOMYS. *LA MOUCHE-ARMÉE.*

Antennæ ſetaceæ fractæ.
Os proboſcide abſque dentibus.
Thóracis apex aculeatus.
Ocelli tres.

FAMIL. I. *Thoracis aculeis duobus.*

1. S. chamæleon.

La Mouche-armée à ventre pla chargé de ſix lunules.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

S. fuſca, thorace ſubhirſuto ferrugineo, abdomine glabro ovato plano, lunulis ſex luteis.

Loc. Larva habitat aquam.

2. S. Schæfferi.

La Mouche-armée à ventre plat & brun.

S. fuſca, thorace hirſuto ferrugineo, abdomine glabro ovato plano immaculato.

Loc. Idem.

3. S. coccinea.

La Mouche-armée à corcelet rouge ſatiné.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

S. nigra, thorace ſericeo rubro utrinque ſpinoſo.

Loc.

4. S. hydroleon.

La Mouche-armée à ventre vert.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

S. fuſca, abdomine viridi faſciâ longitudinali nigrâ.

Loc.

5. S. albipes.

La Mouche-armée noire à pattes blanches.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

S. nigra, tibiis albidis, alarum margine exteriore nigro.

Loc.

6. S. maculata.

La Mouche-armée noire à taches jaunes.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

S. atra, thorace abdomineque maculis flavis.

Loc. Habitat Fontem-Bellaquæum.

7. S. faſciata.

La Mouche-armée jaune à bandes noires.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

S. luteo-virefcens, thorace lineis tribus longitudinalibus, abdomine tribus tranfverfis arcuatis nigris.

Loc. Habitat prata.

FAMILIA II. *Thoracis aculeis fex.*

8. S. nigroptera.

La Mouche-armée noire à ventre & cuiffes jaunes.

Long. 2 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. nigra, alis nigris, femoribus abdomineque luteis.

Loc. Idem.

XCVI. MUSCA. *LA MOUCHE.*

Antennæ è patellâ planâ folidâ, fetâ laterali feu pilo.

Os probofcide abfque dentibus.

Ocelli tres.

FAMILIA I. *Alis variegatis.*

1. M. groffificationis.

La Mouche à aîles noires & tache blanche à l'extrémité.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. nigra, alis nigris, apice maculâ rotundâ albâ.

Loc. Habitat hortos.

2. M. morio.

La Mouche à aîles noires bordées de blanc ondé.

Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

M. atra hirſuta, margine alarum tenuiore ſinuato albicante.

Loc. Idem.

3. M. ſtellata.

La Mouche à l'étoile.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. cinerea, alis albis apice maculâ rotundâ radiatâ.

Loc. Idem.

4. M. vibrans.

La Mouche à aîles vibrantes ponctuées.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. alis albis, apice nigris.

Loc. Habitat arbores.

5. M. groſſa.

La Mouche noire à baſe des aîles jaune.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

M. atra, baſi alarum ferrugineâ.

Loc. Habitat prata.

6. M. vivipara.

La Mouche noire à ventre brun & baſe des aîles fauve.

M. thorace atro, abdomine fuſco, baſi alarum ferrugineâ.

Loc. Habitat hederam arboream.

7. M. cardui.

La Mouche à zig-zag ſur les aîles.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

M. alis albis, lineâ undulatâ fuſcâ ſigmoïdæâ.

Loc. Larva habitat cirſium.

8. M. ſigmoïdæa.

La Mouche à aîles réticulées avec une tache en zig-zag.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. alis unguiculatis, albo fuſcoque reticulatis, lineâ undulatâ ſigmoïdeâ nigriore.

Loc.

9. M. duplicata.

La Mouche à aîles réticulées avec deux taches noires.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

M. alis unguiculatis, albo fuſcoque reticulatis, maculâ duplici nigrâ.

Loc. Larva habitat capita helenii.

10. M. reticulata.

La Mouche à aîles réticulées à bandes.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. nigra, alis albo nigroque reticulatis, faſciis tranſverſis obſcurioribus.

Loc. Habitat hortos.

11. M. trimaculata.

La Mouche à aîles jaunes chargées de points & de trois taches brunes.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. flava, alis fulvis, maculâ triplici, punctisque plurimis fuscis.

Loc.

12. M. punctifera.

La Mouche à aîles blanches chargées de points & de trois taches brunes.

M. cinerea, alis albis, maculâ triplici, punctisque plurimis fuscis.

Loc.

13. M. solstitialis.

La Mouche des têtes de chardon.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. alis unguiculatis albis, fasciis tribus fuscis, thoracis apice flavo.

Loc. Larva habitat cirsium & carduos.

14. M. 4-fasciata.

La Mouche jaune à quatre bandes brunes sur les aîles.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

M. flavescens, alis albis, fasciis quatuor transversis fuscis, nonnullis connexis, thorace punctis nigris.

Loc.

15. M. 5-fasciata.

La Mouche noire, à cinq bandes noires sur les aîles.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. nigra, alis albis, fasciis quinque transversis nigris, nonnullis connexis.

Loc. Habitat hortos.

16. M. marmorata.

La Mouche à aîles marbrées.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

M. fulva, alis unguiculatis fulvis fusco marmoratis maculis albis.

Loc.

17. M. conferta.

La Mouche noire à aîles picotées.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. atra, alis rotundatis nigris punctis confertis albis.

Loc.

18. M. aselliformis.

La Mouche noire à deux bandes blanches sur les aîles.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. nigra, alis fuscis fasciâ duplici transversâ albâ.

Loc. Habitat sylvas.

19. M. vitrata.

La Mouche à aîles vitrées.

Long 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

M. thorace fusco lineis pallidis, abdomine basi luteâ punctis nigris; alis nigris maculis albis.

Loc.

FAMILIA II. *Ore larvato.*
à masque

20. M. larvata.

La Mouche cendrée à quatre bandes noires sur les aîles dont la troisième est divisée en deux.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. cinerea, alis ſubfulvis, faſciis quatuor tranſverſis nigris, tertiâ interruptâ.

Loc. Habitat prata.

21. M. perſonata.

La Mouche cendrée à points & aîles marbrées.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. cinerea, nigro punctata, alis albo fuſcoque marmoratis.

Loc.

22. M. teſſellata.

La Mouche à aîles réticulées de brun.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. alis fuſco teſſelato-reticulatis.

Loc.

23. M. claviformis.

La Mouche à corcelet noir à gros ventre jaune & aîles enfumées.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. thorace nigro, abdomine fulvo clavato, alis fuſco nebuloſis.

Loc. Habitat hortorum humum recentem.

24. M. cingulata.

La Mouche à zone.

Long. 8 lig. Larg. 3 lig.

M. fulva, abdomine flavo, ſegmenti primi & ſecundi margine nigro, alis fulvo nebuloſis.

Loc.

25. M. longicornis.

La Mouche à tache brune ſur le bord de l'aîle & point noir au milieu.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. cinerea, thorace faſciis nigris, alarum margine externo maculis fuſcis, medio puncto nigro.

Loc.

26. M. aquatica.

La Mouche à bord des aîles jaunâtre, & trois points noirs sur chacune.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. cinerea, thorace fasciis fuscis, alarum margine externo flavescente singulo punctis tribus nigris.

Loc. Larva habitat lentem palustrem.

27. M. geographica.

La Mouche à aîles géographiques.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig.

M. nigra, abdomine fulvo fasciâ longitudinali nigrâ, alis albo fuscoque variegatis.

Loc.

FAMILIA III. *Variegatæ.*

28. M. vespiformis.

La Mouche imitant la guêpe, à courtes antennes.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

M. nigra, flavo variegata, alis fuſcis, antennis capite brevioribus.

Loc. Habitat flores.

29. M. feſtiva.

La Mouche imitant la guêpe, à longues antennes.

M. nigra, flavo variegata, alis fuſcis, antennis capite longioribus.

Loc.

30. M. interſecta.

La Mouche à corcelet noir taché de jaune, & ventre jaune à bandes noires.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

M. thorace nigro, flavo maculato, abdomine flavo, faſciis tranſverſis nigris.

Loc. Habitat ſylvas.

31. M. bombyliformis.

La Mouche velue noire & fauve imitant le bourdon.

M. hirſuta nigra, thorace antice, abdomineque ſupra flavis.

Loc. Larva habitat radicem narciſſi.

32. M. ſaltatrix.

La Mouche jaune à bande noire.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

M. lutea, thorace lineis tribus longitudinalibus, abdomine plurimis tranſverſis nigris.

Loc. Habitat folia plantarum.

33. M. hemiſphærica.

La Mouche noire, à ventre hémiſphérique roux tacheté de noir.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

M. nigra, abdomine hemiſphærico rufo, punctorum nigrorum ordine longitudinali.

Loc.

34. M. caudata.

La Mouche noire à ventre jaune noir dans le milieu.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

M.

M. nigra, abdomine hemisphærico luteo, fascia longitudinali nigrâ.

Loc. Larva habitat aquas stagnantes.

35. M. hortensis.

La Mouche brune à bandes transverses blanchâtres sur le ventre.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

M. fusca, marginibus incisurarum abdominis cinereis, alis ferrugineis.

Loc. Habitat flores.

36. M. aphidivora.

La Mouche noire à bandes transverses jaunes sur le ventre.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. nigra, marginibus incisurarum abdominis flavis, alis fuscis.

Loc. Habitat flores, aphides devorat.

37. M. nemorum.

La Mouche cendrée à bandes blanches sur le ventre, & deux grandes taches jaunes sur le premier anneau.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

M. thorace cinereo, abdominis basi fasciâ luteâ interruptâ marginibus incisurarum exalbidis.

Loc.

38. M. ribesii.

La Mouche à quatre bandes jaunes sur le ventre, dont la première est interrompue.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

M. abdomine ovato nigro, lunularum pari singulisque tribus flavescentibus.

Loc. Habitat ribesium.

39. M. interrupta.

La Mouche brune à deux taches jaunes à la base du ventre.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

M. fusca, abdominis basi fasciâ luteâ interruptâ.

Loc. Habitat flores.

40. M. pendula.

La Mouche à corcelet ſtrié & bandes jaunes interrompues ſur le ventre.

Long. 6 lig. Larg. 2 lig.

M. thorace ſtriis quatuor flavis; abdominalibus ſegmentis tribus interrupto-flavis.

Loc. Habitat flores.

41. M. inæqualis.

La Mouche à bandes jaunes alternativement plus larges ſur le ventre.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

M. thorace nigro-viridi, apice flavo, abdomine nigro faſciis tranſverſis luteis, alternis majoribus.

Loc. Habitat hortos.

42. M. transfuga.

La Mouche à pointe du corcelet & bande ſur le ventre de couleur jaune.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

M. thorace nigro-viridi, apice flavo; abdomine nigro fasciis luteis transversis æqualibus.

Loc. Habitat flores.

43. M. orbiculata.

La Mouche à points jaunes ronds sur le ventre.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{2}{3}$ lig.

M. thorace nigro; abdomine atro, paribus tribus macularum rotundarum lutescentium.

Loc. Larva aphides devorat.

44. M. mellina.

La Mouche à points jaunes triangulaires sur le ventre.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

M. thorace nigro-viridi apice flavo; abdomine oblongo, paribus tribus trigonorum lutescentium.

Loc. Idem.

45. M. tetragona.

La Mouche à six points jaune quarrés sur le ventre.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

M. thorace nigro-viridi; abdomine oblongo, paribus tribus tetragonorum lutescentium.

Loc. Larva aphides devorat.

46. M. quadrata.

La Mouche à quatre points jaunes sur le ventre.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

M. nigro-viridis, abdomine paribus duobus tetragonorum lutescentium.

Loc. Habitat hortos.

47. M. pyrastri.

La Mouche à six taches blanches en croissant sur le ventre.

Long. 6 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

M. thorace nigro-viridi, abdomine atro ovato, tribus paribus lunularum albicantium.

Loc. Habitat hortos; larva aphidivora.

48. M. lineata.

La Mouche dorée à trois paires de raies blanches sur le ventre.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

M. aurata abdomine nigro, tribus paribus linearum albicantium.

Loc. Habitat hortos.

49. M. vorax.

La Mouche brune à huit taches jaunes oblongues ſur le ventre.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

M. thorace nigro-viridi apice flavo; abdomine atro, quatuor paribus macularum oblongarum flaveſcentium.

Loc. Larva aphidivora.

50. M. pipines.

La Mouche à groſſes cuiſſes.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. oblonga femoribus poſticis majoribus.

Loc. Idem.

51. M. coaleſcens.

La Mouche à antennes réunies.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

M. nigra, abdominis medio ferrugineo antennis baſi coalitis.

Loc.

* 52. M. turcica.

La Mouche aux croiſſans d'or.

Long. 4 ½ lig. Larg. 1 ½ lig.

M. nigra thoracis lateribus & apice flavis, abdominis faſciis tribus arcuatis luteis interruptis, alarum margine luteſcente.

Loc.

53. M. cruentata.

La Mouche noire à bande rouge tranſverſe ſur le ventre.

Long. 2 lig. Larg. ½ lig.

M. atra, abdominis faſciâ tranſversâ rubrâ.

Loc. Rara in hortis.

* 54. M. doliata.

La Mouche à cerceaux.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

M. thorace hirſuto fulvo, abdomine nigro, cingulis quatuor flavis.

Loc.

55. M. apiformis.

La Mouche apiforme.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

M. fuſca; ſegmentis abdominalibus tribus margine albidis primo latere flavo, thorace vix maculato.

Loc. Larva habitat aquam ſtagnant. & mucum vegetabilem ex quo papyrus extrahitur.

56. M. adunata.

La Mouche à antennes en y-grec.

Long. 5 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

M. nigra, flavo variegata, alarum parte externâ nigrâ, antennis baſi coalitis.

Loc.

FAMILIA IV. *Auratæ.*

57. M. cæſar.

La Mouche dorée commune.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

M. thorace abdomineque viridi nitente pedibus nigris.

Loc. Larva habitat cadavera, undèquaque.

58. M. ſericea.

La Mouche cuivreuſe à pattes blanches.

Long. 2 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. thorace, abdomineque viridi ſericeo pedibus pallidis, alis albis.

Loc. Habitat hortos.

59. M. cuprea.

La Mouche verte cuivreuſe à aîles mi-parties de brun & de blanc.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. thorace abdomineque viridi ſericeo, pedibus pallidis, alarum medio fuſco.

Loc. Habitat ſuperficiem aquæ & loca humida.

60. M. trinervis.

La Mouche dorée à trois nervures ſur les aîles.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

M. thorace abdomineque viridi nitenti pedibus ferrugineis, alis trinervis.

Loc. Habitat ſylvas.

61. M. cadaverina.

La Mouche dorée à corcelet bleu & ventre vert.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. thorace cœruleo nitente, abdomine viridi nitente.

Loc. Larva habitat cadavera.

62. M. putris.

La Mouche à corcelet vert & ventre bleu.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. thorace viridi nitente, abdomine cœruleo nitente.

Loc. Idem.

63. M. vomitoria.

La Mouche bleue de la viande.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

M. thorace nigro, abdomine cœruleo.

Loc. Habitat carnes apud laniones, &c. frequentissima.

64. M. hederacea.

La Mouche bleue à base des aîles fauve.

M. cœrulea, basi alarum ferrugineâ.

Loc. Larva habitat hederam, vivipara.

65. M. cupraria.

La Mouche dorée à tache brune sur les aîles.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

M. oblonga, capite viridi, thorace aureo, abdomine cupreo, alis maculâ fuscâ.

Loc. Habitat hortos.

66. M. contracta.

La Mouche dorée à ventre brun & noir.

Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

M. oblonga, thorace æneo; abdomine anterius flavo, posterius nigro.

Loc. Habitat sylvas.

67. M. annulata.

La Mouche verdâtre à anneau blanc aux tarses.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. thorace viridi nitente abdomine æneo tarsorum annulo albo.

Loc. Habitat humum recentem, gallice (*les couches*).

68. M. plumbea.

La Mouche brune bronzée.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

M. tota plumbea.

Loc.

69. M. smaragdina.

La Mouche à tête verte.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. capite viridi, capite plumbeo nitente, pedibus flavis, alis nervosis.

Loc.

FAMIL. V. *Vulgares.*

70. M. carnaria.

La grande Mouche à extrêmité du ventre rougeâtre.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

M. nigra, abdomine nitido teſſelato, thorace lineolis pallidioribus longitudinalibus; ano fulvâ.

Loc. Habitat carnes & hortos; vivipara.

71. M. domeſtica.

La Mouche commune.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

M. nigra, abdomine nitido teſſellato, thorace lineolis pallidioribus longitudinalibus, ano concolore.

Loc. Habitat domos, frequentiſſima.

72. M. cineraſcens.

La Mouche cendrée à poils noirs.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. cinerea tota, pilis nigris.

Loc. Larva habitat fimeta.

73. M. pluvialis.

La Mouche cendrée à points noirs.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. cinerea, thorace quinque maculis nigris, abomine maculis tridentatis.

Loc. Larva habitat folia humida.

74. M. ſtercoraria.

La Mouche merdivore.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. hirſuta cinerea, alis puncto obſcuro.

Loc. Habitat fæces bovinas.

75. M. ſpinifera.

La Mouche noire à pattes épineuſes.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

M. nigra, alis fuſcis, pedibus ſpinoſis.

Loc. Habitat arbores.

76. M. caracteriſtica.

La Mouche à caractères noirs.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

M. thorace nigro, lineolis quatuor longitudinalibus albidis; abdomine fuſco, medio caracteribus nigris.

Loc. Habitat flores.

77. M. fulvipes.

La Mouche noire à pattes fauves.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. nigra, alis incumbentibus pedibus ferrugineis.

Loc. Habitat folia humida.

78. M. guttata.

La Mouche noire à tache blanche sur le ventre.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. nigra, alis incumbentibus halteribus abdominiſque maculâ albis.

Loc.

79. M. divaricata.

La Mouche toute noire.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. nigra, alis divaricatis pedibus nigris.

Loc. Habitat hortos.

80. M. globulipes.

La Mouche à tarſes antérieurs très-gros.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. nigra, tarſis anticis clavatis craſſis.
Loc. Habitat hortos; rarior.

81. M. fallax.

La Mouche noire avec un trait noir ſur la moitié du bord extérieur de l'aîle.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. atra; alis albis, marginis exterioris medietate ſupernâ lineâ nigrâ.

Loc. Habitat flores.

82. M. fimetorum.

La Mouche noire à ailes brunes & yeux rouges.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. nigra, alis fuſcis oculis rubris.

Loc. Habitat fimeta.

83. M. lateralis.

La Mouche noire avec le devant de la tête blanc, & les côtés du ventre fauves.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

M. nigra fronte albâ, abdominis lateribus ferrugineis.

Loc. Habitat hortos & arva.

84. M. marginalis.

La Mouche à point marginal brun sur les aîles.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. fuſca, alis maculâ marginali fuſcâ.

Loc. Habitat hortos.

85. M. longipes.

La Mouche à point marginal ſur les aîles & pattes jaunes.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. fuſca, alis puncto marginali fuſco, pedibus flaveſcentibus.

Loc. Habitat flores.

86. M. tipulæa.

La Mouche griſe à pattes longues & jaunes.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. cinerea, pedibus flaveſcentibus.

Loc. Idem.

87. M. Ichneumonoides.

La Mouche noire à pattes jaunes & ventre allongé, semblable à un ichneumon.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

M. nigra, pedibus flavis, antennis abdomineque tenuibus productis.

Loc. Habitat hortos, rarissima.

88. M. pulicaria.

La Mouche noire à pattes jaunes & bord extérieur des aîles noir.

Long. 1 lig. Long. $\frac{2}{3}$ lig.

M. nigra, pedibus flavis alarum margine externo nigro.

Loc. Habitat flores.

89. M. libatrix.

La Mouche à aîles vibrantes sans taches.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. nigra, pedibus rufis, alis vibrantibus immaculatis.

Loc. Habitat folia arborum in sylvis.

90. M. cellaris.

La Mouche du vinaigre.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. ferrugineo fuſca, ſubpiloſa, oculis ferrugineis, alis trinervis.

Loc. Habitat vinum & acetum, frequentiſſima.

91. M. flava.

La Mouche jaune aux yeux noirs.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. flava, oculis nigris.

Loc. Habitat flores & domos.

92. M. pigra.

La Mouche jaune à bandes noires ſur le corcelet.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

M. flava, abdomine ſupra fuſco, thorace tribus ſtriis nigris.

Loc. Habitat flores.

93. M. cruciata.

La Mouche jaune à aîles bleuâtres & croiſées.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. flavefcens, oculis nigris, alis incumbentibus glaucis.

Loc. Habitat flores.

XCVII. STOMOXYS. *Le Stomoxe.*

Antennæ patellatæ fetâ laterali pilofâ.

Os roftro fubulato fimplici acuto.

Ocelli tres.

1. S. calcitrans.

Le Stomoxe.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

Loc. Habitat prata, autumnalis; equos laceffit.

XCVIII. VOLUCELLA. *La Volucelle.*

Antennæ patellatæ fetâ laterali pilofâ capiti infidentes.

Os probofcide vaginâ acutâ feu roftro reconditum.

Ocelli tres.

1. V. pelluceus.

La Volucelle à ventre blanc en devant.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 3 lig.

V. abdomine antice albo, poſtice nigro, alis albis, nigrâ maculâ.

Loc. Habitat roſam.

2. V. nigra.

La Volucelle à ventre tout noir.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Long. 3 lig.

V. tota nigra, pilis fulvis; alis albis maculâ nigrâ.

Loc. Idem.

3. V. flaveſcens.

La Volucelle à ventre jaunâtre.

Larg. 4 lig. Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

V. thorace nigro, apice fulvo; abdomine flaveſcente.

Loc. Habitat hortos, rara.

* 4. V. maculata.

La Volucelle à tache noire.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 2 $\frac{1}{3}$ lig.

V. nigra piloſa, abdominis apice pilis fulvis, alis albis maculà nigra.

Loc. Habitat flores umbellatos & aquaticos.

XCIX. NEMOTELUS. *LA NEMOTELE.*

Antennæ moniliformes, ſtylo terminatæ roſtro inſidentes.

Os proboſcide, vaginâ acutâ ſeu roſtro reconditum.

Ocelli tres.

1. N. faſciatus.

La Nemotèle à bande.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

N. niger, abdomine niveo faſciis duabus nigris.

Loc. Habitat flores.

2. N. punctatus.

La Némotèle noire à ventre tacheté de blanc.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

N. niger, abdomine punctis albis.

Loc. Habitat prata humida.

. N. ſtellaris.

La Némotèle à points d'argent.

Long. 5 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

N. niger, hirſutie flava conſperſus, alarum baſi puncto argenteo.

Loc.

SCATHOPSE. *LE SCATOPSE.*

Antennæ filiformes.

Os proboſcide abſque dentibus.

Ocelli tres.

1. S. nigra.

Le Scatopſe noir.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

S. nigra.

Loc. Habitat loca humida & latrinas.

2. S. buxi.

Le Scatopſe du bouis.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

S. flava, alis albis.

Loc. Habitat folia buxi, quæ ſubtùs contorquet.

CI. HIPPOBOSCA. *L'HIPPOBOSQUE.*

Antennæ ſetaceæ breviſſimæ ex unico pilo.
Os roſtro cylindrico obtuſo.
Ocelli tres.

1. H. equina.
La Mouche à chien.
Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.
H. pedibus tetradactylis, alis cruciatis.
Loc. Habitat cutem canis, equi, &c.

2. H. hirundinis.
La Mouche araignée.
Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.
H. pedibus ſexdactylis, alis divaricatis.
Loc. Habitat nidos hirundinum.

CII. TIPULA. *LA TIPULE.*

Antennæ filiformes, ſubpectinatæ (maribus ſæpe plumoſæ) capite multo longiores.
Os tentaculis incurvis articulatis.
Ocelli tres.

FAMILIA

FAMIL. I. *Alis patentibus.*

1. T. crocata.

La Tipule variée de brun, de jaune & de noir.

Long. 7 lig. Larg. 1 lig.

T. corpore nigro, fulvo, flavoque variegata.

Loc. Larva habitat exæſas arbores.

2. T. rivoſa.

La Tipule à aîles panachées.

Long. Mâle 10 lig. Femelle 14 lig.

T. alis albis fuſco variegatis.

Loc. Habitat prata.

3. T. oleracea.

La Tipule à bords des aîls bruns.

Long. 8, 9 lig. Larg. 1 lig.

T. alis exalbidis, lineâ marginali fuſcâ.

Loc. Idem.

4. T. lunata.

La Tipule à aîles cendrées avec une tache blanche marginale.

Long. 8 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

T. alis cineraſcentibus, lunulâ albâ marginali.

Loc. Habitat prata.

5. T. cornicina.

La Tipule jaune à points noirs rangés en trois bandes ſur le ventre.

Long. 6 lig. Larg. 1 lig.

T. alis ſubfuſcis, thorace flavo caracteribus nigris, abdomine luteo punctorum nigrorum lineis tribus longitudinalibus.

Loc. Idem.

6. T. caracteriſtica.

La Tipule jaune à tache marginale ſur les aîles, & à bande brune ſur le ventre.

Long. 5 lig. Long. 1 lig.

T. flava, alis ſubfuſcis, punćto marginali fuſco, thorace caraćteribus nigris, abdomine lineâ longitudinali nigrâ.

Loc. Habitat prata.

7. T. melanopis.

La Tipule jaune aux yeux noirs.

Long. 4 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

T. flava oculis nigris.

Loc. Idem.

8. T. contaminata.

La Tipule noire à taches jaunes & aîles maculées.

Long. 5 lig. Larg. 1 lig.

T. nigra, pedibus abdominiſque maculis utrinque lividis, alis nigro maculatis.

Loc. Idem.

9. T. duplicata.

La Tipule brune à double point marginal.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

T. fuſca, alis albis puncto marginali duplici fuſco.

Loc. Habitat prata.

10. T. nigra.

La Tipule noire à aîles brunes.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

T. alis fuſcis, corpore atro.

Loc. Idem.

11. T. atra.

La Tipule toute noire.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

T. tota atra lævis.

Loc. Idem.

12. T. marginata.

La Tipule noire à ventre bordé de jaune.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

T. atra abdomine utrinque limbo ferrugineo.

Loc. Idem.

13. T. plumbea.

La Tipule de couleur plombée à aîles blanches.

Long. 3 lig. Larg. 1 lig.

T. plumbea, alis albis.

Loc. Habitat prata.

14. T. marginalis.

La Tipule jaune à point marginal de couleur cendrée.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

T. flaveſcens, puncto marginali alarum cinereo.

Loc. Idem.

FAMIL. II. *Alis incumbentibus.*

tipules culiciformes

15. T. teſſelata.

La Tipule à aîles en damier.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

T. alis albo fuſcoque teſſelatis corpore fuſco.

Loc. Idem.

16. T. plumosa.

La Tipule à corcelet vert & point marginal noir sur les aîles.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

T. fusca, thorace virescente; alis pellucidis puncto nigro.

Loc. Habitat ripas aquarum.

17. T. littoralis.

La Tipule brune à ventre de couleur verte en devant.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

T. fusca, abdomine anterius viridi.

Loc Habitat folia in hortis, & vitra domorum.

18. T. motatrix.

La Tipule à pattes en forme d'antennes ornées d'un anneau blanc.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

T. pedibus anticis maximis antenniformibus motatoribus, annulo albo.

Loc. Habitat prata.

19. T. vibratrix.

La Tibule à pattes en forme d'antennes ſans anneaux.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

T. pedibus anticis maximis antenniformibus motatoribus immaculatis.

Varietas A. Corpore viridi.

B. Corpore fuſco, abdomine annulis pallidis octo.

Loc. Idem.

20. T. monilis.

La Tipule à pattes d'arlequin.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Long. $\frac{1}{4}$ lig.

T. pedibus albis annulis nigris, alis albis cinereo-maculatis.

Loc. Habitat prata & vitra domorum.

21. T. riparia.

La Tipule verte à aîles blanches ſans taches ni points.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig Larg. $\frac{1}{5}$ lig.

T. viridis, alis albis immaculatis.

Loc. Habitat undèquaque.

22. T. fasciata.

La Tipule verte à bande transverse sur les aîles.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

T. viridis, alarum fasciâ transversâ fuscâ.

Loc.

23. T. punctata.

La Tipule brune à quatre points bruns sur les aîles.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{6}$ lig.

T. fusca, alis albidis, puncto quadruplici fusco.

Loc. Habitat vitra domorum.

24. T. reticulata.

La Tipule à aîles réticulées.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

T. fusca, alis albis fusco reticulatis.

Loc. Habitat loca aquatica.

25. T. immaculata.

La Tipule brune à aîles blanches.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{4}$ lig.

T. fuſca, alis albis immaculatis.

Loc.

26. T. atra.

La Tipule noire à aîles blanches.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{6}$ lig.

T. atra, alis niveis.

Loc. Habitat hortos.

27. T. variegata.

La Tipule à pattes noires & jambes blanches.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{5}$ lig.

T. luteo fuſcoque variegata, pedibus nigris, tibiis albis.

Loc. Habitat ſylvas & hortos.

28. T. conica.

La Tipule noire à aîles noires.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

T. atro-fuſca, alis nigris abdomine conico acuto.

Loc. Habitat loca humida domorum, & hortorum.

CIII. BIBIO. *Le Bibion.*

Antennæ taxiformes perfoliatæ, capite vix longiores.
Os tentaculis incurvis articulatis.
Ocelli tres.

1. B. marginalis.
Le Bibion noir à pattes jaunâtres & point marginal.
Long. 3 lig. Larg. 1 lig.
B. atro fuſcus, pedibus lividis, alarum puncto marginali fuſco.
Loc.

2. B. febrilis.
Le Bibion de S. Marc noir.
Long. 4 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.
B. ater hirſutus, alis albis margine exteriore nigro.
Loc. Habitat arbores æſtivo tempore.

3. B. hortulanus.
Le Bibion de S. Marc rouge.
Long. 4 lig. Larg. 1 lig.

B. alis albis margine exteriore nigro, thorace abdomineque rubris.

Loc. Larva fæces bovinas habitat.

4. B. phalænoides.

Le Bibion à aîles frangées & sans taches.

Long. $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

B. alis deflexis cinereis, ovato lanceolatis, ciliatis .immaculatis.

Loc. Habitat humida loca, & muros lattinarum.

3. B. ciliatus.

Le Bibion à aîles frangées & couvert de taches nébuleuſes.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

B. alis deflexis cinereis, ovato-lanceolatis, ciliatis, nebuloſo maculatis.

Loc. Habitat arbores in ſylvis umbroſis.

CIV. CULEX. *Le Cousin.*

Antennæ pectinatæ (maribus plumoſæ.

Os ſiphone filiformi.

Ocelli nulli.

1. C. pipines.

Le Cousin commun.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

C. cinereus, abdomine annulis fuscis octo.

Loc. Habitat prata aquatica.

2. C. pulicaris.

Le Cousin à trois taches sur les aîles.

Long. $\frac{3}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{8}$ lig.

C. alis maculis tribus obscuris, antennis apice bifurcis.

Loc. Habitat sylvas & loca excelsa.

* 3. C. annulatus.

Le Cousin à pattes panachées.

Long.

C. fuscus, alis nervosis, pedibus albo intersectis.

Loc. Habitat adonides horti regii Parisiensis.

SECTIO SEXTA.

INSECTA APTERA.

CV. PEDICULUS. *Le Pou.*

Pedes ſex.
Oculi duo.
Antennæ filiformes.
Abdomen ſimplex.

1. P. humanus.
Le Pou ordinaire.
P. humanus.

2. P. pubis.
Le Morpion.
P. inguinalis.

3. P. bovis.
Le Pou du bœuf à ventre chargé de huit bandes tranſverſes.

P. bovis, abdomine lineis transversis octo ferrugineis.

4. P. vituli.

Le Pou du bœuf à ventre de couleur plombée.

P. bovis abdomine plumbeo.

5. P. circi.

Le Pou du busard.

P. circi, fuscus oblongus, abdomine flavescente, medio lateribusque fuscis.

6. P. passeris.

Le Pou du moineau franc.

Long. $\frac{3}{4}$ lig.

P. subflavescens, abdomine ovato, medio diaphano, maculâ fuscâ, lateribus punctato-ferrugineis.

7. P. columbæ.

Le Pou du pigeon.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{5}$ lig.

P. oblongus, filiformis, albicans, corporis lateribus utrinque ferrugineis.

8. P. corvi.

Le Pou du corbeau.

Long. 1 lig.

P. albo nigroque varius, abdomine ovato oblongo, utrinque incifuris nigris.

9. P. meleagridis.

Le Pou du dindon.

P. galli-pavonis.

10. P. caponis.

Le Pou de la poule à ventre bordé de noir.

P. gallinæ, abdominis margine nigro.

11. P. gallinæ.

Le Pou de la poule à tête & corcelet pointus des deux côtés.

P. gallinæ, thorace capiteque utrinque mucronato.

12. P. pulfatorius.

Le Pou du bois.

P. ligni antiqui.

Pediculi Rhedi & Linnæi.

1°. Pediculus accipitris, abdomine oblongo.

2°. P. accipitris, abdomine ovato.

3°. P. gruis.

4°. P. fulicæ.

5°. P. picæ.

6°. P. ardeæ.

7°. P. ardeolæ.

8°. P. cygni, abdomine oblongo immaculato.

9°. P. cygni, abdomine ovato utrinque lineis fuſcis notato.

10°. P. lari.

11°. P. anſeris, capite ovato, abdomine oblongo, inciſuris utrinque maculatis.

12°. P. anſeris, capire triangulari, abdomine immaculato.

13°. P. pluvialis, abdomine margine ſimplici.

14°. P. pluvialis, abdomine margine dentato ſerrato.

15°. P. querquedulæ.

16°. P. falconis tinnunculi.

17°. P. pavonis, antennis dichotomis capite longioribus, abdomine utrinque immaculato.

18°. P. pavonis, antennis ſimplicibus capite brevioribus, abdomine immaculato.

19°. P. ſturni.

20°. P. ſternæ.

21°. P. recurviroſtræ.

22°. P. hæmathopi.

23°. P. lagopi.

24°. P. aſini.

25°. P. cervi, abdomine fuſco, medio albo.

26°. P. cervi, abdominis incisuris punctis nigris.

N. B. Adde pediculos animalium exoticorum.

CVI. PODURA. *La Podure.*

Pedes sex.
Oculi duo.
Antennæ filiformes.
Abdominis cauda bifurca inflexa saltatrix.
Corpus squamis tectum.

Famil. I. *Globulosæ.*

1. P. signata.
La Podure noirâtre à taches fauves sur le ventre.
Long. $\frac{1}{2}$ lig.
P. fusco-nigra, abdomine globoso signaturis ferrugineis.
Loc. Habitat lapides humidos.

2. P. viridis.
La Podure verte aux yeux noirs.
Long. $\frac{1}{4}$ lig.

P. viridis, oculis nigris, capite flavescente, antennis in medio fractis.

Loc. Habitat plantas in mense aprili.

3. P. longicornis.

La Podure brune enfumée.

Long. $\frac{1}{2}$ lig.

P. fusca non nitens, antennis longitudine corporis.

Loc. Habitat cortices arborum.

FAMILIA II. *Longæ.*

4. P. communis.

La Podure commune velue.

Long. 2 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

P. fusco nigroque variegata villosa.

Loc. Habitat lapides humidos.

5. P. livida.

La Podure jaune à anneaux noirs.

Long. $\frac{2}{3}$ lig.

P. livido-lutea, annulis transversis nigris.

Loc. Idem.

6. P. annularis.

La Podure porte-anneau.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

P. nigra, thoracis limbo antennarumque basi flavis, pedibus furcâque pallidis.

Loc. Habitat ligna exæsa.

7. P. viatica.

La Podure noire terrestre.

Long. 1 $\frac{1}{5}$ lig.

P. atra viatica.

Loc. Habitat vias, socialis.

7. P. aquatica.

La Podure noire aquatique.

P. atra aquatica.

Loc. Habitat superficiem aquarum stagnantium.

9. P. plumbæa.

La Podure grise commune.

Long. 1 lig.

P. plumbea.

Loc. Habitat arbores, prata solitaria.

10. P. violacea.
La Podure violette.
P. violacea.
Loc. Habitat cum communi.

CVII. FORBICINA. *LA FORBICINE.*

Pedes sex origine latâ & squamosâ.
Oculi duo.
Os tentaculis duobus mobilibus.
Antennæ filiformes.
Abdominis cauda tripilis.
Corpus squamis tectum.

1. F. saccharina.
La Forbicine platte.
Long. 4 lig. Larg. 1 ½ lig.
F. plana.
Loc. Habitat ligna exæsa, lapides, fenestra undequaque.

2. F. saltatrix.
La Forbicine cylindrique.
Long. 4 ½ lig. Larg. 1 lig.
F. teres saltatrix.
Loc. Id.; rarior.

CVIII. PULEX. *LA PUCE.*

Pedes ſex ſaltatorii.
Oculi duo.
Os inflexum.

1. P. irritans.
La Puce.

CIX. CHELIFER. *LA PINCE.*

Pedes octo.
Oculi duo.
Antennæ cheliformes roſtro longiores.

1. C. cancroides.
Le Scorpion araignée.
Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.
C. fuſcus, abdomine lineis tranſverſis.
Loc. Habitat hortos ſub lapidibus.

2. C. longicornis.
La Pince rouge.
Long. $\frac{1}{3}$ lig.
C. totus ruber, antennis extremo biſetis.
Loc. Habitat ſub lapidibus & corticibus arborum.

CX. ACARUS. *La Tique.*

Pedes octo.

Oculi duo.

Antennæ ſimplices roſtro breviores.

1. A. ricinus.

La Tique des chiens.

Long. 1 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. lividus, antennis brevibus ſubclavatis, abdomine antice maculâ ovatâ fuſcâ nitente.

Loc. Habitat aures canum.

2. A. ſiro.

Le Ciron de la galle.

A. humanus ſubcutaneus.

Loc. Habitat cutem humanam in ſcabie. An exiſtat verè inquirendum?

3. A. caſei.

Le Ciron du fromage.

A. caſei antiqui.

Loc. Habitat caſeum.

4. A. coleoptreorum.

La Mitte des coleoptères.

Long. $\frac{3}{4}$ lig.

A. insectorum rufus, ano albicante.

Loc. Habitat scarabæos.

5. A. gymnopterorum.

La Mitte rouge des mouches.

A. gymnopterorum ruber, punctorum coccineorum utrinque pari.

Loc. Habitat annulos muscæ.

6. A. muscarum.

La Mitte brune des mouches.

A. rufus muscarum, pedibus posticis longis filiformibus.

Loc. Idem.

7. A. holosericeus.

La Tique rouge satinée terrestre.

Long. 3 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

A. terrestris ruber abdomine depresso.

Loc. Habitat prata & gramina sicca.

8.

8. A. aquaticus.

La Tique rouge ſatinée aquatique.

A. aquaticus ruber abdomine depreſſo.

Loc. Habitat aquas ſtagnantes.

9. A. ſtagnalis.

La Tique aquatique panachée.

A. aquaticus niger, abdominis medio lateribuſque flavis.

Loc. Habitat ſtagna.

10. A. petrarum.

La Tique rouge des pierres à pattes antérieures fort longues.

Long. $\frac{1}{3}$ lig.

A. petrarum ruber, pedibus anticis longitudine corporis.

Loc. Habitat ſuperficiem lapidum.

11. A. lucidus.

La Tique noire & liſſe des pierres.

Long. $\frac{1}{4}$ lig.

A. petrarum niger, abdomine globoſo lucido, femoribus ſubclavatis.

Loc. Idem.

12. A. coleoptratus.

La Tique noire à ventre anguleux en devant.

A. ater, lateribus abdominis antrorſum acutis.

Loc. Habitat lapides & muros.

13. A. textor.

Le Tiſſerand d'automne.

A. fuſcus, autumnalis, textor.

Loc. Habitat corticem arborum, quas ſericeo filo obveſtit.

24. A. veſpertilionis.

La Tique de la chauve-ſouris.

Long. 1 lig.

A. fuſcus, ovatus, pedibus pallidis, veſpertilionis.

Loc. Habitat corpus veſpertilionis.

CXI. PHALANGIUM. *LE FAUCHEUR.*

Pedes octo.
Oculi duo.
Antennæ anguloſæ.
Tentacula duo longa antenniformia.

1. P. opilio.

Le Faucheur.

Loc. Habitat undèquaque.

CXII. ARANEA. *L'ARAIGNÉE.*

Pedes octo.

Oculi duo.

FAMILIA I. *Oculi in lunam diſpoſiti.*

1. A. viatica.

L'Araignée à pattes de devant longues & arlequinées.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 lig.

A. thorace fuſco, abdomine luteſcente, pedibus quatuor poſticis breviſſimis, anticis longis luteo nigroque interſectis.

Loc. Habitat plantas.

2. A. citrina.

L'Araignée citron.

Long. 4 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

A. citrino-lutea, pedibus quatuor poſticis breviſſimis, abdomine utrinque faſciâ ferrugineâ.

Loc. Idem.

3. A. extenſa.

L'Araignée à ventre cylindrique & pattes de devant étendues.

Long. 3 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

A. abdomine longo argenteo vireſcente, pedibus longitudinaliter extenſis.

Loc. Habitat ſylvas humidas.

4. A. faſciata.

L'Araignée brune à trois raies tranſverſes blanches ſur le ventre.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

A. fuſca, thorace lineis quatuor obliquis fuſcis, abdomine tribus tranſverſis albis.

Loc. Habitat hortos.

5. A. interſecta.

L'Araignée à ventre roux rayé de noir & pattes arlequinées.

Long. 2 lig. Larg. 1 lig.

A. nigra, abdomine ferrugineo flavo lineis tranſverſis contiguis, nigris pedibus fuſco ferrugineoque interſectis.

Loc. Habitat arva.

FAMILIA II. *Oculi in quadratum dispositi.*

en quarré

6. A. parietina.

L'Araignée brune domestique.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

A. atro-fusca, subvillosa, pedibus atro fuscoque intersectis.

Loc. Habitat angulos murorum; domestica.

7. A. aquatica.

L'Araignée brune aquatique.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

A. aquatica tota fusca.

Loc. Habitat aquam stagnantem.

8. A. foliata.

L'Araignée porte-feuille.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

A. pallida, abdomine folium longitudinaliter extensum pallide nigrum referente.

Loc. Habitat prata.

9. A. dumetorum.

L'Araignée à feuille coupée.

Long. 4 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

A. livido rufa, abdominis picturâ foliaceâ nigrâ, luteo interſectâ, pedum annulis nigris.

Loc. Habitat ſylvas, telam verticalem conſtruit.

10. A. papalis.

L'Araignée à croix papale.

Long. 4 lig. Larg. 1 $\frac{3}{4}$ lig.

A. livido-rufa, abdomine cruce triplici luteâ.

Loc. Habitat hortos.

11. A. longipes.

L'Araignée rougeâtre à ventre jaune ponctué de noir.

Long. 3 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. 1 lig.

A. pallido-rufa, abdomine flaveſcente punctis nigris.

Loc. Habitat arbores.

12. A. vittata.

L'Araignée à bande rouge.

Long. 3 lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

A. pallida, abdomine ovato flavo, faſciâ longitudinali coccineâ.

Loc. Habitat cupreſſum, in horto regio.

13. A. phalangiodes.

L'Araignée domeſtique ſemblable au faucheur.

Long. 6 lig. Larg. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

A. fuſco-flaveſcens, pedibus longis corpore triplo longioribus.

Loc. Habitat domos.

FAMILIA III. *Oculi in duas lineas diſpoſiti.*

ſur 2 lignes

14. A. marmorata.

L'Araignée à feuille découpée & déchiquetée.

Long. 3 $\frac{1}{3}$ lig. Larg. 1 $\frac{1}{3}$ lig.

A. livido-rufa, abdominis picturâ foliaceâ ſæpius interruptâ, pedibus nigro maculatis.

Loc. Habitat plantas, filum horiſontalem conſtruit.

FAMILIA IV. *Oculi in tres lineas diſpoſiti.*

Sur 3 lignes

15. A. lupus.

L'Araignée loup.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

A. tota fuſca fuliginea.

Loc. Habitat arva ſine filo.

16. A. paluſtris.

L'Araignée cendrée à trois lignes blanches ſur le corcelet.

Long. 4 lig. Larg. 2 lig.

A. tota cinereo-villoſa, thoracis lineâ triplici albidâ.

Loc. Habitat prata humida.

17. A. ſcenica.

L'Araignée ſauteuſe aux trois chevrons blancs.

Long. 2 $\frac{1}{2}$ lig.

A. ſaliens nigra, abdomine utrinque lineis tribus albis ad angulum acutum coeuntibus.

Loc. Habitat arva & domos.

FAMILIA V. *Oculi in ferta difpofiti.* en bouquets

18. A. meticulofa.

L'Araignée domeftique à longues pattes.

A. longipes, thorace pedibufque pallidis, abdomine plumbeo fufco.

Loc. Habitat domos.

CXIII. MONOCULUS. *LE MONOCLE.*

Pedes fex.

Oculus unus.

Antennæ multiplices fetis plurimis lateribus.

Corpus cruftâ tectum.

1. M. pulex.

Le Perroquet d'eau.

Long. $\frac{1}{2}$ lig.

M. antennis dichotomis, caudâ inflexâ.

Loc. Habitat aquam ftagnantem, quam fanguineo colore tingit.

2. M. pediculus.

Le Monocle à queue retrouſſée.

M. antennis dichotomis, caudâ reflexâ.

Loc. Habitat aquam ſtagnantem, quam ſanguineo colore tingit.

3. M. quadricornis.

Le Monocle à queue fourchue.

M antennis quaternis, caudâ rectâ bifidâ.

Loc. Idem.

4. M. conchaceus.

Le Monocle à coquille longue.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

M. antennis capillaceis multiplicibus, teſtâ bivalvi oblongâ.

Loc. Idem.

5. M. teſtaceus.

Le Monocle à coquille courte.

Long. 1 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

M. antennis capillaceis multiplicibus, teſtâ bivalvi globoſâ.

Loc. Idem.

CXIV. BINOCULUS. *LE BINOCLE.*

Pedes ſex.
Oculi duo.
Antennæ ſimplices ſetaceæ.
Cauda bifida.
Corpus cruſtâ tectum.

1. B. apus.
Le Binocle à queue en filets.
Long. 18 lig. Larg. 10 lig.
B. caudâ biſetâ.
Loc. Habitat aquam, rarus.

2. B. foliaceus.
Le Binocle à queue en plumet.
Long. 2 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.
B. hæmiſphæricus, caudâ foliaceâ, capitis puncto triplici fuſco.
Loc. Habitat rivulos.

3. B. gaſteroſtei.
Le Binocle du gaſteroſte.
B. gaſteroſtei.
Loc. Idem.

CXV. CANCER. *Le Crabe.*

Pedes decem, primi cheliformes.
Oculi duo.
Antennæ filiformes.
Cauda foliofa.
Corpus cruftâ tectum.

1. C. aftacus.
L'Ecreviffe.
C. macrourus, roftro fupra ferrato, bafi utrinque dente fimplici, thorace integro.
Loc. Habitat fluvios, rivos.

2. C. pulex.
La Crevette des ruiffeaux.
Long. 7 lig. Larg. 2 lig.
C. macrourus rufefcens, thorace articulato.
Loc. Habitat rivulos.

CXVI. ONISCUS. *Le Cloporte.*

Pedes quatuordecim.
Antennæ duæ fractæ.

1. O. armadillo.

Le Cloporte armadille.

Long. 5 lig. Larg. 2 $\frac{1}{3}$ lig.

O. caudâ obtusâ integerrimâ.

Loc. Habitat ſylvas.

2. O. aſellus.

Le Cloporte ordinaire.

Long. 5 lig. Larg. 2 lig.

O. caudâ obtusâ bifurcâ.

Loc. Habitat loca humida locorum.

CXVII. ASELLUS. *L'Aselle.*

Pedes quatuordecim.

Antennæ quatuor fractæ, duæ longiores.

1. A. aquaticus.

L'Aſelle d'eau douce.

Long. 1 $\frac{2}{3}$ lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

A. caudâ bifidâ ſtylitis bifurcis, articulis ſeptem.

Loc. Habitat rivos.

CXVIII. SCOLOPENDRA. *La Scolopendre.*

Pedes ad minimum viginti quatuor sæpe plus.

Corpus planum.

Antennæ filiformes, articulis brevibus plurimis.

1. S. forficata.

La Scolopendre à trente pattes.

Long. 9 à 10 lig. Larg. 1 $\frac{1}{2}$ lig.

S. rufa, pedibus utrinque quindecim.

Loc. Habitat sub lapidibus in hortis.

2. S. coleoptrata.

La Scolopendre à vingt-huit pattes.

Long. 8 lig.

S. nigricans, pedibus utrinque quatuordecim albo nigroque interſectis.

Loc. Id. rarior.

3. S. nigricans.

La Scolopendre à ſoixante pattes.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{2}{3}$ lig.

S. fuſca, pedibus utrinque triginta.

Loc. Idem.

4. S. phoſphorica.

La Scolopendre à cent quarante pattes.

Long. 8 à 9 lig. Larg. $\frac{3}{4}$ lig.

S. ferruginea, pedibus utrinque ſeptuaginta.

Loc. Habitat terram.

5. S. fuſca.

La Scolopendre à cent quarante-quatre pattes.

Long. 10 lig. Larg. $\frac{1}{2}$ lig.

S. fuſca, pedibus utrinque ſeptuaginta duobus.

Loc. Idem.

6. S. lagura.

La Scolopendre à pinceau.

Long. 1 $\frac{1}{4}$ lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

S. ovalis, pedibus utrinque duodecim, caudâ albo penicillo.

Loc. Habitat cortices arborum.

CXIX. JULUS. *L'Iule.*

Pedes plus quàm centum.
Corpus teres cylindraceum.
Antennæ articulis quinque.

1. J. terreſtris.

L'Iule à deux cens pattes.

Long. 5 lig. Larg. $\frac{1}{6}$ lig.

J. fuſcus lævis, pedibus utrinque centum.

Loc. Habitat ſub lapidibus.

2. J. ſabuloſus.

L'Iule à deux cens quarante pattes.

Long. 10 lig. Larg. $\frac{1}{3}$ lig.

J. cinereus, pedibus utrinque centum & viginti.

Loc. Idem

FINIS.